



14868 / A / 1.
L. VIII

DEBACQ LIBRARY

VADE-MECUM

DU

JEUNE MÉDECIN.

VADIE-MECUM

DU

REUNE MEDICIN

VADE-MECUM

DU

JEUNE MÉDECIN,

CONTENANT :

Un Précis de Nosographie médicale;
Un Abrégé de Pharmacologie renfermant les
médicamens simples et composés, les formules
officinales et magistrales les plus usitées;
Enfin, une Liste des médicamens rangés d'après
leurs propriétés médicinales.

PAR F. T. M. BOURGEOISE,

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Chirurgien
major du 4^e bataillon de la 3^e légion de la Garde na-
tionale de Paris; ancien Élève de l'École pratique, ex-
Chirurgien aide-major du 29^e régiment d'infanterie
légère.

A PARIS,

Chez MÉQUIGNON-MARVIS, Libraire pour
la partie de Médecine, rue de l'École de
Médecine, n^o 9.

—
1817.



PRÉFACE.

EN publiant un abrégé de nosographie et de pharmacologie , je n'ai pas prétendu l'offrir à la méditation de ceux qui s'occupent encore de l'étude de la médecine ; ce n'est pas dans de pareils ouvrages qu'ils peuvent puiser les nombreuses connaissances qu'il est indispensable de posséder pour être à même d'exercer une profession aussi difficile. C'est dans la lecture attentive et dans la méditation des ouvrages que les maîtres de l'art ont publiés sur les diverses parties de cette science qu'ils acquerront une instruction solide : aussi, je le répète , cet abrégé n'est pas destiné aux élèves ; mais je le propose aux jeunes médecins comme un *memento* , ou plutôt , comme un résumé de ce qu'ils ont appris.

Ce petit ouvrage , qui n'est en quelque

sorte qu'un traité de *Posologie*, dans lequel je me suis principalement appliqué à faire connaître les doses auxquelles les praticiens prescrivent les médicamens, ne peut être comparé que sous le rapport des matières qui y sont traitées, aux divers formulaires et traités de l'art de formuler que nous possédons, et parmi lesquels il en est plusieurs qu'il serait difficile de surpasser en précision, en exactitude et en clarté.

L'idée d'un pareil ouvrage m'a été suggérée par les services que le *Vade-Mecum Medicum* du D^r Guillaume Tazewell a rendus aux jeunes médecins; j'avais eu d'abord envie de traduire cet ouvrage; mais j'ai bientôt abandonné ce projet, en réfléchissant que la méthode nosologique de Cullen, qui en forme la première partie, est peu connue en France, et que d'ailleurs il était inutile d'emprunter à l'étranger ce que nous possédons nous-mêmes; j'ai donc substitué, à cette classification, celle de la nosographie philosophique suivie à la Faculté de médecine de Paris, ou-

vrage qui est en quelque sorte devenu le bréviaire de tous les médecins français. De plus, je n'ai pas trouvé la deuxième partie de l'ouvrage du D^r Tazewell assez complète, et les doses des médicamens m'ont paru, en général, portées trop haut, du moins quant à notre manière de pratiquer la médecine.

Ma deuxième partie est divisée en trois sections.

Dans la première, je traite des médicamens simples (1) pris dans les trois règnes de la nature. Je décris les substances minérales sous les noms qui leur ont été donnés par les chimistes français; j'y joins le nom ancien qui était le plus usité, et la nomenclature nouvelle d'après M.

(1) Il faut comprendre, sous le nom de médicamens simples, non-seulement ceux que l'on administre en substance, mais encore ceux qui se donnent dans un excipient quelconque, lorsque leurs propriétés médicinales n'en sont point ou n'en sont que très-peu modifiées.

Thénard ; j'ai pris cette dernière dans les cahiers de quelques-uns des nombreux élèves qui suivent les leçons de ce célèbre professeur, ainsi que dans les ouvrages de MM. Caventou et Fougéron, pharmaciens distingués.

Après avoir indiqué les substances végétales sous le nom qu'on leur donne le plus communément, je rappelle toujours la synonymie latine prise le plus souvent dans Linnée ; j'y joins aussi la classification du même auteur, et celle des familles naturelles de Jussieu, telle qu'on la trouve dans *le Tableau du règne végétal* de Ventenat ; de plus, j'indique le lieu où la plante croît naturellement, ou bien celui où elle est cultivée avec avantage ; enfin, je dis quelles sont les parties de la plante usitées en médecine.

Pour les substances que le règne animal fournit à la matière médicale, j'ai suivi à peu près le même ordre que pour les précédentes.

Chacun de ces articles est divisé en plusieurs paragraphes : dans le premier, je

traite des formes sous lesquelles les médicamens sont employés, et des doses auxquelles on les prescrit, tant à l'intérieur (1) qu'à l'extérieur. Dans le second j'indique les propriétés médicinales de la substance (2). Lorsqu'un médicament a été ou est plus spécialement administré dans le traitement d'une ou de plusieurs affections, je cite ces maladies dans un troisième intitulé *Cas particuliers*. Souvent, dans un quatrième, sous

(1) Je me suis abstenu de faire mention des doses élevées auxquelles quelques médecins d'Italie prescrivent des médicamens très-actifs, tels que l'émétique, la digitale pourprée, l'eau distillée de laurier-cerise, etc., parce que les expériences n'ont point été répétées en France, de manière à ne laisser rien à désirer, et parce qu'on ne peut admettre, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, que ce qu'une observation exacte et rigoureuse nous a bien évidemment démontré.

(2) J'ai cru devoir me servir des dénominations anciennes et non de celles qui consistent à ranger les médicamens d'après leur action sur

le nom d'*Observation*, j'indique sous quelle forme le médicament est le plus ordinairement employé; j'avertis quelquefois des dangers qu'entraîne son usage, ou des précautions particulières qu'il exige; enfin, je dis s'il est ou n'est plus usité.

Dans la deuxième section, qui traite des médicamens composés, officinaux et magistraux, j'ai suivi le même plan que dans la première. Parmi les formules qui y sont rappelées, quelques-unes sont à peu près abandonnées aujourd'hui. Il ne m'a cependant pas semblé inutile de les insérer ici, parce que quelques dispensaires en font encore mention, et que d'ailleurs plusieurs d'entre elles ne sont pas sans vertu.

La troisième section, qui n'est pour ainsi dire qu'une table des médicamens, offre les

chaque tissu en particulier, ou ce qui revient au même, d'après une classification physiologique, parce que je pense que les noms anciens sont plus propres à être mis dans un ouvrage de pratique; ils sont d'ailleurs plus courts à exprimer, et sont encore généralement usités.

principales substances rangées d'après leurs propriétés médicinales.

Je me suis servi dans les trois sections de l'ordre alphabétique ; j'ai pensé que c'était la meilleure manière de procéder, pour qu'on pût chercher et trouver facilement le médicament dont on a besoin.

On ne trouvera dans le *Vade-Mecum* que les principes et la doctrine professés par les meilleurs auteurs, sur les diverses parties dont il se compose. Ainsi, pour la médecine, j'ai consulté les ouvrages du professeur Pinel, de Cullen, et le dictionnaire des sciences médicales ; pour la chimie, j'ai mis à contribution les traités de Fourcroy, de MM. Thénard et Bouillon-Lagrange ; pour la botanique, ceux de Linnée, de Ventenat, de Dalibard, de MM. Mérat et Chaumeton ; pour la matière médicale, ceux de Lientaud, de Desbois de Rochefort, de Peyrilhe, de Vicat, de Brugnatelli, de Schwilgué, de Morelot, de MM. les D^{rs} Alibert, Swédiaur, Barbier et Nysten ; enfin, pour la pharmacie, j'ai

eu recours aux ouvrages de Baumé, de Morelot et de Parmentier.

J'ai aussi consulté les notes que j'ai recueillies dans les cours de la Faculté de médecine, du Muséum d'histoire naturelle et de l'Ecole de pharmacie, et dans les leçons de clinique faites dans les divers hôpitaux de Paris.

Indépendamment de ces différentes sources auxquelles j'ai puisé, les conseils de quelques personnes déjà connues par d'utiles travaux, m'ont été aussi très-avantageux; et je me plais à citer ici mes amis, MM. les D^{rs} Marjolin, chirurgien en second de l'Hôtel-Dieu de Paris, Legouas, chirurgien des dispensaires de la Société philanthropique, et particulièrement M. le D^r de Kergaradec, qui a bien voulu prendre part avec moi aux recherches nécessaires à la confection de cet ouvrage et en surveiller l'impression.

TABLE

*Des principales abréviations employées
dans cet Ouvrage.*

PREMIÈRE PARTIE.

<i>Sympt.</i>	<i>Symptômes.</i>
<i>Termin.</i>	<i>Terminaisons.</i>
<i>Trait.</i>	<i>Traitement.</i>
<i>ESP.</i>	<i>Espèces.</i>
<i>COMPLIC.</i>	<i>Complications.</i>
<i>F.</i>	<i>Fièvre.</i>
<i>VAR.</i>	<i>Variété.</i>
<i>Septén.</i>	<i>Septénaire.</i>

DEUXIÈME PARTIE.

$\frac{1}{4}$	<i>Prenez.</i>
lb	<i>Livre.</i>
lb ß	<i>Demi-livre.</i>
℥	<i>Once.</i>
℥ ß	<i>Demi-once.</i>
℥	<i>Gros.</i>
3℥	<i>Demi-gros.</i>

b.

Ḑ	Scrupule.
Gr. gr.	Grain.
Manip.	Poignée.
N ^o , n ^o	Nombre.
Pinc.	Pincée.
Q. S.	Quantité suffisante.
Q. V.	Quantité voulue.
F. S. L.	Faites selon l'art.
Fr. Fran. Franc. . . .	France.
Cult. Cultiv.	Cultivé.
<i>F. D.</i>	<i>Forme. Dose.</i>
<i>P.</i>	<i>Propriétés.</i>
<i>Cas part.</i>	<i>Cas particuliers.</i>
<i>Obs.</i>	<i>Observations.</i>
<i>Offic.</i>	<i>Officinal.</i>
<i>A l'extér.</i>	<i>A l'extérieur.</i>
<i>A l'intér.</i>	<i>A l'intérieur.</i>
D. D. P. Dépôts d'eaux minérales à Paris.	

VADE-MECUM

DU

JEUNE MÉDECIN.

PREMIÈRE PARTIE.

ABRÉGÉ DE NOSOGRAPHIE MÉDICALE.

CLASSE PREMIÈRE.

FIÈVRES.

ORDINAIREMENT précédées de langueur, de lassitude et des autres signes de la débilité.

Altération du pouls et de la chaleur ; lésion de la plupart des fonctions, sans maladie locale primitive bien évidente.

Durée déterminée.

ORDRE I^{er}. F. angioténiques (inflammatoires).

Causes. Jeunesse, tempérament sanguin, hiver, printemps.

Sporadiques, rarement épidémiques.

Symptômes. Céphalalgie, pouls fort, chaleur habitueuse, urines rouges, fonctions cérébrales peu troublées.

Terminaison. Sueurs abondantes, hémorrhagies, urines à sédiment blanc.

GENRE I. — *Continue.* Paroxysmes légers, ordinairement le soir.

1^{re} VARIÉTÉ. *Ephémère inflammatoire.*
Durée. De 1 à 4 jours.

2^e VAR. *Synoque inflammatoire.* *Durée.*
De 1 à 3 septénaires.

Traitement. Saignée, délayans, régime antiphlogistique.

Les fièvres inflammatoires rémittente et intermittente s'observent si rarement, qu'il ne doit point en former un genre.

ORDRE II. F. méningo-gastriques (bilieuses).

Embarras gastrique.

Causes. Celles de la F. bilieuse. (*Voyez ci-après.*)

Embarras stomacal. Céphalalgie sus-orbitaire, anorexie, amertume de la bouche, enduit jaunâtre ou blanchâtre de la langue, nausées surtout le matin, douleur à l'épigastre.

Trait. Vomitif, délayans.

Embarras intestinal. Eructations, flatuosités, borborygmes, coliques, tension de l'abdomen, constipation ou diarrhée, lassitudes des membres abdominaux, douleurs vagues aux jambes et aux genoux, avec ou sans fièvre.

Trait. Délayans, purgatifs, toniques.

Cholera-morbus. Vomissemens violens et répétés, d'abord des alimens, ensuite de matières vertes, brunes, noirâtres; en même

temps déjections alvines de matières semblables ; anxiétés , douleur vive et brûlante dans différens points de l'abdomen , dépression et resserrement du ventre , pouls petit et concentré , abattement extrême des forces ; quelquefois affections spasmodiques variées. Mort en très-peu de temps.

Trait. Adoucissans , calmans , antispasmodiques.

Caractères du 2^e ordre. Causes. Age mûr , tempérament bilieux , été , mauvaise nourriture , affections tristes.

Sporadique , épidémique , endémique.

Sympt. Pouls fort et dur , chaleur âcre au toucher , céphalalgie sus-orbitaire , douleur à l'épigastre , ordinairement bouche amère , enduit blanchâtre ou jaunâtre de la langue , anorexie , désir des boissons froides et acides , urines foncées , diarrhée ou constipation ; quelquefois , ictère partiel ou général.

Termin. Vomissement , diarrhée bilieuse ,

sueurs générales, urines à sédiment rose ou briqueté.

GENRE II. — *Continue*. Un ou deux paroxysmes pendant le jour.

Durée. 1, 2, 3 septén. Le 5^e ou le 7^e jour, elle dégénère quelquefois en fièvre adynamique. Elle devient souvent intermittente vers son déclin.

ESP. COMPLIQUÉE. *Bilieuse inflammatoire*. (F. ardente) symptômes réunis des fièvres inflammatoire et bilieuse.

Durée et termin. Les mêmes que dans la F. bilieuse.

Trait. Emétique ou éméto-cathartique, boissons adoucissantes et légèrement acidulées, lavemens émolliens; prévenir ou combattre les complications, favoriser les crises.

GENRE III. — *Rémittente*. Accès de froid et de chaud d'abord vagues, ensuite réguliers; vers la fin, simples paroxysmes, la fièvre devenant alors continue.

Durée. De 14 à 40 jours.

On ne connoît guère les complications de cette fièvre.

Trait. D'abord le même que pour la précédente, ensuite boissons fortifiantes et alimens légers mais nourrissans; vers le déclin, quelques toniques.

GENRE IV.—*Intermittente.* Produite particulièrement par l'habitation dans les lieux bas et humides. L'accès commence ordinairement par un sentiment de froid entre les épaules, s'étendant bientôt à tout le corps, et suivi de tremblement; ensuite survient la chaleur, à laquelle succède une sueur plus ou moins abondante.

Type. Accès tous les jours (*F. quotidienne*), tous les deux jours (*F. tierce*), tous les trois jours (*F. quarte*), tous les jours mais se correspondant de deux jours l'un et alternativement forts et foibles. (*F. double tierce.*)

Apyrexie complète entre les accès.

Durée. 3, 5, 7 accès et plus.

Trait. Dans le commencement, le même que pour les deux genres précédens. Après

le 6^e ou 7^e accès, toniques forts, surtout le quinquina pendant l'apyrexie.

ORDRE III. F. adéno-méningées (muqueuses).

Causes. Sexe féminin, enfance, vieillesse, tempérament lymphatique, automne.

Sporadiques, épidémiques, endémiques.

Sympt. Pâleur et flaccidité générales; bouche fade et pâteuse, langue humide et blanchâtre, aphthes; pouls peu fébrile, quelquefois plus lent que dans l'état de santé; chaleur modérée; excrétions augmentées dans la muqueuse intestinale, et quelquefois dans plusieurs autres; douleurs contusives des membres; éruptions cutanées fugaces; paroxysmes la nuit. Quelquefois symptômes d'embarras gastrique. (Les matières qui les produisent ne sont pas bilieuses; ce sont des mucosités vis-

queuses blanchâtres, que l'on rend par les vomissemens ou par les selles.)

GENRE V. — *Continue*. Paroxysmes la nuit. Vers la fin, elle devient quelquefois intermittente.

Durée. 2, 3, 4 septén.

ESP. COMP. *F. muq. vermineuse*. Symptômes de l'ordre; de plus, dilatation de la pupille; chatouillement aux narines; haleine fétide et aigre; intermittence du pouls; toux sèche; douleurs aux poignets, aux genoux, aux pieds; mouvemens convulsifs, etc.

2^e ESP. *F. muq. inflammatoire*. Son existence est contestée. On a vu des *F. muqueuses* avec phlegmasie locale.

3^e ESP. *F. muq. bilieuse*. On a eu plusieurs fois occasion de l'observer.

GENRE VI. — *Rémittente*. Accès en froid et en chaud.

Type. Quotidien, double tierce, tierce, quarte. Vers le déclin, simples paroxysmes; elle devient souvent alors continue.

Durée. 42 jours et plus.

Hémitritée. Accès tous les jours; plus, tous les deux jours, le matin, seconds accès se correspondant en tierce.

COMPLICAT. Embarras gastrique, F. bilieuse, phlegmasie d'un viscère.

Trait. des F. muq. continue et rémittente.
Dans le commencement, vomitif et souvent purgatif. (On préfère l'ipécacuanha à l'émétique, et la rhubarbe unie à un sel neutre, à tout autre purgatif, à cause du grand relâchement de la muqueuse intestinale). Plus tard, légers toniques et quelques purgatifs; vers la fin, toniques, alimens nourrissans et de facile digestion.

GENRE VII. — *Intermittente.* Accès commençant par de légers frissons, d'abord aux pieds, puis dans tout le corps. Pendant l'apyrexie, langueur, inertie.

Type. Tierce, double tierce, plus souvent quotidien ou quarte.

Trait. Le même que pour les précé-

dentes. Insister sur les amers et surtout sur le quinquina.

ORDRE IV. F. adynamiques (putrides).

Causes. Toutes les causes de la débilité.

Sporadiques, endémiques, épidémiques, souvent contagieuses.

Sympt. Pouls foible, chaleur âcre au toucher, décubitus en supination, prostration extrême des forces, stupeur générale, langue noire et fuligineuse, excréments souvent fétides, délire taciturne.

Termin. Mort. Diminution graduée des symptômes (*lysis*). Crises par les urines, qui sont troubles avec un sédiment cendré, par des sueurs générales chaudes, par des parotides, par des abcès.

La convalescence est longue, et les rechutes fréquentes.

GENRE VIII.—*Continue.* Paroxysmes le matin ou le soir; souvent peu marqués. Elle devient quelquefois intermittente vers la fin.

Durée. 1, 2, 3, 4 septén. et plus.

1^{re} ESP. COMPL. *F. putride-inflammatoire*. Au début, symptômes de la *F. inflammatoire* ; le 3^e ou 4^e jour, adynamie.

2^e ESP. *F. bilieuse-adyynamique*. D'abord symptômes de la *F. bilieuse*, ensuite ceux de la *F. adynamique*.

3^e ESP. *F. muqueuse-adyynamique*. Réunion des symptômes de ces deux fièvres.

Trait. préservatif. Eloigner les causes prédisposantes, faire usage de fumigations acides.

— *Curatif*. En général stimulant et tonique. (Il varie selon les circonstances.)

GENRE IX. — *Rémittente*. Retour régulier ou irrégulier d'accès en froid et en chaud, sans apyrexie. Durée prolongée.

GENRE X. — *Intermittente*. Apyrexie complète ; retour des accès sous le type quotidien, double tierce, tierce ou quarte. Durée indéterminée.

Trait. des F. adynamiques rémittente et intermittente. Le même que pour le genre précédent. Cependant, comme elles sont de plus longue durée, il est utile de sou-

tenir le malade par quelques alimens de facile digestion. (Le quinquina, même à haute dose, ne guérit pas toujours la F. adynam. intermittent.)

ORDRE V. — Ataxiques (malignes).

Causes. Tout ce qui occasionne la débilité.

Sporadiques, épidémiques, endémiques, contagieuses.

Sympt. Irrégularité et désordre très-grand dans l'état du pouls, de la chaleur, des sens, de l'entendement, de la locomotion, de la voix, dans la succession ou la marche des symptômes; anomalies locales très-variées: simulant une phlegmasie, un flux, une névrose; exacerbations très-irrégulières; pouls souvent fort, faible, grand, petit, régulier, irrégulier, intermittent, soit alternativement dans la même artère, soit simultanément dans des artères différentes; chaleur inégale, augmentée dans une partie, diminuée dans une autre; sensibilité excessive d'un

ou de plusieurs sens, tandis que les autres sont obtus; intelligence très-développée ou nulle, insomnie, vertiges, coma, délire, bégayement, aphonie, carphologie, soubresauts des tendons, convulsions, tétanos; paralysie générale ou partielle, constante ou passagère; hydrophobie, etc.

Termin. Souvent funeste. Peu d'évacuations critiques; métastases aux articulations, aux glandes; cependant, quelquefois crises par les sueurs, par les urines, qui sont sédimenteuses, par la diarrhée, par une éruption miliaire.

GENRE XI — *Continue*. Continuité des symptômes ci-dessus, avec paroxysmes très-irréguliers.

Durée. 2, 3, 4 septén. et davantage.

1^{re} VAR. *F. lente-nerveuse*. Symptômes fugaces; marche très-lente.

2^e VAR. *F. cérébrale*. Embarras gastrique au début; ensuite céphalalgie vive, confusion dans les idées, abolition d'un ou de plusieurs sens, stupeur, état comateux, etc.

COMPLICAT. Ce genre peut se compliquer des symptômes propres aux différens ordres précédens ; de là les *F. atax. inflammatoire*, *atax. bilieuse*, *atax. muqueuse*, *atax. adynamique*.

Trait. En général, le même que pour la *F. adynamique*. Insister davantage sur les révulsifs externes ; s'attacher à combattre les symptômes prédominans.

GENRE XII.—*Rémittente* (*F. perniciose*). Continuité des symptômes de l'ordre, avec des accès réguliers ou irréguliers, sous le type quotidien, double tierce, tierce, quarte ; pendant l'accès un ou plusieurs des symptômes énumérés prédominent. Elle devient souvent continue vers la fin.

Cette maladie est extrêmement grave.

GENRE XIII.—*Intermittente* (*F. perniciose*). Accès sous le type quotidien, double tierce, tierce, quarte, exaspérés par quelque symptôme prédominant, violent et dangereux ; intermission complète après l'accès ; mort en très-peu de temps.

Trait. des F. atax. rémittente et intermittente. Quinquina à forte dose pendant la rémission et l'intermission. La maladie bien reconnue, on ne peut recourir trop tôt à son emploi.

GENRE XIV. *Typhus contagieux. Causes.* Froid humide, marches forcées, malpropreté, mauvaise nourriture, miasmes putrides; habitation dans les prisons, les hôpitaux, les vaisseaux; affections tristes, nostalgie.

Epidémique, éminemment contagieux, rarement sporadique.

Sympt. Début ordinairement brusque, précédé quelquefois de malaise, de lassitudes, d'anoxerie, de sommeil fatigant, de tristesse, d'apathie. 1^{re} période. Frisson suivi de chaleur, froid des parties exposées à l'air, sentiment de chaleur douloureuse et de gêne dans celles qui sont couvertes; céphalalgie frontale, serrement des tempes, visage animé, rougeur et douleur de la conjonctive, larmolement, inflammation d'une

ou de plusieurs membranes muqueuses , et particulièrement de celle du poumon , anorexie , langue blanche , nausées , vomissemens , soif , désir des boissons acides mais surtout de l'eau froide pure , diarrhée ou constipation , hypochondres douloureux , douleurs rhumatismales de différentes parties et particulièrement des lombes et du dos , insouciance , inertie , éruptions variées , souvent pétéchiées , quelquefois épistaxis et parotides ; pouls fréquent , mou et faible , rarement fort et dur ; urines rouges.

2^e période. Disparition de l'éruption , peau et langue sèches , déglutition difficile , pouls petit , chaleur âcre , urines pâles , selles fréquentes et putrides , douleur dans une des cavités splanchniques , souvent phlegmasie d'un ou de plusieurs viscères , exacerbations ordinairement la nuit , tremblemens , soubresauts des tendons , carphologie , *typhomanie* , idée dominante , qui efface toutes les autres. Le 13^e , 14^e ou 15^e jour , souvent exacerbation violente ,

suivie d'une crise complète par des selles, des urines à sédiment abondant, ou des sueurs. 3^e période. Quand la maladie se prolonge au-delà, aux symptômes ci-dessus se joignent ceux de la F. adynamique la mieux caractérisée. Elle se termine le 21^e, 27^e ou 28^e jour.

Termin. Souvent la mort.

La convalescence est très-longue; souvent, pendant la nuit, après la disparition de tous les symptômes, léger délire avec douleurs atroces et comme térébrantes au tibia ou au fémur.

Trait. Delayans, évacuans, antispasmodiques, toniques; comme il existe presque toujours une affection locale, dérivatifs puissans.

GENRE XV. *F. jaune.* (Typhus ictéroïde.)

Causes. Chaleur ardente de l'atmosphère, grande sécheresse, contagion.

Epidémique, endémique, contagieuse, rarement sporadique.

Sympt. 1^{re} période. Au début, frisson

suivi de tremblement avec refroidissement ; ou augmentation de chaleur, céphalalgie ; étonnement, terreur ; face rouge ; yeux fixes, larmoyans ; langue sèche et chargée vers son milieu, rouge et humide sur les bords ; déglutition difficile, anorexie, éructations, nausées, vomissemens douloureux de matières glaireuses et jaunâtres ; hypochondres douloureux ; douleurs au dos, aux lombes, aux membres abdominaux ; pouls dur ou déprimé ; chaleur âcre, humide ou sèche de la peau ; diarrhée ou constipation ; urines rouges. 2^e période. Pouls faible, lent ; affaissement, état comateux ; augmentation des vomissemens ; ictère des yeux, de la face, du cou, du tronc et des membres. 3^e période. Symptômes d'adynamie ; hoquets, délire, convulsions, défaillances, vomissemens de matières noirâtres, déjections de même couleur et très-fétides, hémorrhagies passives variées, froid des membres, suppression d'urine, odeur cadavéreuse, mort avant le 7^e jour.

Type. Ordinairement continu, quelquefois rémittent et intermittent.

Trait. Boissons délayantes, acidulées; toniques vers la fin; combattre les accidens. On a beaucoup préconisé l'usage du quinquina à très-forte dose, dès le début de la maladie.

ORDRE VI. F. adéno-nerveuses (peste).

Causes. La contagion.

Sporadiques, épidémiques, endémiques, contagieuses.

Sympt. Série de phénomènes appartenant aux fièvres adynamiques et ataxiques, accompagnée d'éruption de bubons aux aines, aux aisselles et rarement au cou; d'anthrax aux parties privées de poils : aux joues, au cou, au dos, aux membres; de pétéchies à la poitrine, au cou, aux membres. Ces trois caractères de la peste existent séparément ou simultanément.

Termin. Très-souvent la mort.

GENRE XVI. — *Continue*. Marche très-aiguë ou très-lente; quelques heures suffisent pour tuer le malade; d'autres fois la maladie dure 2 septén.

COMPLICAT. Embarras gastrique. Les fièvres précédentes.

GENRES XVII et XVIII. — *Rémittente et intermittente*. Peu ou point connues.

Trait. préservatif. Calme moral, nourriture succulente mais modérée, toniques, frictions d'huile sur tout le corps; ne pas communiquer avec les pestiférés, ne pas faire usage des objets dont ils se sont servis, avant de les avoir purifiés. Si par devoir on est obligé de visiter les pestiférés ou de demeurer avec eux, l'application d'un exutoire peut être avantageuse. On a aussi proposé l'inoculation de la petite vérole ou de la vaccine.

— *Curatif*. Frictions avec l'huile ou la glace, émétique, sudorifiques; enfin traitement des fièvres adynamiques et ataxiques, varié suivant l'exigence des cas. Faire suppurer

les bubons et les anthrax pour prévenir les métastases.

Fièvres hectiques.

Causes. Toutes les causes débilitantes qui persistent long-temps ; hémorrhagies , catarrhes , diabètes , masturbation , coït immodéré , fatigues , tristesse , jalousie , nostalgia ; terminaisons incomplètes des différentes fièvres , des phlegmasies ; maladies organiques.

Presque toujours sporadiques , le plus souvent symptomatiques ; très-rarement essentielles.

Sympt. Pâleur , maigreur , flaccidité générales ; coloration partielle des joues ; soif , chaleur à la paume des mains , à la plante des pieds ; pouls fréquent , dur ; respiration difficile , toux férine , peau sèche , sueurs partielles qui deviennent générales et gluantes vers la fin , quelquefois appétits vénériens , augmentation des excrétiions , diarrhée colliquative , œdème

des membres abdominaux , amaigrissement , affoiblissement général ; souvent le malade conserve toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à la mort.

GENRE XIX. *Continue*. Symptômes de l'ordre avec type continu ; paroxysmes le soir ou la nuit. Durée indéterminée.

GENRE XX. *Rémittente*. Symptômes de l'ordre avec type rémittent.

Trait. Il varie selon la cause de la maladie et selon les circonstances qui l'accompagnent.

CLASSE SECONDE.

PHLEGMASIES.

Douleur , chaleur , rougeur et souvent tuméfaction locales , avec ou sans fièvre ; se terminant par résolution , suppuration , gangrène , induration , ulcération , délitescence , métastase , passage à l'état chronique.

ORDRE I^{er}. Phlegm. cutanées.

Rougeur plus ou moins étendue, éruption de boutons, de pustules ou de taches, avec chaleur, douleur ordinairement prurigineuse et brûlante; l'éruption est souvent précédée ou accompagnée de fièvre; elle se termine par desquamation, dessiccation, ulcération, gangrène, métastase.

GENRE I. *Variole*. Tous les sexes, tous les âges y sont sujets dans tous les climats; commune au printemps, elle cesse en hiver; elle n'a lieu qu'une fois dans la vie.

Sporadique, épidémique, contagieuse.

Sympt. Lassitude sans cause, horripilations vagues, chaleur, accélération du pouls, céphalalgie, nausées, vomissemens; chez les enfans, convulsions. Vers la fin du 3^e jour ou le 4^e, apparition de petits points rouges d'abord autour des lèvres, ensuite à la face, aux bras et au reste du corps; apyrexie complète après l'é-

ruption, qui se termine en 24 heures. Le 7^e jour, la fièvre reparait; les pustules, élargies et arrondies, entrent en suppuration. Le 10^e jour, la fièvre cesse; les pustules se dessèchent, tombent en écailles faufilées, et laissent à la peau des traces plus ou moins profondes.

1^{re} VAR. *Variole discrète*. Pustules peu nombreuses, écartées. Apyrexie complète après l'éruption.

2^e VAR. — *Confluente*. Eruption souvent prématurée; symptômes précurseurs très-violens; les pustules se confondent les unes avec les autres; fièvre après l'éruption; souvent pyalisme et diarrhée.

COMPLICAT. Fièvres bilieuse, vermineuse, adynamique, ataxique.

Trait. préservatif. Vaccination. Inoculation du virus variolique.

— *Curatif*. Variant selon les circonstances. Souvent l'expectation. Diète, boissons acidulées; saignée, si l'inflammation est trop

violente. Dans la variole confluente, qui souvent est compliquée de F. adynamique, stimulans, toniques, rubéfians.

GENRE II. *Varicelle*. Eruption avec ou sans fièvre, de pustules qui passent à peine à l'état de suppuration, se dessèchent en peu de jours, et ne laissent point de cicatrice après leur chute.

1^{re} VAR. *Chicken pox* (pustules de poulet). Petites pustules peu élevées, contenant un liquide limpide et incolore.

2^e VAR. *Swine pox* (pustules de cochon). Pustules plus développées, contenant un liquide blanchâtre qui se rapproche du pus.

Trait. Boissons acidulées, régime rafraîchissant.

GENRE III. *Rougeole*. Tous les sexes, tous les âges y sont sujets. Plus commune dans l'enfance et au commencement de l'hiver, elle disparaît l'été. Elle n'attaque qu'une fois dans la vie.

Epidémique, contagieuse.

Sympt. Ceux des phlegm. aiguës ; coryza , éternuement , toux violente , larmoiement , tuméfaction des paupières. Le 4^e ou 5^e jour , apparition au visage , à l'abdomen , à la poitrine , de petites taches rouges , semblables à des morsures de puces , séparées par des intervalles anguleux. L'éruption terminée , la fièvre ne cesse pas ; la toux augmente quelquefois. Le 6^e ou 7^e jour , le rouge vif des taches diminue ; le 8^e ou le 9^e , l'épiderme s'enlève par écailles , et la desquamation a lieu. La toux et la difficulté de respirer subsistent quelquefois long-temps.

COMPLICAT. Fièvres primitives , péri-pneumonie.

Trait. Exposition à un air tempéré. Boissons délayantes et mucilagineuses. Combattre les symptômes prédominans et les complications.

GENRE IV. *Scarlatine*. Elle attaque particulièrement les enfans et les adolescents , et paraît dans tous les temps de l'année.

Sporadique, épidémique; elle paraît contagieuse.

Sympt. A ceux des phlegm. aiguës, se joignent une sensation incommode dans la gorge et une gêne dans la déglutition, causées par le gonflement des tonsilles. Le 2^e ou le 3^e jour, taches irrégulières, de couleur écarlate, commençant à paraître à la face, au cou, puis à tout le corps. D'abord disséminées, elles se rapprochent ensuite et causent du prurit. Quelquefois apyrexie après l'éruption, souvent persistance des phénomènes précurseurs; œdème des membres abdominaux. Le 6^e jour, les taches pâlisent, et les symptômes généraux diminuent. Desquamation le 7^e et jours suivants.

L'éruption peut se renouveler jusqu'à trois fois; alors une sueur copieuse, la diarrhée, des urines troubles avec un sédiment abondant terminent la maladie. Elle est aussi sujette à la délitescence et à la métastase.

COMPLICAT. Fièvres primitives, angine gangreneuse.

Trait. Le même que pour la rougeole. Elle est souvent suivie d'anasarque. La convalescence exige les plus grandes précautions.

GENRE V. *Erysipèle.* Cause. Sexe féminin, tempérament bilieux, printemps, automne, certains alimens, insolation, applications irritantes sur la peau.

Sympt. Les signes précurseurs des phlegm. aiguës. Le 2^e ou 3^e jour, tuméfaction de la peau, légère, inégalement circonscrite, avec rougeur vive qui disparaît sous la pression et revient ensuite, chaleur, douleur brûlante et quelquefois fièvre plus ou moins forte. Le 6^e ou 7^e jour, vésicules séreuses, diminution de la douleur et de la tension, formation de croûtes légères qui se détachent du 9^e au 10^e jour. L'érysipèle attaque particulièrement le visage et les membres; il peut être fixe, ambulant, serpigineux, péri-

dique. Il peut aussi se terminer par gangrène ou par ulcération.

COMPLICAT. Embarras gastrique, fièvres primitives, phlegmon.

Trait. Boissons délayantes, adoucissantes, acides; émétique, lorsqu'il y a embarras gastrique; recouvrir la partie d'une légère couche de farine d'avoine ou de froment; rejeter les corps gras et les onguens.

GENRE VI. *Zona*. Paraît tenir de l'érysipèle et de la dartre. Causes éloignées peu connues. On a supposé un miasme spécifique, rien n'en prouve l'existence.

Sympt. Eruption plus ou moins large de pustules très-rapprochées, de couleur blanche ou rouge, occupant un des côtés de la poitrine ou de l'abdomen en forme de demi-ceinture; fièvre, douleur, tension, démangeaison plus ou moins intense.

Durée. Ordinairement de 25 à 30 jours, quelquefois de 40 à 60.

Trait. Boissons délayantes, émétisées;

quelques purgatifs vers la fin ; diète végétale. Appliquer sur les pustules de la farine d'orge ou de froment , ou bien les oindre avec une huile douce , l'huile d'œuf, par exemple.

GENRE VII. *Miliaire. Causes.* Sexe féminin , hystérie , hypochondrie , accouchement récent , lieux bas et humides , toutes les causes débilitantes.

Elle paraît contagieuse.

Sympt. Eruption générale de petits boutons isolés ou groupés , plus distincts au toucher qu'à la vue ; précédée et accompagnée de fièvre et d'une sueur aigreur. Le 2^e jour, au sommet de chaque bouton , petite vésicule remplie d'une liqueur blanche qui devient jaunâtre. Cette vésicule se rompt au bout de 2 ou de 3 jours , et il survient de petites croûtes qui tombent en écailles. Pendant que cette éruption parcourt ses périodes , d'autres petits boutons se développent. On peut être affecté de la miliaire plusieurs fois.

Le pronostic est d'autant plus favorable , que l'éruption est plus tardive.

COMPLICAT. Fièvres primitives , une autre phlegmasie. On doit craindre la délitescence.

Trait. Tenir le malade dans une température moyenne. Prescrire des boissons délayantes et acidulées. S'abstenir des sudorifiques , à moins qu'il n'y ait tendance à une sueur critique.

GENRE VIII. *Urticaire*. Il y en a de plusieurs espèces : ainsi, la *porcelaine*, la *F. ortiée*, etc.

Sympt. Tubercules aplatis, durs , prurigineux , de couleur pâle. Leur disparition subite est accompagnée d'un sentiment de gêne dans la région épigastrique. La chaleur favorise leur développement. Ils existent tantôt sur un point, et tantôt sur un autre, disparaissent pour revenir ensuite, et se terminent par desquamation.

Durée. Quelques heures.

Trait. Aucun moyen curatif particulier.

GENRE IX. *Hydroa*. Dans les pays chauds, peu de personnes en sont exemptes, surtout parmi les enfans. L'exercice et les boissons froides la produisent.

Petits boutons ou petites taches rouges, sensibles et rudes au toucher. Ils ne demandent aucun traitement particulier.

GENRE X. *Teigne*. *Causes*. L'enfance, rarement la jeunesse, la malpropreté, l'abus des farineux, la tristesse, la gale, les scrophules, la syphilis.

Paraît héréditaire. N'est pas contagieuse, à moins qu'il n'y ait déjà prédisposition à cette maladie.

Sympt. Prurit plus ou moins violent, rougeur, épaissement du cuir chevelu, gonflement des glandes de l'occiput et du cou, céphalalgie, éruption de pustules ou de vésicules remplies d'une humeur visqueuse, rougeâtre ou jaunâtre, très-fétide. Ces vésicules se rompent, l'humeur s'écoule, se sèche, agglutine les cheveux, forme des croûtes recouvrant une sanie

infecte qui ronge la peau, détruit le bulbe des cheveux, et menace d'attaquer les os du crâne.

Durée. Indéterminée.

1^{re} ESP. — *Faveuse*. Tubercules arrondis, déprimés à leur centre, d'un jaune gris, formant des croûtes épaisses, qui, après avoir été enlevées, reparaissent.

2^e ESP. — *Granulée*. Tubercules irréguliers, inégaux, bosselés, d'un gris brun.

3^e ESP. — *Furfuracée*. Desquamation légère avec suintement d'une humeur qui, en se desséchant en écailles, ressemble assez bien à du son.

4^e ESP. — *Amiantacée*. Petites écailles très-fines d'une couleur argentine et nacréée, qui entourent les cheveux.

5^e ESP. — *Muqueuse*. Pustules ou vésicules suivies d'ulcérations, qui laissent découler une humeur tenace ressemblant à du miel corrompu.

Trait. Lotions faites avec l'eau mercurielle, la décoction de ciguë; frictions avec

les pommades où entrent le mercure, le soufre, le charbon ; emplâtre de gomme ammoniacque , calotte de goudron. A l'intérieur, diaphorétiques et purgatifs plus ou moins répétés.

GENRE XI. *Plique*. Malpropreté, mauvaise nourriture. Elle affecte particulièrement les Polonais.

Sympt. Suintement d'une humeur ichoreuse et quelquefois sanguinolente, d'une odeur particulière, qui agglutine les cheveux et les poils, et leur fait prendre diverses formes ; ordinairement précédé d'une céphalalgie, de sueurs fétides, de douleurs aux articulations, de vertiges, de picotemens à la racine des cheveux.

Trait. Lotions émollientes ; purgatifs doux, diaphorétiques. Souvent guérison spontanée.

GENRE XII. *Dartres*. *Causes*. Délicatesse de la peau, malpropreté, scorbut, syphilis, scrophules.

Sympt. Eruption prurigineuse, périodique.

que ou continue de petites vésicules ou de pustules qui se rompent et laissent suinter un liquide formant par sa dessiccation des croûtes ou des écailles ; quelquefois ulcération ou destruction de la peau.

1^{re} ESP. — *Furfuracée*. Exfoliations légères de l'épiderme semblables à de la farine ou à du son.

2^e ESP. — *Squammeuse*. Exfoliations plus larges que dans l'espèce précédente.

3^e ESP. — *Crustacée*. Croûtes de forme et de couleur variées, qui tombent plus ou moins promptement, et sont remplacées par d'autres.

4^e ESP. — *Rongeante*. Boutons pustuleux, ou ulcères fournissant un pus ichoreux, augmentant en largeur et en profondeur, et s'étendant quelquefois jusqu'aux muscles et aux os.

5^e ESP. — *Pustuleuse*. Pustules variant par le volume et l'agglomération ; se couvrant d'écailles et de croûtes. Après la chute de ces croûtes, la peau reste plus ou moins rouge.

6^e ESP. — *Phlycténoïde*. Phlyctènes remplies de sérosité ichoreuse, de forme et de grosseur variables, laissant après elles des écailles rougeâtres.

7^e ESP. — *Erythémoïde*. Petits boutons rouges et enflammés, se terminant par desquamation, après un temps plus ou moins long.

Trait. Diaphorétiques, sudorifiques, bains chauds, bains de vapeur; sulfureux et mercuriaux à l'intérieur; et comme topiques; régime végétal, diète blanche.

GENRE XIII. *Gale*. *Causes*. Tous les âges, réunion d'un grand nombre d'individus, malpropreté, contagion.

Sympt. Eruption de boutons qui se convertissent en pustules, d'abord au doigt de la main et dans l'intervalle des doigts, ensuite sur toute la surface du corps, excepté au visage; démangeaison plus ou moins forte, augmentant le soir et par la chaleur; les pustules sont très-petites (*gale familière*); ou très-grosses et confluentes.

avec prurit considérable (*Gale bouton-
née*). Elles sont produites et entretenues
par la présence d'un insecte (*acarus sca-
biei*).

COMPLICAT. Dartres , syphilis.

Trait. Topiques excitans ; mercuriaux ,
sulfureux tant intérieurement qu'extérieu-
rement.

GENRE XIV. *Pemphigus*. *Sympt.* Erup-
tion de vésicules de grosseur et de forme
variables , remplies d'une sérosité jaunâ-
tre , se manifestant sur la peau et quel-
quefois sur les membranes muqueuses ,
et disparaissant au bout de quelques jours.

Affection assez rare , toujours sporadi-
que , quelquefois chronique.

Trait. Diète sévère , boissons délayan-
tes et acidulées au commencement , lé-
gers toniques vers la fin.

GENRE ANNEXE. *Ephélides*. Taches de
grandeur , de forme et de couleur diffé-
rentes , qui surviennent à la peau et en
changent la nature.

1^{re} ESP. — *Lentiforme*. Taches lentiformes , fauves , rousses ou brunes , sans prurit , attaquant particulièrement les parties exposées au soleil ou au feu.

2^e ESP. — *Hépatique*. Taches safranées plus étendues que les précédentes , persistantes ou fugaces , se terminant par desquamation. Elles arrivent le plus souvent au tronc.

3^e ESP. — *Scorbutique*. Taches plus communs étendues , de couleur sale et brunâtre , attaquant le tronc , les parties externes des membres , et quelquefois toute la surface du corps.

GENRE XV. *Psudracia*. Boutons qui changent en pustules. Leur siège et leur marche varient.

Non contagieux.

GENRE XVI. *Pustule maligne*. Elle attaque le plus souvent ceux qui soignent les animaux ou qui travaillent sur quelque-unes de leurs parties : les bouviers , les vétérinaires , les bouchers , les tanneurs.

Contagieuse.

Sympt. 1^{re} période. Prurit incommode, vif et passager; formation d'une petite vésicule séreuse, qui croît peu à peu, prend une teinte brune, se rompt et laisse échapper un peu de sérosité rougeâtre.

2^e période. Cette vésicule fait bientôt place à un tubercule dur, rénitent, mobile, de forme lenticulaire, qui devient brun, s'entoure d'une aréole d'un rouge livide, ou orangée, parsemée de phlyctènes. *3^e période.* Ce tubercule s'étend, forme une escarre gangréneuse qui augmente et s'empare du tissu cellulaire environnant. Alors fièvre de mauvais caractère, symptômes d'adynamie ou d'ataxie, mort après un temps plus ou moins long.

Trait. Détruire le point gangréneux au moyen des scarifications ou des caustiques. A l'intérieur, toniques, amers, fortifiants, vins généreux.

ORDRE II. Phlegm. des membraness muqueuses.

Douleur plus ou moins sourde et grave, langueur, chaleur, augmentation d'épaisseur de la partie affectée; exsudation d'abord supprimée, ensuite augmentée. Le fluide excrété, très-liquide les premiers jours, prend peu à peu la consistance du pus.

Marche. Aiguë ou chronique, avec ou sans fièvre.

GENRE XVII. *Ophthalmie.* *Causes.* Introduction d'un corps étranger entre les paupières, coups, trichiasis, exposition à une vive lumière, habitude de fixer la vue sur des corps luisans ou d'un petit volume; suppression d'affections locales ou générales, d'évacuations habituelles.

Sporadique, épidémique, endémique.

Sympt. Tension et chaleur locales, douleur prurigineuse, augmentant par l'action de la lumière, stries jaunâtres ou rougeâtres.

sur la conjonctive, augmentation ou diminution de la sécrétion des larmes. Le 2^e ou 3^e jour, les symptômes deviennent plus prononcés ; le 9^e, ils diminuent et disparaissent successivement.

Marche. Aiguë ou chronique.

COMPLICAT. Embarras gastrique, F. inflammatoire, F. bilieuse.

Trait. Collyres et cataplasmes, d'abord émolliens, ensuite répercussifs ; saignées sangsues, pédiluves, régime *antiphlogistique*.

GENRE XVIII. *Coryza*. *Causes.* Refroidissement subit et particulièrement des pieds, suppression de la transpiration.

Sympt. Sécheresse des narines, céphalalgie frontale, prurit, pesanteur dans les sinus frontaux, éternuement, larmolement ; suppression dans les premiers temps, puis augmentation de la sécrétion du mucus nasal, qui, de visqueux, limpide, irritant, devient opaque, blanc, jaunâtre et d'une odeur particulière.

Marche. Aiguë ou chronique.

Durée. Quelques jours ordinairement.

Trait. Souvent nul ; quelquefois, fumigations émollientes.

GENRE XIX. *Otite.* *Causes.* Celles des phlegmasies muqueuses, crises des maladies aiguës, métastases, présence d'un corps étranger ou application de substances âcres dans le conduit auditif.

Marche. Aiguë ou chronique.

Durée. 15 à 20 jours et plus.

Sympt. *Otite externe* (O. du conduit auditif), douleur peu intense, bourdonnement et tintement d'oreilles, écoulement d'une matière d'abord ténue et roussâtre, ensuite blanche et opaque, gonflement de la membrane muqueuse, s'étendant quelquefois jusqu'au pavillon de l'oreille, affaiblissement du sens de l'ouïe.

— *Otite interne* (O. de la cavité du tympan). Tintemens d'oreilles ou élancemens obscurs, tension qui s'étend souvent à la trompe d'*Eustachi* ; gêne dans la rotation

du cou , dans la déglutition ; douleurs vives en éternuant , en se mouchant , en toussant ; dureté de l'ouïe , quelquefois surdité vers la fin , toux fêrine , céphalalgie , fièvre le soir , quelquefois insomnie , délire.

Elle se termine souvent par la sortie subite d'une matière fluide par l'oreille ou par la gorge.

Trait. Applications d'abord émollientes , ensuite légèrement stimulantes. Dans l'otite interne , s'il y a inflammation excessive et douleur très-vive , diète , saignée , sangsues , pédiluves , antispasmodiques.

GENRE XX. *Angine gutturale. Causes.* Enfance , adolescence , tempérament sanguin , printemps , automne , vicissitudes atmosphériques , refroidissement subit , boissons à la glace , déglutition de substances irritantes , cris , suppression de certaines évacuations.

Sporadique , épidémique.

Angine tonsillaire : elle attaque les

amygdales ; *angine pharyngée* : elle intéresse le pharynx.

Sympt. Ordinairement précédée d'un mouvement de fièvre ; accompagnée de chaleur et de douleur dans l'arrière-bouche, avec gêne de la déglutition ; rougeur d'une ou des deux tonsilles et du voile du palais ; exsudation muqueuse supprimée, ensuite augmentée ; quelquefois gêne dans la respiration qui ne peut s'exécuter par la bouche.

Durée. 4, 7, 14 jours.

Termin. Résolution ; exsudation d'un mucus opaque et jaunâtre ; quelquefois suppuration ou induration de l'une des amygdales ; métastase sur quelque viscère.

COMPLICAT. F. inflammatoire, F. bilieuse, F. muqueuse ; les autres Phlegmasies catarrhales.

Trait. Diète, saignée, sangsues, vomitifs, lavemens purgatifs, pédiluves irritans, vésicatoires, gargarismes adouciss-

sans, vapeurs émollientes dirigées vers le pharynx.

GENRE XXI. *Angine gutturale gangréneuse.* Causes. Sexe féminin, enfance, adolescence, tempérament lymphatique, toutes les causes débilitantes.

Epidémique, rarement sporadique.

Sympt. Invasion souvent le matin; vertiges, frissons, sentiment de froid qui simule un accès de F. intermittente; ensuite, chaleur vive, céphalalgie, douleur dans le pharynx, gêne dans la rotation du cou; quelquefois nausées, vomissemens, diarrhée; paroxysmes la nuit, gonflement des tonsilles, rougeur du pharynx, tache irrégulière, d'abord blanchâtre, ensuite grise, faisant place à un ulcère ou à une escarre; œdématie érysipélateuse de la face, du cou, de la poitrine; délire, incohérence dans les idées, stupeur, coma, sueur colliquative; pouls très-variable.

Trait. Stimulans, toniques, comme dans les F. adynamique et ataxique. Injec-

tions , gargarismes stimulans et antiseptiques.

GENRE XXII. *Angine trachéale. Causes.*
Celles des autres angines , corps étrangers dans le larynx.

— *Aiguë.* Inflammation de la glotte , du larynx , de la trachée , du commencement des bronches ; douleur dans le conduit aérien ; respiration petite , fréquente , laborieuse ; voix aiguë , glapissante , sifflante ; douleur pendant l'inspiration , toux rauque , suppression puis augmentation de l'expectoration , pouls petit et faible , agitation , anxiété.

Durée. De 3 à 7 jours.

Termin. Suffocation ; résolution annoncée par une expectoration abondante de crachats opaques , par des sueurs générales , par des urines sédimenteuses.

Trait. Boissons mucilagineuses et acidulées , fumigations , fomentations émollientes , sangsues , ventouses scarifiées , vésicatoires , synapismes.

— *Chronique.* 1^{re} période. Fièvre légère, déglutition peu gênée, aridité dans le pharynx, douleur fixe vers la base du sternum, respiration difficile pendant la marche, changement dans la voix. 2^e période. F. lente, douleur de la trachée augmentée, excrétion purulente, toux, voix grêle, déglutition gênée, anxiété, maigreur. 3^e période. Symptômes de la phthisie portée au dernier degré.

Trait. Mucilagineux unis à l'opium, aux antispasmodiques, aux préparations de scille; séton à la nuque, vésicatoires volans au cou.

GENRE XXIII. *Croup. Causes.* L'enfance, surtout depuis 2 ans jusqu'à 7. Saisons froides, refroidissement subit. Il affecte plusieurs fois le même individu.

Sporadique, épidémique.

Sympt. D'abord ceux d'un rhume, tristesse, pouls faible, chaleur augmentée, peu de gêne dans la respiration pendant les premiers jours; ensuite, voix rauque,

inspiration avec un bruit semblable au cri d'un jeune coq ; respiration sifflante, difficile ; douleur au larynx et à la trachée ; toux rauque ; expectoration nulle, puis visqueuse, limpide, enfin opaque et de consistance couenneuse ; pouls fréquent, faible, intermittent ; agitation, anxiété, rémission irrégulière, déglutition libre, haleine inodore.

Durée. 4 ou 5 jours.

Termin. Souvent la suffocation ; quelquefois retour à la santé annoncé par une sueur générale, par des urines troubles, par des déjections, et surtout par l'expectoration facile de mucosités épaisses et couenneuses.

Trait. Puissans dérivatifs : sangsues, ventouses scarifiées, boissons émétisées, pédiluves, lavemens irritans, synapismes, vésicatoires. Faire respirer les vapeurs émollientes, le vinaigre, l'éther.

COMPLICAT. F. inflammatoire, F. bi-

ieuse, Embarras gastrique, Phlegmasies cutanées ou muqueuses.

GENRE XXIV. *Catarrhe pulmonaire.*
I^{re} ESP. — *Aigu.* Causes. Saison froide et humide, passage subit du chaud au froid, suppression d'évacuations habituelles.

Sporadique, épidémique, endémique.

Sympt. Débilité, lassitude, stupeur, assoupissement, respiration fréquente, anxiété, oppression, toux opiniâtre, expectoration muqueuse, quelquefois légèrement teinte de sang, ensuite opaque; peu d'accélération dans le pouls, si ce n'est le soir durant le paroxysme; urines tantôt pâles, tantôt foncées.

Durée. De 4 à 21 jours.

Termin. Crachats opaques, sueur générale, urines sédimenteuses, selles glaireuses; chez les jeunes gens, épistaxis.

Trait. D'abord adoucissans, mucilagineux; ensuite expectorans: ipécacuanha, kermès à petite dose; vers la fin, légers stimulans.

COMPLICAT. Embarras gastrique , F. bilieuse, F. adynamique, F. ataxique, coryza, angine.

2^e ESP. — *Suffocant. Sympt.* Invasion très-rapide , intensité très-grande des symptômes , gêne extrême de la respiration , oppression considérable , sentiment d'ardeur et de gêne au milieu de la poitrine ; crachats nuls, muqueux ou sanguinolens ; pouls très-accéléré , anxiété ; ordinairement mort avant le 7^e jour , à compter du jour où il est devenu suffocant.

Trait. Dérivatifs : saignée , sangsues à l'anus , à la poitrine , vésicatoires volants ou à demeure sur le thorax ; mêmes boissons que dans l'espèce précédente.

3^e ESP. — *chronique* (phthisie muqueuse). Si chez les personnes âgées ou lymphatiques les symptômes précédens diminuent d'intensité , mais que la toux reste et que l'expectoration augmente, la phthisie est imminente. La fièvre hectique se déclare ensuite , si on ne parvient à arrêter les progrès du mal.

Trait. Exutoire, frictions sèches ou aromatiques; polygala, lichen d'Islande, alcornoque, quinquina, *phellandrium* à l'intérieur; moyens hygiéniques.

GENRE XXV. *Gastrite. Causes.* Coups, chutes sur l'épigastre; boissons à la glace; hernie étranglée ou engouée; ingestion de substances âcres; rétropulsion de la goutte, d'exanthèmes.

Sympt. Douleur, chaleur ardente, tension, plénitude dans la région épigastrique; les boissons les plus douces sont rejetées par le vomissement; anxiétés, soif inextinguible; pouls petit, fréquent, inégal; dyspnée, abattement extrême, hoquet, défaillances, convulsions, délire.

Marche Aiguë. Se termine en peu de jours; souvent par la mort. — *Chronique.* Donne souvent lieu au squirrhe ou à la suppuration.

Trait. Adoucissans, mucilagineux. (On ne peut souvent les administrer qu'en lavement.) Si elle est produite par des poi-

sons, neutralisans ; si elle est due à la goutte, dérivatifs.

GENRE XXVI. *Entérite*. Causes. Celles de la gastrite.

Sympt. Tumeur oblongue, rénitente, très-douloureuse, formée par la portion d'intestin enflammée; abdomen rétracté, ensuite tuméfié; soif, vomissement, hoquet, constipation, pouls dur et déprimé, respiration fréquente, urines foncées, anxiété, prostration des forces, convulsions.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. Toutes celles de l'inflammation.

COMPLICAT. Les différens ordres de fièvres.

Trait. Le même que pour la gastrite.

GENRE XXVII. *Diarrhée catarrhale*. Causes. Ingestion de substances âcres, suppression d'une excrétion ; les premiers temps de séjour dans une grande ville.

Sympt. Fréquence et liquidité des dé-

ections alvines , avec des coliques plus ou moins fortes , et épuisement.

Marche. Aiguë ou chronique ; se termine souvent d'une manière heureuse ; quelquefois , suivie d'ulcération , d'induration , de quirrhe des intestins.

Trait. D'abord les adoucissans , ensuite les stimulans et les légers toniques.

GENRE XXVIII. *Dyssenterie. Causes.* Séjour dans les camps , les prisons , les vaisseaux ; habitation dans les lieux marécageux ; saison chaude et pluvieuse.

Epidémique , contagieuse , rarement sporadique.

Sympt. Sentiment de commotion dans l'arc du colon , constipation , légère fièvre , anorexie , ensuite , besoin fréquent d'aller à la selle avec ténesme et tranchées , excrétion de mucosités semblables à de la lavure de viande , ou mêlées de sang.

Durée. 20 à 25 jours.

COMPLICAT. Fièvres primitives.

Trait. Ipécacuanha , lavemens émolliens et opiacés au début ; ensuite, mucilagineux, enfin , doux purgatifs , légers toniques.

GENRE XXIX. *Catarrhe vésical. Causes.* Sexe masculin , âge adulte , vieillesse , diurétiques âcres , métastases , calculs urinaires.

Sympt. Douleur à la vessie et à l'extrémité du gland , lors de l'émission de l'urine ; tension au-dessus du pubis ; urines de couleur variée , répandant une odeur ammoniacale et déposant une mucosité grisâtre qui se colle aux parois du vase.

Marche. Aiguë et continue , chronique et intermittente.

Trait. Boissons adoucissantes et mucilagineuses , injections de même nature , bains de siège ; ensuite légers stimulans. On a conseillé une forte décoction de têtes de pavot en boisson et un séton à la partie interne et supérieure des cuisses.

Le catarrhe vésical chronique est souvent incurable.

GENRE XXX. *Blennorrhagie. Causes.*

Coït avec une personne infectée ; usage des cantharides, des diurétiques âcres, de la pierre ; métastase arthritique, herpétique. Elle se développe presque toujours du 4^e au 8^e jour après un commerce impur.

Sympt. D'abord titillation, prurit au sommet du gland ; ensuite rougeur et gonflement de l'orifice de l'urètre ; écoulement d'une humeur âcre, limpide, verdâtre et puis blanche ; envies d'uriner, douleur brûlante lors de l'émission des urines, érections fréquentes surtout la nuit, quelquefois gonflement des ganglions lymphatiques voisins et des cordons spermatiques.

L'inflammation, ordinairement bornée à la fosse naviculaire, devient quelquefois si intense, qu'elle se propage à toute l'étendue du canal, à la grande et aux petites prostates, à la vessie, aux uretères même ; l'urètre est dur, tendu, douloureux, le pénis recourbé en bas, l'écoule-

ment nul ; il y a ischurie , strangurie.
(*Chaude-pisse cordée.*)

D'autres fois, suppression de l'écoulement par une cause quelconque , fluxion sur un ou sur les deux testicules, qui deviennent gros et douloureux ; l'inflammation se communique au cordon et même au péritoine.
(*Chaude-pisse tombée dans les bourses.*)

Durée. De 2 à 7 semaines et plus.

Marche. Aiguë ou chronique. Celle-ci s'appelle *Blennorrhée*, elle dure plus ou moins long-temps.

Trait. Soutenir les testicules avec un suspensoire ; bains locaux et généraux , repos , diète , boissons délayantes et adoucissantes ; plus tard, stimulans , astringens ; dans quelques cas , antisypilitiques.

COMPLICAT. Très-souvent la syphilis.

GENRE XXXI. *Leucorrhée.* *Causes.* Toutes les fautes commises contre les règles de l'hygiène , masturbation , abus du coït , coups sur la région de l'utérus , mauvaise manœuvre dans l'accouchement , dé-

angement de la menstruation, suppression de toutes les évacuations habituelles, métastases.

Sympt. Ecoulement par le vagin, d'un liquide variable en quantité, en couleur, en consistance; prurit, ardeur en urinant, douleur à l'hypogastre s'étendant aux parties environnantes; souvent fièvre et constipation.

Marche. Aiguë ou chronique. Dans ce dernier cas (*fleurs blanches*), elle est le plus souvent constitutionnelle. Elle s'accompagne de langueur, de pâleur générale, de tiraillemens à l'estomac et de perte d'appétit.

Trait. De la leucorrhée aiguë. Boissons, émolliens, injections, lavemens émolliens, demi-bains.

— *de la leucorrhée chronique.* Exercice, habitation dans les lieux élevés, à la campagne; choix de bons alimens; purgatifs, toniques, aromatiques, ferrugineux.

COMPLICAT. La syphilis.

GENRE XXXII. *Aphthes.* Causes. En-

fance, vicillesse, habitation dans les marais, saisons chaudes et pluvieuses, mauvaise nourriture.

Sympt. Tubercules de différentes couleurs, ordinairement blanchâtres, de la grosseur d'un grain de millet ou de chanvre, se développant sur les lèvres, dans la bouche, dans l'œsophage et quelquefois dans tout le reste du tube intestinal. Ils laissent suinter une humeur séreuse par une petite ouverture située à leur sommet, se détachent et tombent en petits fragmens après un temps indéterminé (*aphthes bénins*). Ils sont quelquefois si nombreux, qu'ils touchent et forment une espèce de croûte qui revêt toute la cavité buccale (*aphthes confluens*.)

Durée. 9 à 10 jours et plus.

Trait. Nourriture douce, boissons adoucissantes; toucher les aphthes avec un pinceau imbibé d'une liqueur résolutive et stimulante. Dans les *aphthes confluens*, mucilagineux, absorbans, magnésie calcinée.

à la dose de 6 à 8 grains répétée deux ou trois fois par jour ; stimulans , légers toniques.

Aphthes des enfans (muguet). Précédés de sommeil , d'agitation dans les muscles de la face ; gêne dans la respiration , prostration des forces , vomissemens , pouls faible ; lorsque le muguet est *confluent* , ardeur dans la bouche , gêne de la déglutition , cris , douleurs vives , dévoiement de matières âcres et vertes qui excorient l'anus ; gangrène des parties affectées.

Termin. Souvent funeste.

Trait. Faire choix d'une bonne nourrice , d'alimens doux ; si cela ne suffit pas , traitement précédent avec des modifications.

COMPLICAT. Souvent F. muqueuse , quelquefois F. adynamique et ataxique.

ORDRE III. Phlegm. des membranes séreuses.

Douleur vive , lancinante , changeant de place , présentant quelquefois des ré-

missions bien marquées , chaleur brûlante avec fièvre ; se terminant par résolution , par des adhérences , par l'épanchement d'un liquide séreux ou puriforme , par gangrène.

Marche. Aiguë ou chronique.

GENRE XXXIII. *Phrénésie. Causes.* Irritation , ustion , application de substances âcres , coups , chutes sur la tête ; écart de régime , passions violentes , suppression des écoulemens de toute espèce , métastase.

Sympt. D'abord dégoût , soif , insomnie , anxiété , malaise ; ensuite douleur sourde à la tête , frissons , horripilation , accroissement de la chaleur , de la douleur qui devient vive et piquante , et augmentée par le toucher ; conjonctive injectée , quelquefois érysipèle à la face ; agitation extrême , sommeil interrompu par des rêves effrayans , pouls dur et vibrant , respiration rare et haute , urine claire , nausées , vomissemens , constipation , trouble des fonctions

tions cérébrales, regard féroce, réponses brusques, emportemens de colère, quelquefois joie excessive.

Durée. De 7 à 9 jours.

Termin. Epanchement dans le crâne ou au-dessous du cuir chevelu. Résolution annoncée par un dévoiement, des urines sédimenteuses, une sueur, une épistaxis abondante; elle est souvent incomplète.

Trait. Saignées du cou, du bras, du pied; artériotomie, pédiluves, synapismes, vésicatoires, applications froides sur la tête, boissons émétisées, purgatifs, calmans, et surtout moyens hygiéniques.

GENRE XXXIV. *Pleurésie. Causés.* Celles des autres phlegmasies; suppression de la transpiration, d'une hémorrhagie habituelle, de la goutte; coups, chutes sur le thorax.

Sympt. Frissons, débilité, lassitudes, chaleur ardente; douleur pongitive à un des côtés du thorax, augmentant par l'inspiration, la toux et la pression; respira-

tion difficile ; inspiration courte , fréquente ;
toux férine ; pouls dur , fort , développé ,
quelquefois petit , concentré ; rougeur des
pommettes ; paroxysmes le soir ou la nuit.

Durée. De 4 à 14 jours et davantage.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. 1°. Résolution annoncée par
les sueurs , le flux hémorrhoidal , des urines
abondantes , des déjections bilieuses , une
légère expectoration ; 2°. passage à l'état
chronique ; 3°. hydrothorax.

Trait. Saignées ; sangsues , ventouses
vésicatoires sur le point douloureux ; bois-
sons adoucissantes et mucilagineuses.

COMPLICAT. Fièvres primitives , les au-
tres phlegmasies.

GENRE XXXV. *Péricardite.* Cause
Tempérament sanguin , suppression de
transpiration et des hémorrhagies habitue-
les , travaux forcés du corps et de l'esprit
usage des boissons à la glace , abus d'
alcooliques ; métastases , coups , chutes sur
la région du cœur.

Sympt. Au début, sensation de chaleur dans tout le côté gauche de la poitrine se concentrant bientôt dans la région du cœur, douleur vive et brûlante, orthopnée, pouls dur, fréquent et rarement irrégulier ; rougeur des pommettes et surtout de la pommette gauche ; vers le 4^e jour, altération de la face, agitation, anxiété, respiration entrecoupée ; pouls petit, fréquent, dur, serré, souvent irrégulier ; défaillances incomplètes, palpitations ; la face s'altère de plus en plus ; la douleur cesse quelquefois ; frissons fugaces, défaillances plus longues, infiltration générale et mort souvent au moment où l'on ne s'y attendait pas.

Marche. Aiguë ou chronique.

Trait. A peu près le même que celui de la pleurésie ; dès le début, saignées copieuses et faites promptement ; ensuite un ou plusieurs vésicatoires sur le point douloureux. Le traitement doit être très-actif.

COMPLICAT. Fièvres primitives, les autres phlegmasies de la poitrine.

GENRE XXXVI. *Péritonite. Causes.*
Tempérament sanguin, compression des viscères abdominaux, suppression des excrétiions et des écoulemens habituels, excès dans le régime; passions violentes, tristes.

Sympt. Horripilations vagues, frisson général, malaise, tremblement, engourdissement des membres, chaleur plus ou moins forte; abdomen douloureux à la plus légère pression, tension des hypochondres, tumeur oblongue et rénitente vers les circonvolutions des intestins; ballonnement, météorisme du ventre; décubitus sur le dos, hoquets, nausées, vomissemens, anxiété, respiration fréquente, inspiration très-pénible, diarrhée ou constipation; pouls dur, serré, fréquent; céphalalgie, pâleur, sueur froide; face grippée, quelquefois animée; regard fixe, audacieux; soif extrême, agitation, insomnie, convulsions, mort.

Durée. De 5 à 10 jours.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. Résolution, suppuration, gan-

grène. La péritonite chronique produit quelquefois l'hydropisie ascite.

Trait. Saignées, sangsues à la vulve et à l'anus, bains tièdes, boissons et lavemens adoucissans; combattre la constipation par de doux laxatifs.

Péritonite des femmes en couche. (F. puerpérale.) *Causes.* Avant l'accouchement, les mêmes que les précédentes. Pendant l'accouchement, travail long et pénible, mauvaises manœuvres, imprudences. Après l'accouchement, visites trop nombreuses, entretiens trop longs, contrariétés, affections tristes ou gaies, imprudences dans le régime, relevailles trop précipitées, impression d'un air froid et humide.

Sympt. Ceux de la péritonite; affaissement des mamelles, suppression des lochies. (Ce dernier symptôme est souvent cause de la maladie.) Ordinairement elle se déclare du 2^e au 9^e jour après l'accouchement; elle peut cependant survenir pendant l'allaitement.

Durée. Marche. Term. Trait. Les mêmes

que dans la péritonite. L'ipécacuanha donné dès le début, a quelquefois fait avorter la maladie.

COMPLICAT. F. gastrique, F. adynamique, métrite.

ORDRE IV. Phlegm. du tissu cellulaire et parenchymateux.

Douleur pulsative ou gravative, tumeur, chaleur habitueuse, tendance à la suppuration ou à l'induration, fièvre plus ou moins forte.

GENRE XXXVII. *Phlegmon. Causes.* Toute cause irritante interne ou externe, chaleur vive, ligatures, coups forts, compressions, blessures, application de substances âcres.

Sympt. Frisson, chaleur générale, soif, fièvre plus ou moins forte, tumeur circonscrite avec ardeur, douleur tensive ou pulsative, rougeur foncée ne disparaissant pas sous l'impression du doigt.

Durée. Indéterminée.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. Résolution, suppuration, induration, gangrène.

Trait. Saignées plus ou moins répétées, diète, boissons acidulées, lavemens adoucissans, cataplasmes émolliens ou maturatifs, selon l'exigence des cas.

COMPLICAT. Embarras gastrique, érysipèle.

GENRE XXXVIII. *Oreillons. Causes.*

Enfance, jeunesse, exposition au froid, à l'humidité; ils affectent rarement deux fois le même individu.

Sporadiques, Epidémiques.

Sympt. Frissons, fièvre; tuméfaction, chaleur, rougeur et douleur tensive au-dessous d'une ou des deux oreilles, s'étendant quelquefois au cou et à la face.

Durée. Ordinairement de 4 jours.

Termin. Résolution, suppuration, induration, délitescence suivie de métastase sur les testicules chez les hommes, sur les

mamelles chez les femmes , et de ces derniers organes quelquefois sur le cerveau.

Trait. Favoriser le développement de la tumeur par des cataplasmes émolliens et maturatifs ; la fixer au moyen d'un vésicatoire ou d'un cautère , si elle tendait à la métastase.

GENRE XXXIX. *Céphalite. Causes.* Celles de la phrénésie.

Sympt. Douleur sourde , vague , profonde , correspondant à un point du crâne , principalement à l'occiput ; sensibilité excessive ou insensibilité de la vue , convulsions de quelques membres , hémiplégie , état comateux ; pouls mou , faible , irrégulier.

Trait. Le même que pour la phrénésie.

GENRE XL. *Péricnemonie. Causes.* Course , danse , lutte , chant , cris , équitation contre le vent , air froid , boissons à la glace.

Sympt. Frisson suivi de chaleur , pouls fréquent et dur , ardeur et douleur dans un

des côtés du thorax , dyspnée , expectoration muqueuse ou sanguinolente , rougeur de la pommette du côté affecté , paroxysmes très-marqués le soir ; quelquefois face très-animée , conjonctives injectées , délire.

Durée. 1 , 2 et 3 septénaires.

Termin. Résolution annoncée 1°. par l'expectoration libre , abondante de crachats blancs , opaques ; 2°. par la diarrhée ; 3°. par l'urine copieuse avec sédiment d'abord rouge , ensuite blanchâtre. Suppuration annoncée par la diminution des phénomènes inflammatoires , l'absence des signes de la résolution , la mollesse du poulx , les horripilations vagues , etc.

Trait. Saignées plus ou moins répétées ; sangsues , ventouses scarifiées , vésicatoires sur le point douloureux ; boissons adouçissantes , potions , lavemens de même nature ; ensuite stimulans et même légers toniques.

COMPLICAT. Fièvres gastrique, adynamique, ataxique; pleurésie, angine, etc.

GENRE XLI. *Cardite. Causes.* Celles de la péricardite. Ces deux maladies existent souvent ensemble.

Sympt. Il est difficile de les distinguer de ceux de la péricardite : cependant ils sont plus intenses, il y a douleur vive, poignante, profonde, dans la région du cœur, et syncopes répétées.

Termin. Souvent suppuration, ulcération, gangrène.

Trait. Celui de la péricardite.

COMPLICAT. Les mêmes que celles de la péricardite.

GENRE XLII. *Hépatite. Causes.* Coups, chutes sur l'hypochondre droit et sur la tête, plaies du foie, grandes fatigues, concrétions biliaires, immersion dans l'eau froide, abus des drastiques ou des émétiques, suppressions d'évacuations habituelles, répercussion de maladies cutanées.

Sympt. Douleur sourde et profonde.

avec sentiment de pesanteur dans l'hypochondre droit et dans l'épigastre , vomissemens bilieux , souvent ictère , urines jaunes , constipation , selles blanches ; si l'inflammation occupe la partie convexe du foie , il y a douleur au-dessus de la clavicule droite ; décubitus impossible sur le côté affecté , respiration difficile ; souvent toux et fièvre.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. Résolution le 7^e jour annoncée par une hémorrhagie de la narine droite , des urines abondantes , la sueur , la diarrhée et quelquefois des vomissemens. Suppuration annoncée par la chaleur incommode , la pesanteur dans l'hypochondre , les frissons , etc. ; gangrène ; induration.

Trait. Saignées , sangsues à l'anus et sur l'hypochondre droit , boissons acidulées et légèrement laxatives.

COMPLICAT. Fièvres inflammatoire , bilieuse ; les autres phlegmasies , une hémorrhagie.

GENRE XLIII. *Splénite. Causes.* Celle de l'hépatite, quelques fièvres intermittentes, abus du quinquina.

Sympt. Tension avec chaleur et tumeur dans l'hypochondre gauche, douleur augmentant par la pression, absence des signes de la néphrite.

GENRE XLIV. *Néphrite. Causes.* Celles des autres phlegmasies de l'ordre : habitude de rester trop long-temps au lit ; danse équestre immodérée, diurétiques âcres, excès de boisson, vie sédentaire, suppression d'une hémorrhagie, calculs rénaux, plaies, contusions.

Sympt. Frisson, refroidissement des pieds et des mains ; douleur pongitive, ardeur brûlante, pesanteur dans la région de l'un ou des deux reins ; nausées, vomissemens bilieux, éructations, fièvre aiguë, urine rouge ou aqueuse, rendue en petite quantité, quelquefois tout-à-fait supprimée, engourdissement de la cuisse, douleur à

vertiges , d'étourdissemens ; accompagnée ordinairement de dilatation et d'immobilité de la pupille. Elle est complète ou incomplète. Presque toujours continue, l'amaurose peut être périodique, lorsqu'elle accompagne une vésanie.

Trait. Le même que pour l'héméralopie ; de plus, frictions éthérées sur les sourcils, sternutatoires, électricité, galvanisme. Elle est souvent incurable.

ORDRE II. Névr. des fonctions cérébrales.

Fonctions cérébrales exaltées, diminuées, perverties ou abolies souvent sans maladie locale bien évidente, avec ou sans fièvre.

1^{er} SOUS-ORDRE. *Affections comateuses.*

Suspension de l'action des sens, de l'entendement, de la locomotion, avec assoupissement profond que la plus vive irritation ne peut faire cesser.

GENRE X. *Apoplexie. Causes. Tempé-*

rament sanguin , excès de table ou du coït , suppression de quelque hémorrhagie , vie sédentaire , chagrins , contention d'esprit ; coups , chutes sur la tête.

Sympt. Signes précurseurs. Tintemens d'oreilles , somnolence , bégaiement accidentel , vertiges , engourdissement des extrémités , légers mouvemens convulsifs , affaiblissement ou perte d'un des sens. L'apoplexie est *faible* ou *imparfaite* : alors , embarras de la langue , distorsion de la bouche , diminution de sensibilité et de contractilité dans une moitié du corps , sensations affaiblies. Elle est *forte* ou *violente* : alors , diminution ou abolition des sensations , stupeur , état comateux , hémiplegie plus ou moins complète , pouls fort et développé , respiration ordinairement stertoreuse. Enfin , on l'appelle *foudroyante* , si la mort survient sur-le-champ.

Trait. Emétique , si elle a lieu après le repas ; saignées générales plus ou moins répétées , artériotomie , ventouses scarifiées.

fiées, boissons émétisées, lavemens irritans, frictions de même nature, synapismes, vésicatoires.

GENRE XI. *Catalepsie. Causes.* Tempérament nerveux et mélancolique, contention d'esprit, travail excessif, vers intestinaux.

Sympt. Privation momentanée et totale du sentiment et du mouvement, battemens du cœur et mouvemens de la respiration presque imperceptibles; les différentes parties du corps conservent la position qu'elles avoient avant l'attaque ou celle qu'on leur donne.

Durée. Indéterminée.

Trait. Pendant les attaques, légères frictions sur les membres; infusion aromatique tiède. Dans l'intervalle, combattre la cause.

GENRE XII. *Epilepsie. Causes.* Enfance, âge adulte; compression, lésions de la tête; hydrocéphale, métastase d'affections cutanées sur le cerveau, frayeur, vers in-

testinaux , dentition difficile , éruption de la variole , affections hystériques et hypochondriaques.

Sympt. Attaque souvent brusque , quelquefois précédée de malaise , de vertiges , d'assoupissement ; perte totale du sentiment , chute rapide , distorsion des yeux , renversement du corps en arrière , convulsions des membres ; les pouces sont dans l'adduction et fortement serrés contre la paume des mains ; gonflement successif de l'abdomen , de la poitrine et du cou ; visage rouge , pourpre ou violet ; bouche écumante ; nul souvenir de ce qui s'est passé après l'attaque qui dure 20 ou 25 minutes , et dont le retour est régulier ou irrégulier , rare ou fréquent.

Trait. Variable selon la cause ; on a obtenu de bons effets de la valériane , du camphre , du quinquina , de l'opium , des feuilles d'oranger , du nitrate d'argent fondu. On peut éloigner les attaques en

faisant respirer les vapeurs ammoniacales , le gaz oxigène , etc.

II^e SOUS-ORDRE. *Vésanies.*

Perversion ou irrégularité dans les fonctions des sens , de l'entendement , de la locomotion.

Idiopathiques ou symptomatiques , continues ou intermittentes.

GENRE XIII. *Hypochondrie. Causes.*

Tempéramens bilieux ou mélancolique, âge mûr , F. intermittente trop tôt supprimée , frayeur , chagrin , ennui , contrariétés ; abus des narcotiques , du coït ; suppression des règles , des hémorroïdes ; affections organiques de l'abdomen.

Sympt. Tension et gonflement de l'estomac et du tube intestinal, pulsations irrégulières dans quelques points de l'abdomen , nausées , alternatives d'anorexie et d'appétit vorace , aversion pour certains alimens , digestions difficiles , flatuosités , éructations , coliques , borborygmes , consti-

tipation ou diarrhée, spasmes de la poitrine, respiration difficile, céphalalgie, vertiges, inquiétudes, anxiétés, tristesse profonde, défiance extrême, terreur panique, caprices variés, trouble dans les idées.

Marche. Continue ou intermittente.

Trait. Peu ou point de médicamens; emploi constant et long-temps prolongé des moyens hygiéniques, séjour à la campagne, société choisie et gaie, exercices de la gymnastique.

GENRE XIV. *Mélancolie. Causes.* Les mêmes que pour l'hypochondrie.

Sympt. Face livide, maigreur générale, pouls lent et concentré, caractère irascible, défiance ombrageuse, terreur, pensées et images lugubres, passion dominante et poussée à l'excès, inactivité, vie sédentaire, quelquefois penchant au suicide, enfin aliénation mentale plus ou moins complète.

Trait. Changer peu à peu le régime de vivre, et les habitudes du malade; s'étudier

à lui faire perdre l'idée principale qui l'occupe ; le recréer, le divertir, le distraire par tout ce que la médecine morale et l'hygiène peuvent fournir de moyens.

GENRE XV. *Manie. Causes.* Ecarts de régime, travaux forcés, insolation, études opiniâtres, veilles prolongées, passions vives, maladies aiguës, blessures à la tête ; suppression des menstrues, des hémorrhoides, de la sécrétion du lait.

Sympt. Manie sans délire. Nulle altération bien sensible de l'entendement ; mais perversion dans les fonctions affectives, avec impulsion aveugle à faire des extravagances et à commettre des actes de fureur. *Manie avec délire ;* lésion d'une ou de plusieurs fonctions de l'entendement, délire sur plusieurs objets avec des émotions tristes ou gaies, extravagantes ou furieuses.

Marche. Continue, intermittente, périodique.

Trait. Il se rapproche de celui de la mé-

lancolie ; saignées, délayans, calmans, mais surtout moyens moraux et hygiéniques.

GENRE XVI. *Démence. Causes.* Souvent innée ; elle peut être produite par intempérance , apoplexie , frayeur vive , chagrin , suppression des lochies , vieillesse.

Sympt. Existence automatique , incohérence dans les idées ; succession rapide d'émotions légères , d'actions isolées et désordonnées , avec entier oubli de ce qui a précédé.

Trait. Variable suivant la cause. La démence sénile est incurable.

GENRE XVII. *Idiotisme. Causes.* Mauvaise conformation du cerveau , joie et frayeur excessives ; usage immodéré des bains , du coït , des saignées , des narcotiques ; apoplexie.

Sympt. Oblitération plus ou moins complète de l'intelligence et des affections de l'âme , taciturnité , aphonie , opiniâtreté ou emportement.

Trait. Il varie selon les causes. L'idiotisme originaire est incurable.

GENRE XVIII. *Somnambulisme. Causes.* Tempérament sanguin et nerveux, adolescence, imagination vive; quelquefois une disposition particulière.

Sympt. Excitation forte de l'imagination pendant le sommeil avec exercice de la locomotion et des facultés intellectuelles, et répétition des actions qu'on a coutume de faire pendant la veille. Quand on est réveillé, nul souvenir de ce qui s'est passé.

Trait. Empêcher que le somnambule ne s'expose dans ses courses nocturnes; tâcher de le réveiller par tous les moyens possibles, lorsqu'il n'est pas dans une situation dangereuse; dans l'intervalle de l'accès, combattre la cause, ordonner des travaux pénibles et fatigans, etc.

Cauchemar. Causes. Pléthore, digestions pénibles, habitude de se coucher sur le dos, hydrocéphale, vers intestinaux, hypochondrie.

Sympt. Difficulté de respirer et sorte de délire pendant le sommeil, avec sentiment d'un poids insupportable qui comprimerait la poitrine ou la région épigastrique ; lassitude et souvent palpitations lors du réveil.

Trait. Variable selon les causes.

GENRE XIX. *Hydrophobie.* Causes : Morsure d'un animal enragé, inoculation, absorption de sa bave (*Hydroph. communiquée*). Frayeur, colère, écarts de régime, insolation, fièvre de mauvaise nature (*Hydroph. spontanée*).

Sympt. Hydroph. spontanée. Elle a lieu immédiatement après que la cause a agi. *Hydroph. communiquée.* Elle ne se développe qu'après 30 ou 40 jours et plus, précédée d'inquiétude, de tristesse, d'anorexie, de recherche de la solitude, d'affections nerveuses variées. Les cicatrices se boursouflent, rougissent, se rouvrent et causent de la douleur ; sentiment d'ardeur et de constriction spasmodique à la gorge ; horreur des liquides.

furieux à leur aspect ainsi qu'à celui des corps brillans ; susceptibilité extrême des sens, visage rouge, chaleur à l'épigastre, respiration gênée ; pouls dur, tendu, inégal ; délire, sputation d'une salive écumeuse, envies de mordre ; mort au milieu des convulsions ou d'une lipothymie.

Durée. 3, 4, rarement 7 jours.

Trait. Avant les premiers accès, cautériser ou exciser le plus tôt possible les parties infectées ; entretenir pendant 40 jours la suppuration au moyen des vésicatoires ; bains, délayans, sudorifiques, antispasmodiques, frictions mercurielles. La rage confirmée est incurable.

ORDRE III. Név. de la locomotion et de la voix.

I^{er} SOUS-ORDRE. *Név. de la locomotion.*

GENRE XX. *Névralgie. Causes.* Impression du froid, suppression de quelque évacuation ; lésion, contusion, compression d'un nerf ou de ses filets.

Sympt. Douleur vive et déchirante , quelquefois pulsative ou avec des élancemens et des tiraillemens , le long du trajet d'un nerf et de ses ramifications , sans rougeur , tension ni gonflement apparens ; fièvre plus ou moins forte , intermittence régulière ou irrégulière. On distingue les névralgies en *frontale* , *sous-orbitaire* , *faciale* , *maxillaire* , *iléo-scrotale* , *fémoropoplitée* , *fémoro-prétibiale* , *plantaire* , *cutito-digitale* , *anomale*.

Trait. Variable selon les circonstances ; les mêmes moyens ont tour à tour réussi et échoué. Elles sont quelquefois incurables.

GENRE XXI. *Tétanos.* *Causes.* Constitution irritable , les premiers jours de la naissance ; certains alimens , chaud ou froid excessifs , affections vives de l'âme , chagrin , frayeur , poisons , vers intestinaux , metastases , plaies avec déchirement des nerfs ou des parties tendineuses , fractures , luxations.

l'aine, rétraction du testicule du côté affecté.

Termin. Résolution vers le 7^e et avant le 15^e jour, par un flux abondant d'urines rousses et épaisses; suppuration; induration; gangrène.

Trait. Boissons mucilagineuses, nitrées; lavemens émolliens, saignées, sangsues à l'anus.

GENRE XLV. *Métrite. Causes.* Manœuvres imprudentes pendant l'accouchement, suppression brusque des menstrues et des lochies, abus du coït, syphilis, âge critique.

Sympt. Invasion subite ou précédée de frisson et de chaleur; ardeur, douleur, pesanteur, tension dans l'hypogastre; face altérée, débilitée, pouls faible et dur, douleur aux mamelles, céphalalgie; diminution, suppression des menstrues ou des lochies; quelquefois vomissement, léger délire, rêvasseries; écoulement rougeâtre par le vagin.

Marche. Aiguë ou chronique.

Termin. Résolution, suppuration, gangrène, induration.

Trait. Saignées, sangsues à la vulve, fomentations émollientes sur l'hypogastre, lavemens de même nature, bains tièdes, bains de vapeur; boissons mucilagineuses.

COMPLICAT. F. gastrique, F. adynamique, Péritonite.

ORDRE V. Phlegm. des tissus musculaire, fibreux et synovial.

Douleur déchirante, augmentée par la distension, le froissement, la contraction; tendance à la métastase et aux retours périodiques, réguliers ou irréguliers.

GENRE XLVI. *Rhumatisme musculaire.*

Causes. Tous les âges, tempérament sanguin, constitution irritable, saisons froides et humides, vicissitudes atmosphériques, exercice forcé, intempérance, refroidissement subit, suppression d'évacuations.

Sympt. D'abord frisson, anxiétés, cha-

leur, pouls dur et fréquent, paroxysmes le soir; ensuite douleur dilacérante fixe ou vague, changeant de place avec promptitude, ayant son siège dans le corps des muscles, augmentant par le moindre mouvement, la moindre secousse; mouvemens de la partie impossibles ou très-douloureux; rarement gonflement et changement de couleur de la peau; quelquefois céphalalgie, rougeur de la face, soif, sécheresse de la peau, insomnie, urine rouge.

Marche. Aiguë ou chronique.

Durée. De 5 à 60 jours.

Termin. Résolution accompagnée de sucurs générales, d'urine briquetée, d'une éruption cutanée, etc. Suppuration ou formation d'une substance gélatineuse dans le corps du muscle.

1^{re} ESP. *Pleurodynie.* Rhumatisme des muscles qui forment les parois de la poitrine. Douleur de côté augmentant par le toucher.

2^e ESP. *Torticolis.* Rhumat. du muscle

sterno-mastoïdien et quelquefois des autres muscles de la partie latérale et postérieure du cou.

3^e ESP. *Lumbago*. Rhumat. des muscles érecteurs de la colonne rachidienne, ayant son siège dans la masse commune au sacro-lombaire et au long dorsal.

4^e ESP. *Sciatique*. Rhumat. ayant son siège dans les muscles fessiers et dans ceux des parties latérales externes et postérieures de la cuisse.

5^e ESP. *Diaphragmite*. Le plus souvent symptômes de la phrénésie : délire gai ou furieux, ris sardonique ; respiration très-difficile, vomissemens, constriction du diaphragme, toux sèche, fièvre continue, pouls tendu et irrégulier.

Trait. Si le rhumatisme est aigu, boissons délayantes, repos, diète sévère, chaleur du lit, quelques bains. S'il est chronique, diaphorétiques à l'intérieur, rubéfiants et vésicatoires à l'extérieur.

GENRE XLVII. *Rhumatisme fibreux*.

Causes. Tous les âges , principalement l'âge adulte et la vieillesse , sexe masculin , saisons froides , variations de l'atmosphère , suppression d'évacuations.

Sympt. Frisson au début ; douleur déchirante , suivant le trajet des parties fibreuses ; suspension du mouvement dans les parties affectées , pouls fréquent et dur , peau chaude et sèche , sécheresse de la bouche , soif , face rouge , insomnie , sécrétions lésées , métastase rapide d'une partie à une autre.

Marche. Aiguë ou chronique.

Durée. De 7 à 60 jours.

Termin. Presque toujours résolution. Il est très-sujet à la récurrence et à devenir chronique.

Trait. Régime antiphlogistique , s'il est aigu. Sudorifiques , bains de vapeurs , rubéfiants , vésicatoires , s'il est chronique.

GENRE XLVIII. *Goutte.* *Causes.* Nourriture animale abondante , suppression d'une hémorrhagie habituelle , abus du vin

et des plaisirs vénériens , vie sédentaire , application à l'étude , veilles prolongées , évacuations excessives. Elle peut être héréditaire , et se transmet souvent alors du grand-père au petit-fils.

Sympt. de l'accès. Invasion ordinairement le soir ou dans la nuit , par une espèce de frisson et de fourmillement dans l'articulation du gros orteil ; ensuite douleur plus ou moins vive , qui diminue à mesure que l'articulation se gonfle et rougit ; tous les soirs , paroxysme , qui chaque jour est moins marqué. Vers la fin de l'accès , sueur plus abondante , urines à sédiment briqueté ; enfin , guérison parfaite. Si la maladie est récente , il ne se forme point de nodus , et le second accès ne revient qu'au bout de deux ou trois ans. Plus ancienne , la maladie se renouvelle plus souvent ; des concrétions d'urate de soude se forment dans les articulations et les gênent dans leurs mouvemens. On appelle *régulière* la goutte qui parcourt ses périodes avec régularité ;

irrégulière, celle dont la marche n'est point uniforme; *atonique*, celle qui se complique de l'atonie de quelque viscère; *rétrograde*, celle qui, se manifestant à une articulation, change de place et se porte tout à coup sur un viscère; *errante*, celle qui passe rapidement d'une articulation à une autre, d'un viscère à une articulation, et réciproquement.

Durée de l'accès. Variant de 15 jours à plusieurs mois, selon le degré d'ancienneté.

Trait. Si la goutte est régulière, couvrir la partie affectée avec des corps propres à y maintenir une douce chaleur, favoriser la transpiration générale, au moyen de boissons légèrement sudorifiques. Si elle se déplaçait et qu'elle attaquât un organe interne, tel que l'estomac, employer les rubéfiants sur la partie primitivement affectée, afin de l'y rappeler. On s'est quelquefois bien trouvé des alcooliques et des rubéfiants, appliqués sur la partie même.

COMPLICAT. Mélancolie, hypochondrie, asthme, scorbut, syphilis, affections cutanées.

CLASSE TROISIÈME.

HÉMORRHAGIES.

Exhalation de sang à la surface de plusieurs tissus, principalement à celle des membranes muqueuses; ordinairement précédée de pesanteur, de tension aux environs de la partie, et de refroidissement des extrémités, et accompagnée d'un pouls vif, plein et quelquefois dur.

Elles peuvent être *constitutionnelles*, *supplémentaires*, *critiques*, *accidentelles*, *passives* ou *actives*.

Lorsqu'elles sont *passives*, les battemens et la force du pouls ne sont point augmentés; elles s'accompagnent toujours de faiblesse générale et ne sont qu'un symptôme de la cachexie scorbutique.

ORDRE I^{er}. Hémorrh. des membranes muqueuses.

Exhalation de sang active ou passive à la surface des membranes muqueuses.

GENRE I. *Epistaxis*. *Causes*. Enfance, jeunesse, tempérament sanguin, bonne chère, abus des boissons spiritueuses, introduction des doigts ou de corps étrangers dans les narines.

Sympt. Refroidissement des pieds et des mains; sentiment de tension, de chaleur, de prurit dans les fosses nasales; céphalalgie, vertiges, éblouissemens, face gonflée; yeux animés, rouges, étincelans; battement des artères carotides et temporales, urine pâle, constipation, écoulement par le nez d'un sang vermeil et prompt à se coaguler.

L'épistaxis *passive* n'est point précédée de congestion locale; elle s'accompagne ordinairement des symptômes de scorbut.

Trait. Ne pas supprimer l'épistaxis ac-

tive modérée, surtout si elle est critique. Si elle est trop abondante, exposer le malade au froid, le tenir dans une position verticale, comprimer la narine affectée; appliquer les réfrigérans autour du nez, aux tempes, au scrotum, au cou, etc. S'il y a fréquentes récidives, régime végétal, boissons acidulées et nitrées, légers purgatifs, saignée du bras. Si elle est passive, applications astringentes telles que le vinaigre, l'acide sulfurique affaibli, la solution alumineuse; quelquefois tamponnement des fosses nasales.

GENRE II. *Hémoptysie*. *Causes*. Jeunesse, mauvaise conformation du thorax, sensibilité et irritabilité excessives, suppression d'hémorrhagies, omission d'une saignée habituelle, cris et chants forcés.

Sympt. Léger refroidissement des extrémités, horripilations, pâleur de la peau, céphalalgie, rougeur des pommettes, toux, dyspnée; titillation à la glotte, sentiment de bouillonnement avec chaleur et pesan-

teur dans la poitrine ; expectoration d'un sang vermeil et écumeux.

Durée. Variable.

Marche. Aiguë ou chronique , souvent périodique. Dans l'hémoptysie *passive* , il n'y a point de symptômes précurseurs.

Trait. Repos , diète , boissons émulsionnées , nitrées , légèrement acidulées ; légers astringens , quelquefois la saignée.

GENRE III. *Hématémèse.* *Causes.* Coups , chutes sur la région épigastrique , purgatif donné à contre-temps , colère , profond chagrin , refroidissement des pieds et des mains , suppression d'une hémorrhagie ou d'une saignée habituelle.

Sympt. Douleur profonde et quelquefois pongitive dans la région épigastrique , refroidissement des extrémités , oppression à l'estomac ; quelquefois syncope , vertiges , éblouissemens , tintemens d'oreilles , etc. Sang variable en quantité , en consistance , en couleur , réjeté par le vomissement et quelquefois par les selles , pur

ou mêlé avec les alimens et les matières fécales.

Marche. Aiguë ou chronique, quelquefois périodique, souvent passive.

Trait. Boissons froides et acidulées, légers astringens et laxatifs, repos, position horizontale, applications froides sur l'épigastre; quelquefois saignée; sangsues à la vulve et à l'anus.

Mélaena. Mêmes causes que l'hématémèse; il n'en diffère que par la couleur du sang qui est plus ou moins noire; il suit ordinairement les fièvres aiguës continues ou intermittentes, et accompagne souvent les altérations de tissu des viscères abdominaux.

Trait. Limonade minérale ou végétale; eau de Rubel unie à une infusion ou à une décoction tonique ou astringente; enfin le traitement convenable aux autres hémorrhagies passives.

GENRE IV. *Flux hémorrhoidal. Causes.* Age mur, vieillesse, tempérament bilieux

et mélancolique , disposition héréditaire , bonne chère , passage de la vie active à l'oisiveté , purgatifs drastiques , colère , tristesse , hypochondrie.

Sympt. Douleurs gravatives et pression dans le dos et les lombes , stupeur des cuisses et des jambes , légers frissons , pâleur , poulx dur et serré , sécheresse de la bouche , céphalalgie , diminution de l'urine , flatuosités , quelquefois selles muqueuses et blanchâtres ; douleur , prurit à l'an us , avec apparition de tubercules livides et douloureux , qui , le plus souvent , laissent écouler une plus ou moins grande quantité de sang. Cet écoulement est ordinairement périodique et sert à conserver la santé. Il ne requiert les soins du médecin que lorsqu'il est excessif et souvent répété : alors il se joint à des symptômes de mauvaise nature et peut faire périr de consommation le malade. Sa suppression est souvent aussi cause de beaucoup d'accidens.

Trait. Si l'écoulement est trop abondant ,

régime végétal , bains froids , position horizontale sur un lit dur , boissons rafraîchissantes et acidulées , doux laxatifs ; applications froides aux lombes , au périnée , à l'intérieur des cuisses. S'il s'est supprimé mal à propos , vapeurs émollientes dirigées vers le rectum , sangsues à l'anus , bains de siège , quelquefois purgatifs drastiques.

GENRE V. *Hématurie*. Causes. Vieillesse , suppression du flux hémorrhoidal ou de quelque autre évacuation sanguine , bonne chère , ivrognerie , pléthore , équitation , usage des cantharides à l'intérieur , chutes et contusions sur les reins , calculs urinaires.

Sympt. Ecoulement de sang par l'urètre , variable en quantité , en consistance et en couleur , selon qu'il vient des reins ou de la vessie. Lorsqu'il vient des reins , anxiété , refroidissement aux mains , douleur dans les lombes et dans la région du pubis , que le cathétérisme ne soulage pas. Lorsque l'hé-

morrhagie vient de la vessie , fréquentes envies d'uriner , ardeur dans la région de l'anus , ténésmes , douleur pongitive vers l'extrémité du pénis , constipation ; quelquefois sentiment de prurit , de tiraillemens , de pression derrière le pubis , augmentant par le moindre mouvement.

L'hématurie est le plus ordinairement passive et de très-longue durée ; le sang peut se coaguler dans la vessie et empêcher plus ou moins l'éjection de l'urine.

Trait. En général celui qui convient à toutes les hémorrhagies passives : boissons froides , acidulées ; applications froides aux lombes , au périnée , au pubis ; éviter ce qui peut irriter les reins et la vessie ; obvier à la constipation par de doux laxatifs.

GENRE VI. *Accidens du flux menstruel.*

Ménorrhagie. Causes. Vie sédentaire , nourriture succulente , abus des liqueurs fortes , exercices violens , frayeur , colère , hystérie , avortement , manœuvres mal dirigées pendant l'accouchement , décolle-

ment d'une portion du placenta, affection organiques de la matrice.

Sympt. Tension et gonflement dans les hypochondres; douleurs dans les régions du dos, des lombes et de l'abdomen, assez semblables à celles qui précèdent l'accouchement; froid des extrémités, pâleur de la face, fréquence du pouls, constipation, écoulement de sang abondant par le vagin; douleur à l'hypogastre, débilité excessive, défaillances, syncopes. Le sang est quelquefois retenu dans la cavité de l'utérus. (*Hémorrhagie interne.*)

Dans la ménorrhagie passive, il n'y a pas de symptômes précurseurs.

Trait. Position horizontale, exposition à l'air frais, boissons froides et acidulées, applications froides aux environs de la matrice, frictions sur la région hypogastrique, terminaison de l'accouchement, délivrance, quelquefois tamponnement.

Aménorrhée. Causes. Très-variées et souvent très-opposées: disposition innée,

pléthore, épuisement, impression du froid, crapule, coït trop souvent répété, frayeur, colère, diverses maladies.

Sympt. Rétention ou suppression du flux menstruel, suivie le plus souvent d'une fièvre, d'une phlegmasie, d'une névrose ou d'une maladie organique; quelquefois remplacé par des hémorrhagies insolites qui ont lieu par les sutures du crâne, les points lacrymaux, les narines, les oreilles, les gencives, les dents, les poumons, les intestins, la vessie, les mamelles, les doigts, la surface des ulcères, des plaies, etc.

Durée. Indéterminée. On l'a vue cesser spontanément, après avoir résisté aux moyens médicaux les mieux dirigés.

Trait. Il varie suivant la cause et suivant les effets qui en résultent. Moyens hygiéniques, boissons acidulées et mucilagineuses, légers toniques, martiaux, narcotiques, pédiluves, bains de siège, sangsues à la vulve, saignées de pied, vapeurs

dirigées vers le vagin , frictions stimulantes vers l'hypogastre , vésicatoires à la partie interne et supérieure des cuisses.

ORDRE II. Hém. des systèmes cutané , cellulaire , synovial.

GENRE VII. *Hémorrhagies du système cutané.*

Causes. Exercices violens et long-temps continués , danse , course , bains de vapeurs. Elles accompagnent quelquefois la fièvre inflammatoire , et particulièrement le scorbut.

Sympt. Sentiment de tension , de chaleur , de rougeur à la partie de la peau qui doit en être le siège ; suintement d'une humeur plus ou moins rouge , qui teint les vêtemens. Cette hémorrhagie peut être *active* ou *passive* , *partielle* ou *générale* ; quand elle est passive , elle n'est point précédée de signes de congestion locale.

GENRE VIII. *Hém. du tissu cellulaire.*
Peu connues. On peut rapporter à ce genre

quelques éphélides scorbutiques et quelques abcès sanguins.

GENRE IX. *Hém. des membranes séreuses.* On a trouvé, dans les ouvertures de cadavres, une sérosité sanguinolente épanchée dans le péricarde, les plèvres, etc.

GENRE X. *Hém. des membranes synoviales.* Peu ou point connues.

CLASSE QUATRIÈME.

NÉVROSES.

Lésions de la sensibilité et de la contractilité, sans fièvre idiopathique, ni inflammation, ni lésion de structure apparente, essentielles.

ORDRE I^{er}. Névr. des sens.

Sensibilité augmentée, diminuée, pervertie ou abolie.

I^{er} SOUS-ORDRE. *Névr. de l'ouïe.*

GENRE I. *Dysécée. Causes.* Eternuement fréquens, sons bruyans des cloches, du canon; efforts pour jouer des instrumens; vent, vomissemens produits par le mal de mer, grossesse, bains chauds, chagrins, métastases.

Sympt. Audition plus ou moins faible de sons souvent très-forts. C'est la surdité commençante.

Trait. Légers stimulans appliqués dans le conduit auditif, vésicatoires derrière les oreilles, séton à la nuque, électricité, galvanisme. On diminue cette incommodité au moyen des cornets acoustiques.

GENRE II. *Paracousie. Causes.* Celles de la dysécée.

Sympt. Audition confuse des sons forts et aigus, douleur lorsqu'ils sont discordans. Quelquefois les sons les plus faibles sont entendus, lorsqu'en même temps on frappe fortement un corps sonore. Le son

peut être en même temps perçu d'une manière exacte par une oreille, et inexacte par l'autre.

Trait. Il varie selon la cause ; cette affection le plus souvent accompagne le cataracte de l'oreille et disparaît avec lui.

GENRE III. *Tintouin. Causes.* Celles des affections précédentes ; de plus, pléthore, débilité provenant de l'inaction, des excès du coït, d'une longue maladie.

Sympt. Audition d'un son importun, imaginaire : comme d'un coup de fusil, d'une roue qui tourne, d'une cloche, de l'eau qui tombe en cascade, etc.

Trait. Avoir égard à la cause qui l'entretient ; si c'est la débilité, fortifiants, anaphoriques ; si c'est la pléthore, saignées, évacuans.

GENRE IV. *Surdité. Causes.* Les mêmes que dans les affections précédentes ; de plus, absence, atrophie, compression du nerf acoustique ; destruction totale de la membrane du tympan.

Sympt. Abolition complète, persistante ou momentanée des fonctions de l'ouïe. Les sons les plus forts, les plus long-temps continués, comme les plus faibles, ne peuvent être entendus.

Trait. Si la surdité dépend d'un vice organique, elle est incurable. Si elle vient de métastase, rappeler la maladie primitive.

II^e SOUS-ORDRE. *Névr. de la vue.*

GENRE V. *Berlue.* Causes. Exposition à l'ardeur du soleil, habitude de regarder à la loupe ou au microscope des corps très-petits, pléthore, suppression de quelque hémorrhagie habituelle, cataracte commençante.

Sympt. On croit voir de petits corps voltigeant dans l'air, tels que des mouches, des plumes, des toiles d'araignées.

Trait. Il varie selon la cause. Si c'est la pléthore, saignée, régime doux, boissons délayantes. Si elle vient de l'expo-

sition à l'ardeur du soleil, lotions froides sur les yeux, sur la tête.

GENRE VI. *Diplopie*. *Causes*. Ivresse, usage des narcotiques, frayeur, coups sur la tête.

Sympt. Le malade voit les objets doubles, triples, quadruples, etc.

Trait. Variant selon la cause.

GENRE VII. *Héméralopie*. *Causes*. Age avancé, immobilité de la pupille, sensibilité moindre de la rétine, habitude de regarder les corps brillans.

Sympt. On ne peut voir que les objets exposés à une grande lumière, la vue devient confuse à mesure que le soleil descend à l'horizon, et s'éteint tout-à-fait lorsqu'il fait nuit; cette affection est le commencement de l'amaurose.

Trait. Emétiques; vésicatoires, séton à nuque; vapeurs ammoniacales ou sulfureuses dirigées vers la conjonctive; quinquina uni à la valériane. Si elle dépend de

la suppression de la transpiration, sudorifiques.

GENRE VIII. *Nyctalopie. Causes.* Sensibilité très-grande de la rétine, dépendant le plus souvent de l'habitation dans des lieux sombres.

Sympt. Le malade distingue facilement les objets lorsqu'ils sont peu éclairés, même dans les ténèbres; il ne peut les regarder lorsque la lumière est vive.

Trait. Applications narcotiques sur l'œil saignées.

GENRE IX. *Amaurose. Causes.* Action des narcotiques, chagrins, veilles, études opiniâtres, impression continue d'une lumière vive, colère, pléthore, fièvre continue ou intermittente, affections hystériques, blessures des sourcils et du front, coups sur la tête, abus du coït, métastases.

Sympt. Abolition de la vue sans vice organique manifeste; quelquefois subite, d'autrefois précédée de céphalalgie, et

Sympt. Invasion brusque ou lente. Dans ce dernier cas , bâillemens , douleurs variées , ptyalisme , syncope , tremblement des membres ; ensuite contraction forte et involontaire des muscles élévateurs de la mâchoire (*trismus*) , des extenseurs du tronc (*opisthotonos*) , des fléchisseurs (*emprosthotonos*) , des muscles , d'un seul côté du corps (*pleurosthotonos*) , sans alternative de relâchement , accompagnée de fièvre et quelquefois de délire.

Trait. Antispasmodiques , sudorifiques , quinquina , opium à forte dose , musc , mercure , bains chauds alcalins.

GENRE XXII. *Convulsions. Causes.* Drastiques , vomitifs , poisons , vapeurs délétères , éruption de la variole , vers intestinaux , dentition difficile , rétention du méconium , couches laborieuses , suppression d'hémorrhagies ou d'exanthèmes , plaies , luxations , fractures.

Sympt. Contraction d'un , de plusieurs ou de tous les muscles avec état alternatif

de relâchement, sans perte de connoissance, quelquefois avec délire passager. Elle est habituelle ou accidentelle, continue ou intermittente, avec paroxysmes réguliers ou irréguliers.

Trait. Variable suivant la cause : antispasmodiques, toniques, astringens, révulsifs, etc.

GENRE XXIII. *Chorée. Sympt.* Sorte de mélange de paralysie et de convulsions, qui n'attaque guère que les jeunes gens aux approches de la puberté ; caractérisée par une espèce d'idiotisme avec gesticulations irrégulières et involontaires des différentes parties du corps ; souvent simple faiblesse et traction de l'une des jambes.

Trait. Saignées, purgatifs, assa-fœtida, camphre, quinquina, nitrate d'argent, bains, électricité.

GENRE XXIV. *Paralysie. Causes.* Pléthore, froid ; suppression d'une saignée, d'une hémorrhagie, d'un exanthème ; narcotiques, ivresse, lésions du crâne, apo-

plexie; lésions du cerveau, de la moelle rachidienne; d'un nerf, d'un muscle.

Sympt. Diminution plus ou moins grande ou abolition de la contractilité musculaire et quelquefois de la sensibilité d'une partie (*paralysie partielle*), de tout un côté du corps (*hémiplegie*), des parties inférieures du tronc et des membres abdominaux (*paraplégie*).

Trait. Stimulans, toniques, frictions irritantes, eaux thermales, galvanisme, respiration du gaz oxygène uni à l'air atmosphérique.

II^e SOUS-ORDRE. *Névr. de la voix.*

GENRE XXV. *Voix convulsive. Sympt.* D'abord difficulté plus ou moins grande de parler, ensuite succession de sons discordans.

GENRE XXVI. *Aphonie nerveuse. Sympt.* Abolition totale de la voix.

Trait. Les causes de ces deux affections sont peu connues. On peut essayer les vé-

sicatoires, le moxa à la nuque ; faire respirer les antispasmodiques , tels que le camphre , l'éther.

ORDRE IV.

I^{er} SOUS-ORDRE. *Névr. de la digestion.*

GENRE XXVII. *Spasme de l'œsophage.*

Causes. Usage des boissons froides , de mauvais goût extrême ; irritation portée dans l'œsophage , l'estomac ou les intestins.

Sympt. Déglutition difficile , douloureuse , souvent impossible , avec sentiment de constriction dans le pharynx ou l'œsophage ; quelquefois vomissemens.

Trait. Sédatifs à l'extérieur ou en lavement si le malade ne peut avaler , vésicatoire à la partie antérieure du cou.

GENRE XXVIII. *Cardialgie. Causes.*

Allaitement trop long-tems continué , poisons , émétique , drastiques , affections vives de l'âme , suppression des règles et des hé-

morrhoides, dyssenterie, vers intestinaux, métastases.

Sympt. Anxiété et resserrement douloureux dans l'épigastre, souvent lipothymie. La *gastrodynie* en diffère en ce qu'il n'y a point de lipothymie.

Trait. Combattre les causes; on a préconisé l'oxide de bysmuth à l'intérieur. Le traitement de la *gastrodynie* est en général le même.

GENRE XXIX. *Pyrosis. Causes.* Viandes salées et fumées, corps sucrés et fermentescibles. Elle est souvent symptomatique.

Sympt. Douleur ardente dans l'estomac, le long de l'œsophage, jusqu'au pharynx et à la bouche, suivie d'éruetation d'un liquide limpide et souvent acide.

Trait. Boissons mucilagineuses, nitrées, magnésie pure, viande fraîche, lait.

GENRE XXX. *Vomissement spasmodique.*

Causes. Présence de matières étrangères dans quelques points du tube alimentaire, grossesse, hernie étranglée, calcul dans

les uretères , chute sur la tête , éruption de la variole , métastase.

Sympt. Rejet par la bouche des matières contenues dans l'estomac , avec contractions plus ou moins fortes du diaphragme et des muscles abdominaux , souvent précédé d'anxiétés , de douleur à l'épigastre et de hoquet.

Trait. Ether sulfurique , extrait gommeux d'opium , eau de fleurs d'orange , gaz acide carbonique , columbo ; vésicatoire sur l'épigastre , si les convulsions sont fortes.

GENRE XXXI. *Dyspepsie. Causes.* Flatuosités , excès des alimens , leucorrhée coït immodéré.

Sympt. Digestion lente , pénible , souvent douloureuse , accompagnée de lésions locales ou générales.

Trait. Emploi bien ordonné des alimens , exercice , amers , aromatiques , ferrugineux.

GENRE XXXII. *Boulimie. Causes.* Exer-

cice forcé, vers intestinaux, F. intermittente, convalescence.

Sympt. Faim insatiable ou envie de manger une plus grande quantité d'alimens que l'estomac n'en peut digérer.

Trait. Sage distribution des alimens; elle cesse souvent d'elle-même.

GENRE XXXIII. *Pica. Causes.* Enfance, chlorose, grossesse, scorbut.

Sympt. Aversion pour les alimens dont on faisait journellement usage; désir de ceux qu'on ne pouvait souffrir. *Malacia*, désir de manger des substances qui ne sont pas nutritives.

Trait. Combattre les causes.

GENRE XXXIV. *Colique nerveuse. Causes.* Froid, suppression d'évacuations ou d'exanthèmes, flatuosités, corps étrangers dans les intestins.

Sympt. Sentiment douloureux de tiraillement dans l'ombilic ou dans le trajet du colon, n'augmentant point par la pression et quelquefois diminué par elle.

Trait. Antispasmodiques : éther, extrait gommeux d'opium, lavemens émolliens.

GENRE XXXV. *Colique de plomb. Causes.* On l'observe chez les individus qui travaillent le plomb : peintres en bâtimens, plombiers, fondeurs, potiers d'étain, mineurs, etc. ; chez ceux qui font usage de vins falsifiés avec la litharge, de vaisseaux de plomb pour préparer leurs mets.

Sympt. Douleur abdominale sourde, déjections alvines difficiles et douloureuses, constipation, tranchées surtout vers l'ombilic ; abdomen rétracté, mais peu douloureux au toucher ; nausées, vomissemens, excrétion de l'urine difficile ou impossible, pouls dur et lent, respiration gênée ; quelquefois douleurs vagues, paralysie, tremblemens, convulsions, surtout des membres thorachiques.

Durée. 7 à 8 jours. Quelquefois elle est suivie de fièvre lente.

Trait. On a conseillé les adoucissans, les mucilagineux, les antispasmodiques,

surtout dans la première période. Le meilleur traitement est celui de la Charité de Paris. (*Voyez remède contre la colique des peintres*, 2^e part., 2^e sect.)

GENRE XXXVI. *Iléus nerveux. Causes.* Vers, corps étrangers dans les intestins; hernie étranglée, endurcissement des matières fécales, coups et chutes sur l'abdomen, affections vives, métastases.

Sympt. Vomissemens répétés des matières contenues dans le canal alimentaire avec constipation, anxiété, douleur répondant à l'ombilic ou au trajet du colon.

Trait. Antispasmodiques comme dans la colique nerveuse; combattre la constipation par des lavemens émolliens, ensuite purgatifs.

II^e SOUS-ORDRE. *Névr. de la respiration.*

GENRE XXXVII. *Asthme convulsif. Causes.* Dérangement du flux menstruel ou hémorrhoidal, saignée habituelle né-

gligée, hypochondrie, répercussion d'un exanthème, goutte.

Sympt. Accès souvent le soir ou la nuit ; invasion subite, resserrement de poitrine, besoin de se tenir debout et de respirer un air frais, inspiration et expiration sifflantes, embarras dans la langue, pouls naturel ou légèrement fébrile, urine abondante et claire, face diversement altérée ; ces symptômes subsistent, quoique portés à un moindre degré, pendant le cours de l'accès qui dure toute la nuit et une partie de la matinée ; rémission incomplète dans l'après-midi ; le paroxysme revient vers minuit ; rémissions de plus en plus marquées, surtout lorsque l'expectoration est copieuse vers le déclin de l'accès.

Trait. Antispasmodiques, fumigations émollientes et narcotiques dirigées vers la trachée-artère, respiration du gaz oxygène pur ou mêlé à l'air atmosphérique, boissons rafraîchissantes, nourriture douce, équitation, navigation.

GENRE XXXVIII. *Coqueluche. Causes.* Enfance, constitution détériorée, hypochondrie, répercussion d'un exanthème, embarras des premières voies. Sporadique, souvent épidémique, elle n'attaque qu'une fois dans la vie.

Sympt. Pendant 15 ou 20 jours, ceux d'un catarrhe pulmonaire; ensuite *quintes* de toux périodiques, suivies d'expectoration ou de vomissement, de mucosités ou de sérosités; accompagnées de hoquet, rougeur du visage, battement des artères, difficulté de respirer, inspiration sonore, menaces de suffocation, excrétion involontaire des urines et des matières fécales.

Durée. De 1 à 3 mois et plus.

Trait. Vomitifs à petite dose pour provoquer des nausées, doux laxatifs; on a recommandé le musc, l'assa-fœtida, la ciguë, les cantharides. Un vésicatoire sur un des côtés de la poitrine a été utile.

GENRE XXXIX. *Asphyxie. Causes.* Débilité du nouveau-né, ainas des mucos-

sités dans les bronches, *submersion*, *strangulation*, *respiration de gaz délétères*, tels que l'azote, l'hydrogène, l'hydrogène carboné ou sulfuré; émanations des fosses d'aisance, des cimetières, des usines et des marais.

Sympt. D'abord, vertiges, céphalalgie, délire, convulsions, (suivant la cause de l'accident), diminution et altération de la circulation et de la respiration; ensuite, suspension totale de ces mêmes fonctions et de celles du cerveau, membres flasques (excepté dans l'asph. par submersion); face livide et gonflée, extérieur du corps froid.

Trait. Exposer le malade à l'air libre, réveiller l'action des organes pulmonaires par des odeurs fortes, introduire de l'air atmosphérique ou du gaz oxygène dans la bouche, asperger d'eau froide la face et la poitrine, introduire dans la bouche un corps sapide; frictions sèches ou aromatiques, électricité, galvanisme.

— *de l'asph. par submersion.* Transporter le plus tôt possible le noyé dans un lieu commode, le déshabiller sans secousse, le coucher enveloppé dans une couverture auprès du feu; appliquer un corps chaud aux pieds; faire des frictions avec une flanelle sèche ou imbibée d'alcool camphré ou d'ammoniaque; mettre dans la bouche quelques gouttes de vin chaud ou d'eau-de-vie; introduire de l'air dans les poumons; chatouiller les narines avec les barbes d'une plume, la fumée de tabac ou l'ammoniaque; stimuler les gros intestins par des lavemens irritans ou des fumigations de tabac; saigner s'il y a encore de la chaleur, et que la face soit rouge ou violette.

— *de l'asph. par strangulation.* Si l'épanchement de la sérosité ou du sang dans le crâne n'est point formé, saignée du cou ou du bras, frictions, liqueurs alcooliques dans la bouche, irritation des narines et du pharynx, bains chauds.

— *de l'asph. par les gaz délétères.* Eloigner le malade du lieu méphytisé, l'exposer à l'air, le déshabiller, l'asperger d'eau froide, faire avaler de l'eau et du vinaigre, administrer des lavemens irritans, irriter les narines, faire inspirer les gaz oxygène ou acide muriatique oxygéné, recourir à l'électricité ou au galvanisme. Ce traitement doit être très-actif.

— *de l'asph. des nouveaux-nés.* Eloigner ce qui empêche l'accès de l'air dans les poumons, placer l'enfant sur le côté, irriter le nez et la bouche; frictions, insufflations répétées de l'air par les narines, bains chauds.

III^e SOUS-ORDRE. *Névr. de la circulation.*

GENRE XL. *Palpitations nerveuses.*
Causes. Sexe féminin, enfance, tempérament nerveux, affections vives, antipathie, toutes les causes affaiblissantes.

Sympt. Battemens du cœur, forts, pré-

cipités, irréguliers, de peu de durée, se renouvelant facilement.

Trait. Dans les intermissions, éloigner les causes ; dans l'accès, antispasmodiques et moyens hygiéniques.

GENRE XLI. *Syncope.* *Causes.* Celles du genre précédent, dégoût, frayeur, vers intestinaux, inanition, évacuation d'une grande quantité de sang, de pus ou de sérosité ; elle est souvent un symptôme de maladie du cœur ou des gros vaisseaux.

Sympt. Diminution ou suspension de l'action du cœur, de la respiration, des sensations, de la locomotion et des autres fonctions ; précédée de malaise, de pâleur de la face, de faiblesse, de vertiges ; suivie d'anxiété dans la région du cœur, de vomissemens et même de convulsions.

Trait. Exposer le malade à l'air, ôter toutes les ligatures ; aspersions d'eau froide au visage, respiration des vapeurs irritantes.

ORDRE V. Név. de la génération.

I^r SOUS-ORDRE. Név. des fonctions génitales de l'homme.

GENRE XLII. *Anaphrodisie. Causes.* Attouchemens fréquens du pénis, surtout avant la puberté; masturbation, imagination frappée, amour violent, paralysie des muscles érecteurs, toutes les causes débilitantes.

Sympt. Faiblesse extrême ou impossibilité de l'érection du pénis, sensibilité extrême, éjaculation du sperme à la moindre irritation.

Trait. Variable selon les causes : continence, exercice, toniques, bonne nourriture.

GENRE XLIII. *Dispermatisme. Causes.* Érection trop forte, vieillesse, masturbation.

Sympt. Lenteur ou empêchement de l'éjaculation dans le coït, l'homme jouissant d'ailleurs des attributs de la virilité.

Trait. Variable : s'il tient à trop de vigueur, bains tièdes, camphre.

GENRE XLIV. *Satyriasis. Causes.* Abstinence ou abus du coït, puberté prompte ou tardive, crétinisme, malpropreté, affection dartreuse des parties génitales.

Sympt. Désir effréné du coït, faculté de le répéter souvent sans épuisement ; fureur extrême, si ce penchant est contrarié.

Trait. Moyens hygiéniques, habitation à la campagne, étude, promenade, saignée, bains chauds, cataplasmes émolliens, boissons rafraîchissantes, camphre. Eloigner les objets lascifs ; s'il y a débilité, toniques.

GENRE XLV. *Priapisme. Causes.* Vésicatoires, usage des cantharides à l'intérieur, calculs urinaires, blennorrhagie.

Sympt. Erection forte et douloureuse du pénis, sentiment d'ardeur brûlante, nul penchant pour le coït.

Trait. Supprimer les vésicatoires ou l'usage des cantharides ; boissons et lave-

mens mucilagineux, bains de siège, sangsues au périnée ; s'il est causé par un calcul, *lithotomie*.

II^e SOUS-ORDRE. *Névr. des fonctions génitales de la femme.*

GENRE XLVI. *Nymphomanie. Causes.* Puberté, lectures lascives, retraite, masturbation, affection dartreuse des parties génitales.

Sympt. 1^{er} degré. Idées lascives et obscènes, tristesse, inquiétude, taciturnité, perte du sommeil et de l'appétit ; combat entre la pudeur et les désirs effrénés. 2^e degré. Oubli de la pudeur et de la bienséance : regards, propos, gestes indécens ; sollicitations et instances à l'approche d'un homme. 3^e degré. Obscénité dégoûtante, fureur aveugle, chaleur brûlante sans fièvre, enfin délire maniaque.

Trait. Moyens hygiéniques, habitation à la campagne, étude, exercice, nourriture douce et végétale, bains tièdes, boissons

nitrées , camphre , nénuphar. Proscrire les bals et les réunions , éloigner toutes les causes du mal.

GENRE XLVII. *Hystérie. Causes.* Tempérament nerveux , abus du coït , affections vives et fréquentes , conversations et lectures voluptueuses , veuvage , suppression d'un écoulement habituel ou périodique.

Sympt. Accès subit ou précédé de bâillemens , de vertiges , de pleurs et de ris involontaires , de rougeur et de pâleur alternatives de la face ; ensuite sentiment d'une boule qui semble partir de l'utérus , rouler dans l'abdomen , monter à la poitrine et jusqu'à la gorge , avec suffocation et strangulation ; suivant le degré du mal , convulsions , syncope , dyspnée , grandes variétés dans la sensibilité , la contractilité , la caloricité.

Durée de l'accès. Depuis quelques minutes jusqu'à plusieurs jours.

Trait. Moyens hygiéniques , antispas-

modiques : assa-fœtida , castoréum , etc..
Eloigner les causes.

COMPLICAT. Hypochondrie, mélancolie, épilepsie.

CLASSE CINQUIÈME.

LÉSIONS ORGANIQUES.

Changement dans la figure , le volume ou le poids des organes, et dégénérescence de leur tissu.

ORDRE I^{er}. Lésions organiques générales.

GENRE I. *Syphilis*. Elle se communique par contact immédiat aux parties génitales, à l'anūs , à la bouche , aux mamelles. Elle peut être d'abord locale et ensuite générale.

Sympt. I^{re} période. A la partie infectée, un ou plusieurs petits ulcères enflammés, d'où il sort un pus ichoreux. Si c'est à la

bouche, il s'y forme un et rarement plusieurs ulcères, dont le fond est d'un blanc sale, les bords durs, comme déchirés et coupés à pic; presque toujours au voisinage, bubons suppurés; taches sur la peau; pustules d'abord transparentes, ensuite couvertes de croûtes; végétations diverses, appelées, suivant leur forme, *crêtes*, *candylomes*, *poireaux*, *choux-fleurs*, etc.

2^e période. Les parties situées profondément s'affectent; il y a alors *périostoses*, *exostoses*, douleurs ostéocopes et rhumatismales nocturnes; ulcérations dans le conduit auditif, dans les fosses nasales.

3^e période. Augmentation des douleurs ostéocopes, carie, nécrose, ramollissement des os, suppuration abondante; quelquefois affection d'un organe important, fièvre hectique, mort.

Trait. Vérole récente. Mercuriaux en friction, en boisson, en pilules; régime doux, bains chauds, boissons diaphorétiques.

Vérole invétérée. Fortes décoctions sudo-

rifiques, quelquefois unies aux mercuriaux.

GENRE II. *Scorbut*. *Causes*. Mauvaise nourriture, salaisons, disette, maladies longues, fatigues, affections tristes, nostalgie, humidité, air corrompu, malpropreté.

Sympt. 1^{re} période. Visage pâle ou livide, lassitude et débilité générales, paresse, douleurs vagues; gencives rouges, tuméfiées et saignantes; éphélides, rouges bleues et livides sur différentes parties du corps. 2^e période. Impossibilité de marcher, contraction des muscles fléchisseurs des jambes, enflure des extrémités, syncopes fréquentes, hémorrhagies passives variées; gencives fongueuses et douloureuses, bouche fétide, induration du tissu cellulaire des jambes, ulcérations douloureuses de ces mêmes parties. 3^e période. Ulcères sordides et fongueux des jambes, fournissant une sanie fétide; adynamie, sueurs fétides, pétéchies, hémorrhagies passives copieuses et fréquentes, caries plus ou moins profondes, fièvre hectique, mort

Trait. Sucrs et préparations où entrent les crucifères, sudorifiques, quinquina et autres amers, emploi sage des règles de l'hygiène, habitation à la campagne, distraction, bonne nourriture, vin généreux.

GENRE III. *Gangrène. Causes.* Ligatures, compression des gros vaisseaux, contusions des nerfs ou de la moelle rachidienne, congélation, inflammation violente, plaies, fractures, luxations, pression long-temps continuée sur une partie, fièvres de mauvais caractère, scorbut, variole confluente, vieillesse, mauvaise nourriture, seigle ergoté.

Sympt. Mort partielle; couleur pâle, cendrée, livide, noire, et consistance molle de la partie, avec phlyctènes remplies d'un liquide ichoreux et rougeâtre, d'une odeur particulière. On appelle *escarre* la gangrène de la peau; *sphacèle*, celle de toute l'épaisseur d'un membre; ici, il y a insomnie, petitesse du pouls, sueur froide et

gluante, syncope, délire, coma, mort ; la gangrène ne borne pas ses progrès.

Trait. S'il y a inflammation excessive, saignées, delayans, diète sévère ; si la congélation en était cause, frictions successivement avec la neige, la glace, l'eau froide, dont on augmentera par degrés la température, cordiaux à l'intérieur ; si elle dépend d'une cause délétère et qu'il y ait fièvre adynamique (voyez le traitement de la pustule maligne).

GENRE IV. *Cancer.* Causes. Age critique, suppression de quelques évacuations, contusion de différentes glandes, et peut-être disposition héréditaire ou particulière de l'individu.

Sympt. D'abord éruption particulière, ulcération, ou tumeur dure, indolente, circonscrite, sans changement de couleur de la peau (*squirrhe*) ; ensuite douleur lancinante, chaleur ardente de la partie, formation d'un ulcère douloureux à bords renversés, à fond inégal, fongueux et livide.

laissant écouler un ichor fétide, saignant facilement, et qui tend à s'élargir; état variqueux des vaisseaux voisins, couleur jaune et plombée de la face, fièvre hectique.

1^{re} ESP. *Cancer de l'œsophage.* Tumeur et rétrécissement de ce conduit, déglutition gênée, vomissement muqueux et fétide.

2^e ESP. — *de l'estomac.* Tumeurs vers le *cardia* ou le *pylore*, rots acides, vomissement des alimens quelque temps après le repas. Dans la suite, les matières vomies sont visqueuses, brunâtres, noirâtres et très-fétides.

3^e ESP. — *des intestins.* Tumeur souvent sensible au toucher; d'abord constipation opiniâtre, ensuite diarrhée purulente, ichoreuse, mêlée de sang.

4^e ESP. — *de l'utérus.* Tumeur à l'orifice de l'utérus, dure, rénitente, indolente, ensuite douloureuse au toucher; écoulement de sanie et d'ichor très-fétides par le vagin.

Trait. Extirper le cancer externe de la cause externe non adhérent, si le malade se porte bien d'ailleurs. Si l'extirpation est impossible, mucilagineux, calmans, narcotiques, nourriture végétale, lait, applications sédatives.

GENRE V. *Tubercules*. Ils affectent presque toutes les parties du corps et particulièrement quelques viscères. Tumeurs plus ou moins volumineuses, simples ou agglomérées, enkystées ou non enkystées, formées d'une substance qui a la consistance de l'albumine ou du plâtre, susceptibles d'entrer en suppuration après un temps plus ou moins long.

1^{re} ESP. *Phthisie pulmonaire tuberculeuse*. *Causes*. Thorax mal conformé, scrophules, hémorrhagies, diabète, diarrhée, leucorrhée, sueurs excessives, allaitement chagrins, études prolongées, suppression d'un exutoire ou d'un ulcère ancien.

Sympt. 1^{re} période. Engourdissement, inertie, catarrhe pulmonaire répété, dou-

leur de poitrine , respiration gênée , toux , hémoptisie , chaleur à la paume des mains et à la plante des pieds , ardeur pour le coït , disposition à la colère. 2^e période. Tittillation au larynx , veilles , voix rauque ou grêle ; toux particulière avec retours irréguliers , surtout la nuit ; rejet des alimens , crachats épais , blancs , cendrés , verdâtres , d'un goût fade ou salé ; petite fièvre le soir , souvent avec frissonnement , rougeur et chaleur des joues. 3^e période. F. hectique continue (voyez cette dernière) , aggravant les symptômes locaux.

Trait. 1^{re} période. Eviter les passions vives , habitation à la campagne , voyages , boissons émulsionnées , lait , farineux , fruits bien mûrs , bains tièdes , exutoire , etc. 2^e et 3^e période. Crucifères , balsamiques , quinquina , alcornoque , digitale , cigüe aquatique , opium.

2^e ESP. *Carreau* (tubercules mésentériques). Causes. Scrophules , écarts de ré-

gime, mauvaise nourriture, répercussion d'un exanthème.

Sympt. 1^{re} période. Mauvaise digestion, flatuosités, dévoiement, anorexie, bouffissure du ventre, transpiration acide, haleine forte, pâleur de la face, mélancolie.

2^e période. Ventre tuméfié, induration sensible au toucher, anorexie ou voracité, quelquefois constipation; selles liquides, blanches ou de couleur d'argile; vers intestinaux rendus, gonflement du cou.

3^e période. Glandes engorgées augmentant de volume et entrant en suppuration; selles blanches, chyleuses, lientériques; F. hectique, marasme; mort, quelquefois précédée d'hydropisie ascite.

Trait. Habitation à la campagne, promenade au soleil, coucher sur un lit fait de substances aromatiques, frictions, bains froids et de mer, frictions sèches et aromatiques, amers à l'intérieur.

COMPLIC. Dartres, scrophules, syphilis.

GENRE VI. *Scrophules.* Causes. Se ma

nifestant depuis l'âge de trois ans jusqu'à sept et quelquefois plus tard , tempérament lymphatique , lieux humides , mauvaise nourriture , vie indolente , affections tristes , disposition héréditaire. Elle ne paraît pas contagieuse.

Sympt. (Constitution scrophuleuse.)

Lèvre supérieure gonflée et gercée ; nez épaté , rouge et douloureux ; yeux ordinairement bleus et chassieux , vue faible , suintement des oreilles ; peau blanche , molle et flasque ; cerveau volumineux , nonchalance , gâité , réparties spirituelles. 1^{re} période. Gonflement indolent et dur des ganglions lymphatiques du cou , de la mâchoire , ou de l'occiput , sans changement de couleur à la peau ; cet état peut exister plus ou moins long-temps. 2^e période. Ces tumeurs grossissent , rougissent , se ramollissent souvent et laissent écouler un pus séreux dans lequel nagent des flocons albumineux ; ces glandes ne suppurent jamais en totalité : de là , des fistules qui durent quelquefois

long-temps, se cicatrisent et se rouvrent de nouveau; quelquefois les glandes sous-clavières et axillaires s'affectent de la même manière. 3^e période. Phthisie, carreau; gonflement, ramollissement et carie des os spongieux; marasme, F. hectique.

Trait. Toniques, ferrugineux, quinquina, digitale pourprée, muriate de baryte; moyens hygiéniques: habitation dans un lieu salubre, changement de climat, exercice, insolation, bains de mer, nourriture animale, bon vin.

• **COMPLICAT.** Syphilis, rachitis; scorbut, gale, teigne, dartres.

GENRE VII. Rachitis. Causes. Tous les âges et particulièrement l'enfance, lieux bas et humides, syphilis, scorbut, scrophules, goutte, masturbation, castration, suppression d'exanthèmes.

Sympt. Tête volumineuse, maigreur et débilité générales, gonflement et augmentation du ventre, endurcissement des viscères abdominaux; les os longs se courbent

et leurs extrémités deviennent volumineuses ; les os courts se tuméfient ; les vertèbres se ramollissent, et la colonne rachidienne se dévie ; atrophie, dévoiement colliquatif, F. hectique, souvent diverses hydropisies.

Trait. Alimens de facile digestion, vin généreux, vêtemens chauds, lit composé de plantes aromatiques sèches, habitation à la campagne dans un lieu sec et élevé, exercice, frictions sèches et aromatiques, bains froids, moxa, vésicatoires, cautères ; toniques, antiscorbutiques.

GENRE VIII. *Eléphantiasis des Grecs.*

Causes. Malpropreté, mauvaise nourriture, usage exclusif de poisson.

Contagieux, héréditaire.

Sympt. Diminution des fonctions des sens, lassitudes, alopécie, voix faible et enrouée, peau recouverte de tubercules négaux, passant successivement à un état d'ulcération qui détruit les ongles et occasionne la chute des doigts.

Trait. Diaphorétiques , sudorifiques , régime végétal , bains émolliens , bains de mer , bains de vapeurs ; toniques , excitans.

GENRE IX. *Eléphantiasis des Arabes*.
Causes. Peu connues.

Endémique dans certaines contrées de l'Asie , de l'Afrique et même de l'Europe. Il n'est ni contagieux , ni héréditaire.

Sympt. Invasion ordinairement brusque d'une tumeur semblable à une corde ou à un chapelet , suivant le trajet des vaisseaux lymphatiques , attaquant ordinairement les membres inférieurs ; accompagnée de douleur , rougeur , nausées , vomissemens répétés , fièvre. Impossibilité de remuer la partie affectée , sans renouveler les accès. Cette affection revient par accès.

Trait. Saignée , sédatifs , quinquina ou à l'opium ; bandage compressif.

GENRE X. *Yaws*. *Causes.* Enfance , jeunesse ; il attaque particulièrement les nègres. Contagieux , sujet à la récidive.

Quelques auteurs pensent que c'est une variété de la syphilis.

Sympt. Petites taches rouges qui s'étendent et forment une croûte dont la chute laisse voir un fungus ressemblant assez bien à une fraise ou à une mûre ; elles se développent particulièrement à la face, aux aisselles et aux aines.

Trait. Sulfureux, sudorifiques et surtout mercuriaux ; si le mal n'est plus que local, caustiques.

ORDRE II. Lésions organiques particulières.

1^{er} SOUS-ORDRE. Lésions organiq. du cœur et des vaisseaux.

GENRE XI. Anévrisme du cœur. Causes.
Exercices violens, grands efforts des membres thorachiques, toux convulsive, menstruation irrégulière, ossification de l'aorte des valvules du cœur, polypes des mêmes parties, passions vives. Des obser-

vations tendraient à faire croire cette maladie héréditaire.

Sympt. 1^{er} degré. Symptômes fugaces, palpitations, sentiment douloureux dans la région du cœur, pouls variable suivant l'exercice, respiration haute et courte au moindre exercice, rhumes fréquens avec toux vive et sèche, figure animée, étourdissemens, éblouissemens, céphalalgie fréquente, sensation de vapeurs chaudes qui monte vers la tête. *2^e degré.* Battemens du cœur plus forts, plus étendus, se faisant sentir dans le côté droit de la poitrine et dans la région épigastrique; pouls dur, vibrant, fréquent; épistaxis répétées; respiration gênée, surtout dans la position horizontale; toux forte, figure bouffie, joues rouges, lèvres rouges ou violettes, œdème des jambes; percussion de la poitrine rendant un son clair, excepté à la région du cœur. *3^e degré.* Palpitations souvent nulles, bruissement particulier qui se fait sentir sous la main; pouls petit, fréquent, inég-

intermittent, insensible; veines gonflées et saillantes, suffocation imminente, toux sèche, convulsive; expectoration sanguinolente ou puriforme, face infiltrée ou maigre; visage bleu, violet, livide; abattement; sens émoussés.

1^{re} ESP. *Anévr. actif ou avec épaissement des parois.* Battemens du cœur brusques, violens, sensibles à la vue, quelquefois même au travers des vêtemens, et en soulevant la main appliquée sur la région précordiale; pouls fréquent, dur, vibrant; face vultueuse, yeux injectés.

2^e ESP. *Anévr. passif ou avec amincissement des parois.* Battemens faibles, lents et rares, cependant sensibles au toucher sans une grande étendue; pouls faible, mou, peu sensible, plus ou moins fréquent, facile à déprimer; face pâle, souvent injectée et violette.

Trait. Chercher à détruire la cause. Le 1^{er} degré est seul curable. Dans la 1^{re} espèce, saignées répétées, diète sévère, dé-

bilitans , bains chauds des membres thorachiques. Dans la 2^e espèce , toniques. Dans le 2^e et 3^e degré , palliatifs.

GENRE XII. *Rétrécissement des orifices du cœur. Causes.* Peu connues ; les végétations qu'on observe sur les valvules paraissent dépendre de la syphilis.

Sympt. Très-obscurs. *Rétrécissement des cavités droites.* Bruissement particulier sensible au poulx et à la region précordiale. — *de l'ouverture auriculo-ventriculaire droite.* Irrégularité du poulx. — *de l'origine de l'aorte.* Irrégularité du poulx plus marquée ; palpitations fortes et fréquentes. Ce rétrécissement est souvent causé par des polypes qui oblitèrent quelquefois l'artère , alors lipothymies , battemens réitérés , palpitations , poulx irrégulier , insensible ; mais intermittence dans les symptômes. Si ces polypes sont situés à l'orifice auriculo-ventriculaire gauche les symptômes sont moins intenses et les intermittences plus fréquentes.

COMPLICAT. Anévrisme du cœur et de l'aorte.

Trait. Palliatifs. S'il y a lieu de soupçonner une cause vénérienne, moyens antisypilitiques.

GENRE XIII. *Anévr. de l'aorte. Causes.* Celles de l'anévr. du cœur.

Sympt. Variables suivant le siège, le volume et l'étendue de la tumeur. Bruissement au-dessus de la région précordiale avec battemens isochrones à ceux du cœur; gonflement du côté gauche de la poitrine; pouls petit, irrégulier, souvent ne battant pas de la même manière aux deux bras. La tumeur peut comprimer l'œsophage ou la trachée-artère; de là, respiration sifflante, déglutition difficile, disposition à l'apoplexie. La tumeur peut se rompre dans l'œsophage ou la trachée-artère.

Trait. Celui des anévrismes du cœur; la tumeur proémine au dehors, applications froides et astringentes.

GENRE XIV. *Tumeurs hémorrhoidales.*

Causes. Constipation, chute fréquente du rectum, équilation, grossesse, calculs vésicaux; tumeurs de la vessie, de l'utérus ou du vagin.

Sympt. Tumeurs de grosseur variées, arrondies ou ovales, rouges, noires ou livides, isolées ou groupées, se développant au bord de l'anus (*hémorrh. externes*), ou dans le rectum (*hémorrh. internes*), souvent intactes, se rompant quelquefois et donnant lieu à un écoulement de sang plus ou moins abondant. (*Voy. flux hémorrhoidal.*) Elles sont accidentelles ou constitutionnelles.

Trait. Régime végétal, boissons et alimens adoucissans; s'il y a grand relâchement, toniques astringens; s'il y a douleur, sédatifs: camphre, safran, onguent populeum.

II^e SOUS-ORDRE. *Hydropisies.*

GENRE XV. *Anasarque.* *Causes.* Tempérament lymphatique, constitution déli-

cate, séjour dans un atmosphère humide, vie sédentaire, mauvaise nourriture, chagrins, suppression de quelque évacuation, abus des médicamens, répercussion d'un exanthème, hystérie, affections chroniques des viscères.

Sympt. Anasarque passive. Infiltration du tissu cellulaire des membres abdominaux, gagnant peu à peu toute l'étendue du corps; peau blanche, moins chaude que dans l'état de santé, conservant longtemps l'empreinte des doigts qui la pressent; pouls petit, mou et lent. *Anasarque active.* Face colorée; peau de couleur rosée, luisante, plus ou moins rénitente; chaleur peu diminuée; pouls plein, dur et fort.

Trait. Diurétiques, purgatifs, stimulans, toniques sagement combinés et adaptés à la cause et aux autres circonstances.

GENRE XVI. *Hydrocéphale. Causes.* Coups, chutes sur la tête. Elle attaque de préférence les enfans robustes et actifs;

elle succède quelquefois aux fièvres éruptives.

Sympt. Hydrocéph. chronique. Volume excessif de la tête, écartement des sutures, vertiges, idiotisme, affaiblissement des sens, paraplégie. *Hydrocéph. aiguë.* Nul changement dans le volume de la tête, céphalalgie, vomissemens, morosité, agitation, face pâle, yeux égarés, strabisme, amaurose, convulsions, coma, paralysie, pouls tour à tour lent et fréquent. *Hydro-rachis.* Tumeur molle, arrondie, fluctuante, quelquefois bilobée, située ordinairement à la hauteur de la 2^e vertèbre lombaire; écartement de l'apophyse épineuse des vertèbres, paraplégie.

Trait. Hydrocéph. chronique. Incurable. Essayer les frictions mercurielles jusqu'à légère salivation; soutenir les os du crâne, au moyen d'un bonnet de cuir. — *Hydrocéph. aiguë.* Dès le premier temps, sangsues derrière les oreilles, vésicatoires, synapismes, lavemens irritans; diurétiques,

surtout les scillitiques, vin, ammoniacque, frictions mercurielles. — *Hydrorachis*. Incurable. Faire porter au malade un bandage concave, pour soutenir et protéger la tumeur; essayer les frictions mercurielles. La ponction serait mortelle.

GENRE XVII. *Hydrothorax*. *Causes*. Celles des hydropisies; particulièrement les affections organiques du cœur et de l'aorte.

Sympt. Respiration courte, peu gênée; possibilité de se coucher sur les deux côtés, son mat et élévation sensible du côté du thorax affecté, oedème du côté et quelquefois du bras correspondant, battemens du cœur mous, faibles, réguliers; point de palpitations; pouls plein, mou, régulier; face pâle, amaigrie; yeux ternes, lèvres pâles, point de réveil en sursaut, quelquefois anasarque.

COMPLICAT. L'hydro-péricarde, l'anévr. du cœur.

Trait. Diaphorétiques, diurétiques, pur-

gatifs, pilules toniques de Bacher, insolation, frictions sèches et aromatiques sur la poitrine, rubéfians aux pieds; paracanthèse, si l'hydrothorax est idiopathique.

GENRE XVIII. *Hydro-péricarde. Causes.* Celles des hydropisies. Maladies organiques des viscères thorachiques.

Sympt. Anxiété douloureuse, poids incommode à la région du cœur dans la position horizontale; syncopes fréquentes; palpitations rares; battemens du cœur obscurs, tumultueux, se faisant sentir tantôt à gauche et tantôt à droite; son mat de la poitrine; quelquefois côté gauche du thorax plus élevé; pouls petit, fréquent, concentré, irrégulier; face violette, lèvres noires ou livides; œdématie des membres inférieurs, lorsque la maladie est ancienne.

Trait. Celui des hydropisies. On a proposé la ponction du péricarde.

GENRE XIX. *Ascite. Causes.* Celles des

hydropisies, lésions organiques des viscères abdominaux, péritonite chronique.

Sympt. Tuméfaction de l'abdomen qui commence par le pubis et s'étend ensuite de bas en haut, sentiment de fluctuation d'un liquide par la pression, infiltration des membres abdominaux. Si l'hydropisie est *enkystée*, tuméfaction partielle et graduée, commençant dans l'un des hypochondres avec tension et douleur obtuse; forme inégale de l'abdomen, progrès lents, respiration moins gênée que dans l'ascite ordinaire; la face n'est pâle et bouffie que vers les derniers temps de la maladie.

Trait. Celui des hydropisies; paracenthèse; frictions huileuses sur le ventre.

III^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. du tissu cellulaire.*

GENRE XX. *Endurcissement du tissu cellulaire. Causes.* Encore peu connues. Le froid paraît le déterminer. Il attaque les

nouveau-nés depuis leur naissance jusqu'au 7^e ou 9^e jour.

Sympt. Dureté très-grande d'une portion et quelquefois de la totalité du tissu cellulaire, qui est rénitent et ne cède point à la pression des doigts; chaleur diminuée; souvent rougeur des jambes, des cuisses, du bas-ventre; contractions spasmodiques; mort le 3^e, 4^e et rarement le 7^e jour après la naissance.

Trait. Bains avec une décoction de sauge, vésicatoire sur la tumeur, vomitif; purgatif, usage journalier d'un grain de muriate de mercure doux.

IV^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. du cerveau.*

Les signes en sont peu connus.

V^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. du poumon.*

Les signes en sont peu connus.

VI^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. du foie*

GENRE XXI. *Hydropisie enkystée du foie*

Sympt. Tumeur rénittente et inégale, accompagnée de douleur, de pesanteur dans l'hypochondre droit et souvent d'ictère, avec les symptômes des hydropisies.

GENRE XXII. *Concrétions biliaires.*

Causes. Tempéramens bilieux et mélancolique, vieillesse, vie sédentaire, affections tristes.

Sympt. Souvent très-obscur; quelquefois douleur vive qui suit le trajet du canal cholédoque et qui augmente après le repas; tuméfaction, tympanite partielle dans l'épigastre; calculs rendus par les selles ou le vomissement; souvent ictère sujet à récédive; coliques, éructations, vomissemens, constipation ou diarrhée.

Trait. Extraits de saponaire et de chicorée, poudre de Dower, minoratifs, remède du D^r Durande, électricité, diète végétale.

GENRE XXIII. *Ictère des nouveau-nés.*

Causes. Changement de circulation, rétention du méconium, nourrice anciennement

accouchée, abus des huileux et des spiritueux, affection organique du foie.

Sympt. Couleur jaune et sécheresse de la peau, quelquefois tension des hypochondres, vomissemens, cris aigus.

Trait. Lait d'une femme récemment accouchée, eau sucrée, sirop de chicorée ou de pomme composé.

VII^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. de la rate.*

Les signes en sont peu connus.

VIII^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. des voies urinaires.*

GENRE XXIV. *Diabète sucré. Causes.*
Affaiblissement : hémorrhagies, suppurations, maladies longues, abus des liqueurs alcooliques, boissons chaudes ou tièdes, nourriture mal saine, humidité, mélancolie, affections tristes.

Sympt. Signes précurseurs. Besoin fréquent d'uriner, sentiment de chaleur ou de froid qui s'étend du ventre dans la

vessie, augmentation de quantité des urines.

1^{re} période. Fièvre nulle, débilité, abattement, soif; urine limpide, inodore, sans saveur, sans sédiment. *2^e période.* Maigreur, chaleur vive, peau aride, affaissement, faim canine, soif extrême, digestions pénibles, rots; urines très-abondantes, blanchâtres ou jaunâtres, douceâtres, sucrées, avec sédiment grisâtre. *3^e période.* Marasme; pouls petit, irrégulier, intermittent; F. hectique, mort plus ou moins prompte.

Trait. Exercice, bon vin, nourriture animale en quantité modérée; éloigner les idées tristes.

GENRE XXV. *Concrétions urinaires.*

Causes. Enfance, vieillesse; tempérament lymphatique, habitation des climats tempérés ou des marais, oisiveté, sommeil prolongé, goutte.

Sympt. Calcul rénal. Douleur vive, térébrante dans la région des reins, augmentée par l'exercice; urine rendue goutte

à goutte, teinte de sang et contenant quelquefois des portions de calculs; stupeur dans la cuisse et rétraction du testicule du même côté, toux, nausées, vomissemens. *Calcul vésical.* Douleur dans la vessie, pesanteur au périnée et sur le rectum, prurit au bout du gland, impossibilité de supporter le cahot d'une voiture, ténésme, émission difficile de l'urine, corps étranger reconnu dans la vessie à l'aide du *cathétérisme*.

Trait. Palliatifs, lithotomie. Les lithontriptiques sont sans vertu.

IX^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. de l'utérus.*

GENRE XXVI. *Corps fibreux de l'utérus.*

Sympt. Pesanteur dans la région hypogastrique, douleur aux lombes, tiraillement dans les aines, tumeur quelquefois appréciable au travers des tégumens de l'abdomen ou au moyen du toucher, trouble dans la menstruation, souvent hémorrhagie.

X^e SOUS-ORDRE. *Lésions organiq. du conduit alimentaire.*

GENRE ANNEXE. *Vers intestinaux.*

Sympt. Irritation et douleur dans quelque point du tube intestinal, trouble dans la digestion et dans la plupart des autres fonctions ; dilatation de la pupille, démangeaison au bout du nez, douleurs aux poignets, sortie de vers par le vomissement ou par les selles.

1^{re} ESP. *Ascarides lombricoïdes.* Prurit et douleur pongitive dans les intestins et particulièrement vers l'ombilic ; sortie de lombrics par le vomissement ou par les selles.

2^e ESP. *Ascarides vermiculaires.* Irritation sourde, picotement et prurit au rectum, sortie d'ascarides avec les matières fécales.

3^e ESP. *Tænia.* Pesanteur, sentiment de tournoïement dans le ventre, de piquûre et de morsure à l'estomac ; soulèvement,

abaissement et ondulation de l'abdomen ,
appétit vorace , amaigrissement , sortie de
quelques fragmens ou de la totalité du tænia
par le vomissement ou par les selles.

Trait. On les prévient en donnant de
légers toniques ; on les détruit au moyen
des anthelmintiques et des purgatifs. Pour
celui du tænia, voy. PHARMAC. 2^e sect.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

SECONDE PARTIE.

ABRÉGÉ

DE PHARMACOLOGIE.

PREMIÈRE SECTION.

DES MÉDICAMENS SIMPLES.

A.

ABSINTHE, *Artemisia Absinthium*, Syn-
gén. polygam. superfl. Corymbif. France.
(herbe entière.)

Forme. Dose. Poudre, ℥j à ʒj. — Suc, comme
altérant, ʒj à ʒss; comme émétique, ʒj à ʒiij.
— Infusion à froid, ʒss à ʒj par ℥j d'eau. —
Vin, ʒj ʒij à ʒiv. — Teinture, ʒss à ʒij, dans une
potion. — Alcool, ʒss à ʒj. — Eau distillée, ʒj à
ʒiv. — Huile essentielle, gtte ij à gtte iv sur
du sucre. ℥j à ʒss dans une potion; — Sirop,
ʒij à ʒij; — Extrait, ʒss à ʒj; — Conserve, ʒj à
ʒij; — Huile par macération, en lavement, en
liniment, ʒij à ʒj.

Propriétés. Tonique, fébrifuge, vermifuge, emménagogue.

ACÉTATE D'AMMONIAQUE, (Esprit de Mindérérus.)

F. D. 3 ℥ à 3 ij dans une potion ou dans ℥ij de tisane.

P. Excitant, diurétique, diaphorétique.

— DE CUIVRE, (Verdet, *Deuto-acétate de cuivre*).

F. D. En pilules, gr. ℥ à iij. — *A l'extérieur*; poudre, dissolution, liniment, onguent.

P. Altérant, astringent, esscarrotique.

Cas particuliers. Usage interne; épilepsie, manie, rage, squirrhe, cancer. — *Us. ext.* Ulcères fongueux, scorbutiques, cancéreux; gonorrhée.

Observation. Dangereux à l'intérieur.

— DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

F. D. P. Les mêmes que le précédent.

— DE MERCURE, (Terre foliée mercurielle, *Proto-acétate de mercure*).

F. D. En pilules, gr. j à gr. iij. (*Voy. dragées de Keyser, 2^e section.*)

P. Antisymphilitique, antiherpétique.

ACÉTATE DE PLOMB, (Extrait de Saturne,
Proto-acétate de plomb.)

F. D. Gr. β à gr. j dans une potion. — *A*
l'extér. fomentation, lotion, injection, lini-
ment, onguent.

P. Astringent, sédatif, détersif, réper-
cussif.

Cas part. Us. interne; gonorrhée, saty-
riasis. — *Us. ext.* Ephélides, boutons de
la peau, ophthalmie, brûlure, gonorrhée.

Obs. Dangereux à l'intérieur.

— DE POTASSE, (Terre foliée de tartre,
Deuto-acétate de potassium)

F. D. P. Comme apéritif et diurétique, gr.
xij à β j. — Comme purgatif, β j à β j β dans \mathbb{H} ij
de tisane.

— DE SOUDE, (Terre foliée minérale,
Deuto-acétate de sodium).

F. D. P. Les mêmes que le précédent.

ACHE, *Apium graveolens*, Pentand.
digyn. Umbell. France. (Racine, herbe,
graine.)

F. D. Graine, infus. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau.
 — Racine, décoct. ʒss à ʒj. — Poudre, ʒj à ʒss.
 — Eau distillée, ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒij à ʒij.
 — Extrait, ʒj, ʒss à ʒj. — Suc, ʒj à ʒij.

P. Carminative, sudorifique, diurétique, apéritive, fébrifuge.

Obs. Abandonnée ; elle faisait partie des quatre semences chaudes mineures et des cinq racines apéritives majeures.

ACIDE ACÉTIQUE, *Voy.* vinaigre.

— ARSÉNIEUX, (Arsenic, *Protoxide d'arsenic*).

F. D. En potion, en pilules, $\frac{1}{9}$ à $\frac{1}{5}$ de grain.
 — *A l'extér.* poudre, $\frac{1}{25}$ à $\frac{1}{5}$ de la masse.

P. Fébrifuge, cathérétique, caustique.

Obs. Dangereux, même *à l'extér.* où on ne doit l'employer que sur une petite surface. — *A l'intérieur*, il vaut mieux se servir d'un arséniate.

— BENZOÏQUE, (Fleurs de benjoin).

F. D. Potion, poudre, tablettes, gr. j à x. —

A l'extér. en fumigation. — Teinture , étendue d'eau (lait virginal) en friction, en lotion.

P. Antispasmodique, expectorant, stimulant, cosmétique.

ACIDE BORACIQUE, (Sel sédatif de Homberg, *A. Borique*).

F. D. Gr. v à ℥j, dans ℥ij de tisane. — *A l'extér.* en gargarisme.

P. Rafraîchissant, détersif.

Obs. Peu employé.

— CARBONIQUE, (acide aérien).

F. D. Mêlé à l'eau jusqu'à acidité agréable.

P. Diurétique, rafraîchissant.

Obs. Il entre dans les eaux minérales acidules.

Le gaz mêlé à l'air ralentit la respiration; mais l'azote et l'hydrogène lui sont préférables.

— CITRIQUE, *Voy.* citron.

— MURIATIQUE, (*A.* marin, *A. hydrochlorique*).

F. D. Gtte xxx à xl par ℥ij d'eau; mieux,

jusqu'à acidité convenable. — *A l'extér.* pur, en vapeur, étendu dans l'eau ou dans du miel.

P. Antiseptique, diurétique, résolutif, corrosif, désinfectant.

ACIDE MURIATIQUE OXIGÈNÉ, (*A. marin* déphlogistiqué, *Chlore*).

F. D. Étendu dans l'eau jusqu'à acerbité supportable. — *A l'extér.* Étendu dans de l'eau, ou en vapeur.

P. Astringent, antiseptique, désinfectant.

Obs. Il n'est guère employé qu'en vapeur, pour purifier l'air des hôpitaux, etc., et titiller la membrane pituitaire.

— NITREUX, (*Esprit de nitre fumant*).

F. D. ʒj à ʒij dans ℥ij de tisane sudorifique. — *A l'extér.* pur.

P. Antisymphilitique, caustique puissante.

— NITRIQUE, (*Eau-forte*).

F. D. Progressivement de ʒss à ʒss par ℥ij d'eau; mieux, jusqu'à acidité convenable. — *A l'extér.* pur, en vapeur; mêlé à l'axonge (pommade oxigénée.)

P. Antisymphilitique, astringent, anti-
septique, diurétique, désinfectant, excitant,
corrosif.

Obs. On doit mettre beaucoup de pru-
dence dans son emploi, surtout à l'inté-
rieur.

ACIDE NITRIQUE ALCOOLISÉ, (Esprit de
nitre dulcifié).

F. D. ʒß à ʒj dans une potion ou par ℥ij
de boisson. — *A l'extér.* pur.

P. Astringent, caustique.

— OXALIQUE, (acide de l'oseille).

F. D. Gr. xij à ʒj par ℥ij d'eau sucrée.
— Pastilles, Q. V.

P. Rafraîchissant.

Obs. Remplacé par l'acide tartarique.

— PHOSPHORIQUE, (acide de l'urine).

F. D. G^{tte} xv à xxv par ℥ij d'eau distillée.

P. Rafraîchissant.

— SULFUREUX, (A. vitriolique volatil).

F. D. *A l'extér.* le gaz, en bain de vapeur
général ou partiel.

P. Excitant, antiherpétique, antipsorique.

ACIDE SULFURIQUE, (A. Vitriolique).

F. D. G^{tte} xx à xxxvj par ℥ij d'eau; mieux jusqu'à acidité agréable. — *A l'extér.* pur, mêlé à 8 ou 10 parties d'axonge.

P. Rafraîchissant, astringent, excitant caustique.

Obs. Très-employé à l'intérieur, (*limonade minérale*).

— SULFURIQUE ALCOOLISÉ, (Eau de Rabel).

F. D. ʒss à ʒj par ℥ij d'eau. — *A l'extérieur* pur ou étendu d'eau.

P. Astringent, styptique, caustique.

— TARTARIQUE. Comme l'acide oxalique.

ACONIT NAPEL, *Aconitum Napellus*.
Polyand. trigyn. Renoncul. France
(Herbe.)

F. D. Poudre on extrait, progressivement de gr. ss à gr. viij. — Suc, progressivement de gr. j à gr. xij.

P. Stimulant, antiherpétique.

Obs. Son emploi demande beaucoup de circonspection. On a cependant donné son extrait à gr. v toutes les demi-heures, et jusqu'à 3 ℥ par jour.

ADIPOCIRE, (Blanc de baleine).

F. D. gr. x à 3 ℥ dans une émulsion. — *A l'extérieur* liniment, emplâtre.

P. Adoucissant, pectoral, cosmétique.

Obs. Peu usité.

AGARIC BLANC, *Boletus laricis*, Cryptogam. Champign. Asie.

F. D. Poudre, ʒj à 3 ℥. — Infus. 3 ℥ à 3j ℥ par ʒ iv d'eau ou de vin.

P. Purgatif infidèle et fatigant.

Obs. Peu employé.

— DE CHÊNE, *Boletus igniarius*.

Employé à l'extérieur pour arrêter les hémorrhagies.

AIGREMOINE, *Agrimonia Eupatoria*, Dodécand. digyn. Rosac. France. (Herbe.)

F. D. Poudre, 3 ℥ à 3j. — Infusion, pinc. j à ij par ʒij d'eau. — Eau distillée, ʒ ij à ʒ iv.

P. Astringent faible, utile seulement en gargarisme.

AIL, *Allium sativum*, Hexand. monogyn. Liliac. (bulbe, herbe).

F. D. Décoction dans l'eau ou le lait.—Suc, gr^{te} j, ij à viij plusieurs fois le jour.—*A l'extér.* en épithème.

P. Vermifuge, fébrifuge, diurétique, diaphorétique, rubéfiant.

Obs. N'est employé que comme vermifuge.

AIMANT. On l'a vanté comme sédatif.

ALBUMINE, (Blanc d'œuf). Employé pour clarifier les sirops, etc.

ALCALI FIXE, *Voy.* potasse, soude.

—VOLATIL, *Voy.* ammoniaque.

ALCOOL, (Esprit de vin).

P. Excitant; excipient de beaucoup de médicamens.

ALCONORQUE, *Quercus suber?* *Chaporo Alconorque?* (Ecorce.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒij associée au quinquina.—Infus. ʒj à ʒij par ℥ij de vin (cochl. ij à iiij , plusieurs fois le jour.)

P. Tonique, expectorant.

Cas part. Proposé contre la phthisie pulmonaire.

Obs. Peu connu, peu usité. Il faut attendre de nouvelles expériences.

ALKÉKENGÉ, *Physalis Alkekengi*, Pentand. monogyn. Solan. Europe. (Baies.)

F. D. Infus. n^o vj à n^o xij et plus par ℥ij d'eau. — Suc, ʒss à ʒj .

P. Narcotique, diurétique, laxatif.

ALLELUIA, *Oxalis acetosella*, Décand. pentagyn. Géran. France. (Herbe.)

F. D. Décoction, manip. j par ℥ij d'eau.—Suc, ʒss à ʒiv . — Sirop, ʒj à ʒij .

P. Altérant, rafraîchissant, diurétique.

Obs. Peu usité.

ALLIAIRE, *Erysimum Alliaria*, Tétradyn. siliq. Crucif. France. (Herbe.)

F. D. Suc, ʒ j à ʒ iv, le matin. — *A l'extér.* en épithème, Q. S.

P. Diurétique, vermifuge, antiscorbutique, antiseptique.

Obs. Active, mais peu usitée.

ALOËS, *Aloë perfoliata*, Hexand. monogyn. Liliac. Atriq. Amériq. mérid. (Suc épaisi.)

F. D. En pilules ou dans une émulsion, comme altérant, gr. j à iij. — Comme purgatif, gr. iv à xx; dans quelques affections comateuses et hydropisies passives, ʒ ss et même ʒ j. — Teinture, g^{tte} vj à xij.

P. Purgatif drastique, tonique, vermifuge, emménagogue.

Obs. On n'emploie guère en France que l'aloès succotrin.

ALTHÆA, *Voy.* GUIMAUVE.

ALUINE ou ALOYNE, *Voy.* ABSINTHE.

ALUN, (Sulfate acide d'alumine et de potasse, *Sur-proto-sulfate d'aluminium, d'ammoniaque et de deutoxide de potassium*).

F. D. Gr. vj à xij en pilules ou dans une potion ; on peut aller jusqu'à 3j par jour. —

A l'extér. ʒj, 3ʒ, 3j et plus dans ℥j d'eau, pour gargarisme, injection, lotion, bain local. ʒij à 3vj dans un bain général.

P. Astringent, styptique, antiseptique.

Cas part. Diabètes, gonorrhée et hémorrhagie chroniques.

ALUN CALCINÉ. *A l'extér.* en poudre sur les ulcères fongueux.

P. Cathérétique, corrosif.

AMANDES AMÈRES, *Amygdalus amarus*, Icosand. monogyn. Rosac. Fran. (Semences.)

F. D. En émulsion, ʒj à 3ij.

P. Fébrifuges, toniques.

— DOUCES, *Amygdalus communis*. (Semences.)

F. D. En émulsion, ʒij à 3iv par ℥ij d'eau. — Huile, 3ʒ à 3ij dans une potion ; elle sert d'excipient à beaucoup de médicamens.

P. Adoucissantes, pectorales.

AMBRE GRIS, Excrément du Cachalot, poisson de la mer de l'Inde ?

F. D. Poudre, gr. j à v et même xij, en pilules ou dans une potion. — Teinture, g^{tte} xij à xxxvj.

P. Excitant, antispasmodique, aphrodisiaque.

— JAUNE, (Succin, Karabé.) Europ.

F. D. Huile essent. g^{tte} iv à xij. — Teinture, g^{tte} x, ʒ j à ʒ ℥. — Sirop, ʒ ij à ʒ j, ordinairement dans une potion. — *A l'extér.* fumigation, bain de vapeur.

P. Antispasmodique, emménagogue, sudorifique.

AMBROISIE, *Chenopodium Botrys*, *Chenopodium Ambrosioides*, Pentand. digyn. Chénopod. (Feuille, semences.)

F. D. Infusion théiforme.

P. Stomachique, antispasmodique.

AMIDON, Fécule du *Triticum sativum*, Triand. digyn. Gramin. France.

P. Nourrissant, adoucissant.

Obs. Le bulbe des différens Orchis et de la Pomme de terre, la racine de Bryone, la tige du Sagou, etc. fournissent de l'amidon.

AMMI, *Sison Ammi*, Pentand, digyn. Ombell. Italie mérid. Grèce. (Semences.)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infus. 3 ij à 3 ss par ℥ij d'eau. — Teinture, ℥j à 3j. — Huile essent. g^{tte} ij à vj. — Extrait, gr. iv à viij.

P. Sudorifique, carminatif, diurétique, aphrodisiaque.

Obs. Peu usitée; une des quatre semences chaudes mineures.

AMMONIACUM, *Voy.* GOMME AMMONIAC.

AMMONIAQUE, (Alcali volatil.)

F. D. G^{tte} x à xxx par ℥ij de boisson. — G^{tte} vj à x dans une potion. — Mêlé à 2 parties d'alcool (*esprit d'ammoniaque dulcifié*), G^{tte} xv à xx. — *A l'extér.* en friction, 3 ss à 3 ij par 3 j d'huile (*liniment volatil*). — Pur.

P. Diaphorétique, excitant, rubéfiant, caustique.

Cas part. Rhumatisme , rage , morsure des serpens , plaies envenimées.

ANGÉLIQUE , *Angelica archangelica*, Pentand. digyn. , Ombell. Fran. (Racine , herbe , semences.)

F. D. Racine , poudre, ℥j à 3j. — Décoct. , 3ij à 3℔ par ℔ij d'eau. — *Semences* , infus. 3j à 3iij par ℔ij d'eau. — Eau distill. 3ij à 3iij. — Alcool, 3℔ à 3℔j. — Teinture, 3℔ à 3ij. — Huile essent. G^{tte} ij à vj. — Extrait, ℥j à 3℔.

P. Stomachique , sudorifique , emménagogue.

Obs. Peu usitée; quelquefois la racine comme sialagogue.

ANGUSTURA, *Bomplandia trifoliata* , Décand. monogyn. Tulipif. Amériq. (Écorce moyenne.)

F. D. Poudre , gr. xij à ℥j, répétée 2 à 3 fois pendant l'apyrexie. — Infus. 3℔ par ℔j d'eau , à prendre par 2 à 3 cuillerées. — Teinture, 3 à 3ij dans un verre d'infusion aromatique. — Extrait, ℥j à 3℔.

P. Tonique , fébrifuge , astringent.

ANIS, *Pimpinella Anisum*, Pentand. digyn.

Ombell. Afriq. France cultiv. (Semences).

F. D. Poudre , ʒj à ʒj. — Infus. ʒj à ʒij ,
par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒij. — Al-
cool, ʒss à ʒj. — Teinture, ʒss à ʒij. — Huile
essent. gtte vj à xij.

P. Tonique , stimulant , carminatif.

— ÉTOILÉ , *Illicium anisatum*. Polyand.
polygyn. Tulipif. Asie. (Capsules et se-
mences.)

F. D. P. Les mêmes que celles de l'anis.

ANTIMOINE , (régule d'antim.) Il n'est
plus usité à l'état métallique).

OXIDE d'antim. au *maximum* , (Antim.
diaphorétique , *Peroxiside d'antim*).

F. D Comme diaphorétique, gr. ss à gr. ij. —
Comme émétique, gr. ij à vj.

Obs. Non lavé , il constitue le fondant
de Rotrou.

—HYDRO SULFURÉ-BRUN, (Kermès miné-
ral , *Sous-deutoxi-sulfure d'antim.*)

F. D. Comme expectorant , gr. ß à gr. ij. — Comme émétique, gr. ij à vj. — Sirop de *kermès*, comme émétique , ʒ ij à ʒ j.

OXIDE D'ANTIMOINE - HYDRO- SULFURÉ - ORANGÉ, (soufre doré d'antim. *Per-deutoxi-sulfure d'antim.*)

Obs. A la même dose et dans les mêmes cas que le *kermès* ; il provoque plus facilement le vomissement.

ARBOUSIER, *Voy.* RAISIN D'OURS.

ARGENTINE, *Potentilla Anserina*, Icosand. polygyn. Rosac. France. (Racine , herbe.)

F. D. Infus. décoct. ʒ ij à ʒ ß par ℥ ij d'eau. — Eau distill. ʒ ij à ʒ iij. — *A l'extér.* en fomentation, cataplasme, Q. V.

P. Astringent faible , diurétique.

ARISTOLOCHE, *Aristolochia rotunda*, *A. longa*, Gynand. héxand. Asar. France mérid. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒ j à ʒ ß. — Décoct. ʒ ij à ʒ iij, par ℥ ij d'eau. — Alcool , ʒ j à ʒ j. — Extrait, ʒ ß à ʒ j.

P. Stimulante, tonique, emménagogue, émétique.

ARMOISE, *Artemisia vulgaris*, Syngén. polygam. superfl. Corymb. France. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Suc, comme altérant, ʒj à ʒss; comme émétique, ʒj à ʒiij. — Infus. ʒj à ʒij, ordinairement dans ʒv de vin blanc. — Eau distil. ʒj à ʒiv. — Sirop, ʒij à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒss. — Conserve, ʒij à ʒj.

P. Vermifuge, emménagogue, émétique.

ARNICA, *Arnica montana*, Syngén. polygam. superfl. Corymbif. Europe septentr. (Racine, herbe et surtout les fleurs.)

F. D. Racine, poudre, ʒj à ʒiij, dans les 24 heures. — Décoct. ʒij à ʒss par ℥ij d'eau. — Fleurs, poudre, gr. x à ʒss. — Infus. ʒj à ʒiij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒiij. — Extrait, gr. x à ʒj.

P. Tonique, fébrifuge, stimulant acif, sternutatoire.

ARRÊTE-BOEUF, *Ononis spinosa*, *O. ar-*

vensis, Diadelph. décand. Légumin. Fil.
(Plante entière, particulièrement la racine.)

F. D. Racine, décoct. $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{j}$ par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau. — *Feuille*, double dose.

P. Diurétique, emménagogue.

ARROCHE, *Atriplex hortensis*, Polygam.
monoéc. Chénop. France cultiv. (Feuilles.)

F. D. Décoction, manip. j par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau.

P. Délayante, rafraîchissante.

Obs. On dit que la racine et les graines :
la dose de $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{j}$ sont émétiques.

ARSENIC, *Voy.* ACIDE ARSÉNIEUX.

ARSÉNIATE DE POTASSE, (*Deuto-arséniate*
de potassium).

F. D. $\frac{1}{12}$ à $\frac{1}{8}$ de gr. dans $\text{℥} \text{j}$ ou $\text{℥} \text{ij}$ d'eau
distil. à prendre en 3 ou 4 fois.

P. Fébrifuge.

Obs. Dangereux ; il entre dans la solu-
tion minérale de Fowler.

— DE SOUDE, (*Deuto-arséniate de so-*
dium).

F. D. P. Comme le précédent.

ASARUM, *Voy.* CABARET.

ASCLÉPIAS, *Asclepias Vincetoxicum*, Pénand. digyn. Apocyn. France. (Plante entière, particulièrement la racine.)

F. D. Racine, poudre, ʒβ à ʒj. — Décoct. β à ʒj par ℥ij d'eau. — Feuilles, comme émétique, gr. xxx à xl.

P. Diurétique, apéritive, émétique.

Obs. Peu usitée.

— *Asclepias asthmatica*. (racine).

F. D. P. comme la précédente.

ASPERGE, *Asparagus officinalis*, Héxand. monogyn. Asperg. France. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒβ à ʒj. — Décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Extrait, ʒj à ʒj.

P. Diurétique, apéritive.

ASPIC, *Voy.* LAVANDE.

ASSA-FOETIDA, *Ferula Assa-foetida*, Pénand. digyn. Ombell. Indes. (Gomme-résine.)

F. D. En pilules, gr. iv à ʒj — Même dose dans une potion, dissous avec le jaune d'œuf. —

Teinture, g^{tte} xxiv à xxxiv. — En lavement dissous avec le jaune d'œuf, ʒj à ʒij. — En fumigation.

P. Antispasmodique, emménagogue.

ASTRAGALE, *Astragalus exscapus*, Didym. delph. décand. Légumin. France méridionale. (Racine, feuilles.)

F. D. Décoct. ʒβ à ʒj par ℥ij d'eau réduite au tiers.

P. Antisymphilitique.

Obs. L'usage doit en être continué pendant 2 ou 3 mois.

AUNE, *Betula Alnus*, Monoéc. tétrand. Ament. France. (Écorce.)

F. D. La poudre, ʒij à ʒβ pendant l'apoplexie.

P. Fébrifuge.

AUNÉE, *Inula Helenium*, Syngén. polygam. superfl. Corymb. France. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒβ à ʒj. — Décoct. ʒβ par ℥ij d'eau. — Vin, ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒj à ʒi. — Extrait, ʒj à ʒβ.

P. Sudorifique, tonique, emménagogue.

AVOINE, *Avena sativa*, Triand. digyn. Gramin. France. (Graine dépouillée, gruau.)

F. D. Décoct. ℥ ij à ℥ j par ℔ ij d'eau (eau de gruau).

P. Adoucissante, pectorale.

AYA-PANA, *Eupatorium Aya-pana*, Syn-gén. polygam. égal. Corymb. Indes. (Racine, feuilles.)

F. D. Infus. ℥ ij à ℥ iv par ℔ ij d'eau.

P. Astringent faible, alexitère.

AZÉDARACK, *Melia Azedarack*, Décand. monogyn. Méliac. Asie. (Racine.)

F. D. Décoct. ℥ ij à ℥ β par ℔ ij d'eau.

P. Vermifuge.

Obs. Peu connu, peu usité.

AZOTE, (Gaz phlogistique).

F. D. On le fait respirer mêlé à 2 parties d'air atmosphérique.

Cas part. Maladies de poitrine dans les-

quelles il faut diminuer la fréquence de la respiration.

B.

BADIANE, *Voy.* ANIS ÉTOILÉ.

BAINS D'EAU A LA GLACE, température à 0 et au-dessous, (therm. de Réaumur.)

P. Toniques, excitans, révulsifs.

— FROIDS, de 2 à 10 degrés \pm 0.

P. Toniques, excitans.

— TIÈDES, de 20 à 30 degrés.

P. Émolliens, relâchans.

— CHAUDS, de 30 à 40 degrés.

P. Excitans, sudorifiques.

— DE VAPEURS.

P. Émolliens, sudorifiques.

— D'EAU DE MER.

P. Toniques.

BAINS ÉMOLLIENS, ADOUCISSANS. Décoct. ou infus. des plantes émollientes, lait, bouillon de tripe.

— TONIQUES. Décoct. ou infus. des plantes toniques, marc de raisin.

BAINS ALCALINS.

Carbonate de potasse ou de soude, ℥ xv à ℥ xviii .

P. Toniques, résolutifs.

— HYDRO-SULFUREUX.

Sulfure de potasse, ℥ ij à ℥ iv . — Sulfure de soude, *id.*, sulfure de chaux, *id.*, sulfure de fer, ℥ vj à viii .

P. Excitans, antiherpetiques, anti-psoriques.

— ÉLECTRIQUES.

P. Excitans.

BAINS FUMIGATOIRES MERCURIAUX. Les composés du mercure.

P. Excitans, antisypilitiques, anti-herpétiques.

— FUMIGAT. SULFUREUX. Le soufre et ses composés.

P. Excitans, antiherpétiques, anti-psoriques.

— FUMIGATOIRES TONIQUES.

Baies de genièvre, benjoin, etc.

BAIES DE GENIÈVRE, *Voy.* GENIÈVRE.

— DE NERPRUN, *Voy.* NERPRUN.

BALAUSTES, *Voy.* GRENADIER.

BARDANE, *Arctium Lappa*, Syngén, polygam. eg. Cynarocéph. France. (Racine, feuille, graine.)

F. D. Racine, poudre, ʒj à ʒj. — Décoct. ʒj à ʒiv par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à iv. — Teinture, ʒβ à ʒij. — Extrait, gr. xv à ʒβ. — Graine, infus. ʒβ à ʒj par ℥ij d'eau. — Feuilles, suc, ʒij à ʒij. — *A l'extér.* en lavement, en cataplasme.

P. Diurétique, diaphorétique, anti-syphilitique.

BASILIC, *Ocimum Basilicum*, Didynam. gymnosperm. Lab. France cult. (herbe.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒβ. — Infus. ʒij à ʒβ par ℥ij d'eau — Vin, ʒj à ʒij.

P. Stimulant énergique, emménagogue.

BAUME DE COPAHU, *Voy.* TÉRÉBENTHINE DE COPAHU.

— DE LA MECQUE, *Voy.* TÉRÉBENTHINE DE LA MECQUE.

BAUME DU PEROU, *Myroxylon Peruifc-*
rum, Décand. monogyn. Légumin. Amériq.
(Suc liquide ou concret.)

F. D. Gr. j à viij en poudre avec le sucre,
en pilules ou tablettes, plusieurs fois le jour.
— Gr. v à xxx dans une potion avec le jaune
d'œuf.

P. Stimulant, expectorant, astringent.
A l'extér. vulnéraire.

— DE TOLU, *Toluifera balsamum*, Dé-
cand. monogyn. Térébenth. Amérique.
(Suc ordinairement concret.)

F. D. Gr. v à xvij et plus, en électuaire,
pilules, potion avec le jaune d'œuf. — Teinture,
g^{tte} xx à xxx dans une potion. — Sirop, ℥j par
℔bj de tisane; ℥ij à ℥j dans une potion.

P. celles du précédent.

— BENJOIN, *Styrax Benzoin*, Décand.
monogyn. Ebenac. Ind. orient. et occid.
(Suc concret.)

F. D. Peu usité sous forme de baume; il
ne l'est guère qu'à l'état d'acide benzoïque.
Voy. ce dernier. — Teinture, ℥j à ℥ij. —

Sirop, ʒij à ʒij. — *A l'extér.* en fumigation, en bain de vapeur.

P. Celles des précédens.

BECCABUNGA, *Veronica Beccabunga*, Diand. monogyn. Rhinanth. Fr. (Herbe.)

F. D. Suc, ʒij à ʒiv. — Infusion, manip. j à ij par ʒij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒss à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒj.

P. Stimulant, antiscorbutique.

Obs. Usité; ayant peu de vertu; on l'associe à des plantes plus énergiques.

BELLADONE, *Atropa Belladonna*, Pentand. monogyn. Solan. France. (Racine, feuilles.)

F. D. Feuilles, poudre, gr. j à iv en pilules ou dans une émulsion. — Racine, poudre, gr. ss à ij. — Teinture, gttc iv à xij. — Extrait, progressivement, gr. ss à gr. ij. — *A l'extér.* en lotion, fomentation, bain, cataplasme.

P. Narcotique, antispasmodique.

Cas part. Cancer, chorée, convulsions.

BELLEDAÏNE, Voy. BELLADONE.

BENJOIN, *Voy.* BAUME BENJOIN et ACIDE BENZOÏQUE.

BÉNOÏTE, *Geum urbanum*, Icosand. polygyn. Rosac. France. (Racine.)

F. D. Poudre, dans un électuaire, ℥j à 3ij. — Décoct. ℥j par ℥ij d'eau réduite au tiers, (cochl. j toutes les heures.) — Vin, 3j à 3℔. — Teinture, 3℔, 3 fois par jour.

Le double si la racine est fraîche.

P. Astringente, sudorifique, fébrifuge, et même purgative.

BÉTOÏNE, *Betonica officinalis*, Didynam. gymnosperm. Lab. France. (Racine, feuilles, fleur.)

F. D. Feuille ou fleur, poudre, ℥j à 5ij. — Infus. théiforme. — Racine, poudre, comme émétique, 3j à 3ij. — Eau distil, 3j à 3iij. — Sirop, 3ij à 3ij. — Poudre, comme sternutatoire, pinc. j.

P. Tonique, émétique, purgative, sternutatoire.

Obs. Peu usitée.

BETTE, *Voy.* POIRÉE.

BEURRE.

F. P. Quelquefois employé comme émétique, dose indéterminée. — Excipient des autres médicaments. — *A l'extér.* adoucissant.

BEURRE D'ANTIMOINE, *Voy.* MURIATE D'ANTIMOINE.

— DE CACAO, *Voy.* CACAO.

— DE MUSCADE, *Voy.* MUSCADE.

BIÈRE. Boisson nourrissante, diurétique et légèrement tonique.

BILE DE BOEUF ÉPAISSIE.

F. D. En pilules, gr. iv à xij.

P. Tonique.

Cas part. Ictère, dyspepsie.

Obs. Peu usitée.

BISTORTE, *Polygonum Bistorta*, Octand. trigyn. Polygon. France. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ ij. — Décoct. ʒ j à ʒ ij par ℥ ij d'eau. — Suc, ʒ ij à ʒ iiij. — Extrait, ʒ j à ʒ j.

P. Astringent actif.

BLANC DE BALEINE, *Voy.* ADIPOCIRE.

BOIS DE CAMPÊCHE, *Hæmatoxylon Campechianum*, Décand. monogyn. Légumin. Amérique.

F. D. Poudre, ʒj à ʒj.—Décoct. ʒij à ʒij par ℥ij d'eau.

P. Astringent.

Obs. Peu usité en France.

— GENTIL, *Voy.* GAROU.

— SAINT, *Voy.* GAYAC.

— DE SURINAM, *Voy.* QUASSIA.

BONNE-DAME, *Voy.* ARROCHE.

BORAX, (Borate-sur-saturé de soude, *Deuto-borate de sodium*).

Obs. Peu usité; remplacé par l'acide boracique.

BOUCAGE (petit), *Pimpinella Saxifraga*, Pentand digyn. Ombel. France. (Racine, semences.)

F. D. Infus. ʒj à ʒj par ℥ij de vin.

P. Diurétique, diaphorétique.

Obs. Actif, peu usité.

BOUILLON-BLANC, *Verbascum Thapsus*, Pentand. monogyn. Solan. Franc. (Herbe, fleurs.)

F. D. Fleur, Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Feuille en décoct. pour fomentation, lotion, bain; cataplasme.

P. Fleur, adoucissante, antispasmodique: pectorale. Feuille, émolliente.

BOULE DE MARS OU DE NANCY, *Voy.* TARTRATE DE POTASSE et DE FER.

BOULEAU, *Betula alba*, Monoéc. Tétrand. Ament. France. (Ecorce.)

F. D. Infus. théiforme.

P. Diurétique et sudorifique faible.

BOURRACHE, *Borrago officinalis*, Pentand. monogyn. Borrag. France. (Herbe, fleur.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Infusion, manip. j à ij par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒij. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Suc, ʒij à ʒiv. — Extrait. ʒj à ʒj. — Conserve des fleurs, ʒj à ʒss.

P. Rafraîchissante, diaphorétique.

BROU DE NOIX, *Voy.* NOYER.

BRYONE, *Bryonia alba*, Monoéc. syngén. Cucurbit. Fran. (Racine.)

F. D. Racine sèche, poudre, ʒj à ij. — Décoct. ʒβ à ʒj par ℥ij d'eau. — *Rac. fraîche*, décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Suc, ʒij à ʒβ. — Extrait, ʒj à ʒβ.

P. Drastique, emménagogue, antispasmodique. — *A l'extér.* résolutive, vésicante.

BUGLOSE, *Anchusa officinalis*, Pentand. monogyn. Borrag. Fran. (Feuille, fleur.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Infusion, manip. j à ij. — Eau distil. ʒij à iv. — Sirop, ʒij à ʒij. — Suc, ʒij à ʒiv. — Extrait, ʒj à ʒj. — Conserve, ʒj à ʒβ.

P. Celles de la bourrache.

BUIS, *Buxus sempervirens*, Monoéc. tétrand. Tithymal. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, infus. ʒβ à ʒiv par ℥ij d'eau ou de vin. (L'infus. vin. est plus active.) On dit que la feuille purge à ʒj.

P. Racine, Sudorifique; feuille, emménagogue.

Cas part. Syphilis , gale.

Obs. Actif, mais peu usité.

BUSSEROLE, *Voy.* RAISIN D'OURS.

C.

CABARET, *Asarum Europœum*, Dodécand. monogyn. Asar. Franc. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, poudre, ʒj à ʒj. — Infusion, ʒj à ʒij par ℥ij de vin. — Extrait, gr. xij à xxx. — Feuilles, poudre, gr. xij à ʒj. — Comme sternutatoire, pinc. j.

P. Emétique, purgatif, emménagogue.

Obs. Abandonné depuis la découverte de l'*ipécacuanha*.

CACAO, *Theobroma Cacao*, Polyadelph. pentand. Malvac. Amériq. mérid. (Fruit.)

F. D. Il fait la base du chocolat. — Beurre de cacao, ʒj à ʒij dans une émulsion ou en pilules mêlé avec du sucre. — Excipient des autres médicamens. — *A l'extér.* en pommade, suppositoire, etc.

P. Nourrissant, stomachique.—*Beurre*, adoucissant, pectoral.

CACHOU, *Mimosa Catechu*, Polygam. monoéc. Légumin. Indes. (Gomme-résine.)

F. D. Poudre, en pilules ou pastilles, gr. vj à 3℥.—Décoct. 3j à 3℥ par ℥ij d'eau.—Teinture,, g^{te} viij à 3℥.—En lavement, en gargarisme.

P. Astringent, tonique.

CAFÉ, *Coffea arabica*, Pentand. monogyn. Rubiac. Arab. Amériq. (Graine.)

F. D. Graine torréfiée, infus. 3j par 3iv d'eau bouillante.

P. Excitant, échauffant, fébrifuge.

Obs. Plutôt aliment que médicament.

CAILLELAIT, *Galium verum*, Tétrand. monogyn. Rubiac. Franc. (Sommités.)

F. D. Infus. 3ij par ℥ij d'eau.

P. Diurétique, antispasmodique.

Obs. Très-peu usité.

CALAGUALA, *Polypodium Calaguala*, Cryptogam. Foug. Amér. mérid. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Décoct. rapprochée, ʒij à ʒj par ℥ij d'eau.

P. Sudorifique.

Cas part. Syphilis.

Obs. Peu connue, non usitée en France.

CALAMUS AROMATICUS, *Voy.* ROSEAU AROMATIQUE.

CALOMÉLAS, *Voy.* MURIATE DE MERCURE DOUX.

CAMOMILLE VULGAIRE, *Matricaria Chamomilla*, Syngén. polygam. superfl. Corymb. Fran. (Herbe, particulièrement la fleur.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Infus. ʒss à ʒi par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiij. — Alcohol, ʒss à ʒj. — Teinture, ʒss à ʒjss. — Huile essent. gtte vj à xij dans une potion. — Suc, ʒi à ʒiij. — Extrait, ʒj à ʒss. — Conserve, ʒj à ʒj — *A l'extér.* en fomentation, lotion, bain, lavement.

P. Antispasmodique, carminative fébrifuge, emménagogue.

CAMOMILLE ROMAINE, *Anthemis nobilis*,
(Herbe, fleur.)

F. D. P. Comme la précédente.

CAMPBRE, suc extrait du *Laurus Camphora*, Ennéand. monogyn. Laur. Indes.

F. D. En poudre, en pilules, ou dans une émulsion, gr. j, gr. vj, ʒj; dans quelques cas, ʒj et jusqu'à ʒss par jour. — En lavement, dissous dans le jaune d'œuf, gr. xij, ʒj et même ʒij. — *A l'extér.* en liniment, en onguent, Q. S. — Alcool camphré, en lotion, fomentation, etc.

P. Antispasmodique, sudorifique, emménagogue, vermifuge, fébrifuge, calmant, anti-aphrodisiaque.

CAMPBRÉE, *Camphorosma Monspeliaca*, Tétrand. monogyn. Chénopod. Franc. (Plante entière.)

F. D. Infus. ʒj à ʒij par ℥j d'eau ou de vin blanc.

P. Diurétique, sudorifique, emménagogue.

CANNE DE PROVENCE, *Arundo Donax*, Triand. digyn. Gramin. Fran. (Racine.)

F. D. Décoct. ʒij à ʒj ʒ par lbij d'eau.

P. Sudorifique, diurétique.

Cas part. On la vante comme antilaiteuse.

CANELLE, *Laurus Cinnamomum*, Ennéand. monogyn. Laur. Indes. (Écorce.)

F. D. Poudre, gr. xij à ʒj. — Infus. ʒ ʒ à ʒj ʒ.
— Eau distil. ʒj à ʒ iij. — Alcool, ʒ ʒ à ʒj. —
Teinture, ʒ ʒ à ʒij. — Huile essent. gtte ij à viij.
— Sirop, ʒij à ʒij. — Extrait, gr. viij à ʒj.

P. Stomachique, tonique, emménagogue.

— BLANCHE, *V.* ÉCORCE DE WINTER.

CANTHARIDES, *meloe vesicatorius*, (Insectes.) France.

F. D. Poudre, en pilules ou dans une émulsion, gr. j à gr. ij. — Teinture, gtte ij à x dans une potion. — *A l'extér.* en vésicatoire ou en liniment, ʒj au plus.

P. Diurétiques, aphrodisiaques ; *à l'ext.* vésicantes, corrosives.

Obs. Très-dangereuses à l'intérieur.

CAPILLAIRE, *Adiantum Capillus Veneris*, Cryptogam. Foug. Fran. (Feuille.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒss à ʒiij.

P. Diaphorétique, adoucissant, pectoral.

CAPRIER, *Capparis spinosa*, Polyaud. monogyn. Capr. Fran. (Racine, écorce, fruit.)

F. D. Décoct. ʒij à ʒj par ℥j d'eau.

P. Ecorce, astringente, tonique, emménagogue, diurétique. — Racine, une des 5 racines apéritives mineures.

Obs. Peu usité.

CARBONATE D'AMMONIAQUE CRYSTALLISÉ,
(Sel d'Angleterre.)

F. D. En poudre ou en pilules, gr. vj à x. — Gr. x à ʒj par ℥ij de tisane. — Gr. viij à ʒj dans une potion. — *A l'extér.* en lotion, fomentation, bain.

— LIQUIDE, (Esprit de corne de cerf.)

F. D. Gtte x à xxx dans une potion. — *A l'extér.* Pur ou étendu dans l'huile.

P. Stimulant , sudorifique ; à l'extér.
 Rubéfiant , caustique.

CARBONATE DE CHAUX, (Craie , *Proto-carbonate de calcium.*)

Remplacé par le carb. de magnésie.

— DE FER, (Safran de mars apéritif ,
Proto-carbonate de fer.)

F. D. Gr. v, ʒj, ʒj en poudre ou en pilules.

— DE MAGNÉSIE, *Voy.* MAGNÉSIE.

— DE PLOMB, (Céruse, *Proto-carbonate de plomb.*)

A l'extér. Emplâtre , onguent.

P. Sédatif.

— DE POTASSE, (Sel d'absinthe, *Sous-deuto-carbonate de potassium*).

F. D. ʒss à ʒij par ℥ij de tisane. — Gr. vj à ʒj dans une potion. — *A l'extér.* en lotion, bain.

P. Stimulant , diurétique , sudorifique.

Obs. Très-usité ; il entre dans la potion anti-émétique de Rivière.

CARBONATE DE SOUDE, (Crystaux de soude, *Sous-deuto-carbonate de sodium*).

F. D. P. comme le précédent.

Obs. Il entre dans l'élixir antiscrophuleux de Peyrilhe.

CARDAMOME (petit), *Amomum Cardamomum*, Monand. monogyn. Drymyrrh. Indes. (Fruit.)

F. D. Poudre, ℥j à 3℥. — Teinture, gttē xv à xxx dans une potion. — Huile essent. gttē vj à xij.

P. Stimulant, emménagogue, aphrodisiaque, diaphorétique, antispasmodique.

CAROTTE, *Daucus Carotta*, Pentand. digyn. Ombel. France. (Racine, feuilles, semences.)

F. D. Semences, poudre, ℥j à 3℥. — Infusion, 3℥ à 3ij par ℔ij d'eau. — Feuilles, infusion, manip. j par ℔ij d'eau. — Racine, décoct. Q. V. — Sirop, 3j à 3ij. — *A l'extér.* racine en cataplasme.

P. Carminative, diurétique, anthelmin-

thique, emménagogue. — *Sirop*, adoucissant, pectoral.

Obs. L'une des 4 semences chaudes mineures.

CARTHAME, *Carthamus tinctorius*, Singén. polygam. ég. Cynarocéph. France cultiv. (Graine.)

F. D. ℥ij à ʒjss, en émulsion.

P. Purgatif.

Obs. Abandonné; il entre cependant dans quelques compositions officinales.

CARVI, *Carum Carvi*, Pentand. digyn. Ombell. France. (Graine.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒj dans du vin. — Eau distil. ℥j à ʒiij. — Alcool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gtle ij à vj.

P. Stimulant, carminatif.

CASCARILLE, *Croton Cascarilla*, Monoéc. monadelph. Tithym. Amérique méridion. (Écorce.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒj. — Infus. décoct. ʒj à ʒiij par lbij d'eau. — Alcool, ʒj à ʒj. —

Teinture, 3 ℥ à 3 j. — Sirop, 3 ℥ à 3 ij. — Sirop préparé au vin, 3 ij à 3 ℥. — Extrait, 3 ℥ à 3 j.

P. Stomachique, tonique, fébrifuge.

Obs. On l'unit souvent au quinquina.

CASSE, *Cassia fistula*, Décand monogyn. Légum. Indes orient. et occident. (Gousse.)

F. D. Pulpe, 3 ℥ à 3 ij. — Casse cuite, 3 ij à j. — Extrait, 3 ℥ à 3 j. — Gousse en decoct. ij à 3 vj par ℔ ij d'eau.

P. Laxative, minorative.

CASTOREUM, Suc qui se trouve dans deux poches situées aux aines du *Castor ber*.

F. D. En pilules, gr. vj à 3 ℥ (2 ou 3 fois par jour). — En lavement, 3 ℥ à 3 j. — Teinture, 3 ℥ à xxx.

P. Antispasmodique, emménagogue.

CENTAURÉE (petite), *Gentiana Centaureum*, Pentand. digyn. Gentian. France. (Sommités.)

F. D. Poudre, 3 j à 3 j. — Infus. decoct. 3 j à 3 ij.

par ℥ ij d'eau. — Eau distil. ℥ j à ℥ iv. — Teinture.
 3 ℔ à 3 ij. — Suc, 3 ij à 3 iij. — Extrait, 3 j à 3 ij.

P. Tonique, fébrifuge.

CERFEUIL, *Scandix Cerefolium*, Per-
 tand. digyn. Ombell. Franc. (Herbe.)

F. D. Infusion, manip. j à ij par ℥ ij d'eau.
 — Eau distil. 3 ij à 3 iv. — Sirop, 3 ℔ à 3 ij.
 Suc, 3 ij à 3 iv. — Extrait, 3 j à 3 ij.

P. Tonique, antiscorbutique.

CÉRUSE, *Voy.* CARBONATE DE PLOMB.

CÉVADILLE, *Veratrum Sabadilla*, (Grain
 d'une plante inconnue.)

F. D. Poudre, dans du miel, gr. vj à 3 ℔.
 Infus. 3 ℔ à 3 j par ℥ ij d'eau.

P. Anthelmintique.

Obs. Dangereuse à l'intérieur; usitée
 l'extérieur pour tuer les poux.

CHACRILLE, *Voy.* CASCABILLE.

CHAMÉDRYS, *Voy.* GERMANDRÉE.

CHAMÆPYRIS, *Voy.* IVETTE.

CHARDON-BÉNIT, *Centaurea benedicta*
 Syngén. polygam. frustr. Cynarocépl
 Europ. (Herbe, graine.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒj. — Infusion, manip. à j par ℥ij de vin (cochl. j à iv le matin.) — Eau distil. ʒij à ʒiij. — Teinture, ℥j à ʒj. — uc, ʒj à ʒiij. — Extrait, ʒss à ʒj. — *Semences*, n émulsion, ʒss à ʒij.

P. Tonique, fébrifuge, sudorifique, diurétique. — A forte dose, émétique.

CHARDON-ROLAND, *Eryngium campestre*, entand. digyn. Ombell. Franc. (Racine.)

F. D. Décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Du reste, comme le précédent.

P. Diurétique, emménagogue.

CHAUX, (*Protoxide de calcium.*)

F. D. Eau de chaux, ℥ss à ℥ij par jour, rdinairement coupée avec le lait. — *A l'extér.* a lotion, fomentation, bain.

P. Anti-acide, antivénéneuse, désinfectante, détersive.

Cas part. Aigreurs d'estomac, empoisonnement par l'acide arsénique.

Obs. Dangereuse à l'intérieur; remplacée par la magnésie.

CHÊNE, *Quercus robur*, Monoéc. poand. Ament. Franc. (Écorce, fruit.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Décoct. ʒij à ʒj par ℥ij d'eau. — *Glands torréfiés*, dans une émulsion, ʒij à ʒiij. — *A l'extér.* décoct. a ou vin. en gargarisme, lotion, fomentation, injection.

P. Tonique, astringent, fébrifuge.

CHÊNE (petit), *Voy.* GERMANDRÉE.

CHICORÉE SAUVAGE, *Cichorium intybus*.
Syngén. polygam. ég. Chicor. France.
(Racine, herbe, graine).

F. D. Racine, décoct. ʒss à ʒij par ℥ij d'eau. — *Feuilles*, manip. ss à j par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒj à ʒij. — Suc, ʒij à ʒiv. — *Extrait*, gr. x à ʒss.

P. Tonique, diurétique, laxative.

Obs. Les graines font partie des quatre semences froides mineures.

CHIENDENT, *Triticum repens*, Triandrigyn. Gramin. Fran. (Racine.)

F. D. Décoct. ʒss à ʒj par ℥ij d'eau. — *Extrait*, ʒss à ʒij.

P. Rafraîchissant.

Obs. L'une des cinq racines apéritives mineures.

CHOUX MARIN , *Voy.* SOLDANELLE.

— ROUGE, *Brassica oleracea*, Tétradyn. siliq. Crucif. Franc. (Feuilles.)

F. D. Infusion, manip. j par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒ β à ʒ ij. — *À l'extér.* en cataplasme.

P. Astringent léger, pectoral.

CIGUE AQUATIQUE, *Phellandrium aquaticum*, Pentand. digyn. Ombell. Franc. (Graine.)

F. D. Poudre, progressivement de gr. iv à ʒ j, sous forme d'électuaire. — On l'a prescrite à la dose de ʒ β avant le paroxysme des fièvres intermittentes.

P. Expectorante, fébrifuge.

Cas part. Phthisie pulmonaire.

— (GRANDE), *Conium maculatum*, Feuilles.)

F. D. Poudre, progressivement, gr. ij à ʒ j. — Infus. ʒ β à ʒ j par ℥ij d'eau. — Suc, gttc viij ʒ j. — Extrait, progressivement, gr. β, gr. j à ʒ j.

— *A l'extér.* en cataplasme , lotion , fomentation , onguent , emplâtre.

P. Narcotique , diurétique , résolutive.

Cas part. Squirrhe , cancer , rhumatisme chronique.

Obs. Son emploi exige de la prudence.

CINA, *Voy.* SEMEN-CONTRA.

CINNABRE, *Voy.* SULFURE DE MERCURE.

CITRON, *Citrus Medica*, Polyadelphicosand. Hespérid. Franc. mérid. (Feuille , fruit.)

F. D. Feuilles, infus. théif. — *Écorce du fruit*, Poudre, ʒj à ʒj. — Alcool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gtle iv à viij. — Sirop, ʒss à ʒij. — *Suc du fruit*, ʒij par ℥ij d'eau sucrée, (Limonade végétale.)

P. Parties aromatiques , stomachiques , antispasmodiques , astringentes. — *Paracides*, rafraîchissantes , délayantes.

CITROUILLE, *Cucurbita Citrullus*, Monoc. syngén, Cucurbit. Franc. cult (graine.)

F. D. ʒj à ʒiv en émulsion.

P. Rafrâichissante.

Obs. Une des 4 semences froides majeures.

CLÉMATITE , *Clematis erecta*, Polyand. monogyn. Renoncul. Fran. (Feuille, fleur.)

F. D. Poudre, gr. j à iij, 2 à 3 fois par jour. — Infus. ʒ ss à ʒ ij par ℥ j d'eau. — Extrait, gr. ss à gr. ij. — *A l'extér.* la poudre, les feuilles contuses.

P. Laxative , sudorifique , diurétique ; vésicante , corrosive.

Obs. N'est guère employée qu'à l'extérieur.

CLOPORTE , *Oniscus Asellus*.

F. D. Poudre, ʒj à ʒ ij. — Suc, cochl. j plusieurs fois le jour.

P. Diurétique.

Obs. Abandonné.

CLOUS DE GIROFLE , *Voy.* GIROFLE.

COCHLEARIA , *Cochlearia officinalis*, Tétradyn. silicul. Crucif. France. cult. (Plante entière.)

F. D. Suc, ℥ss à ℥iij. — Infus. ℥j à ℥ij par ℔ij d'eau. — Eau distil. ℥ij à ℥iv. — Alcool, ℥ss à ℥j. — Sirop, ℥ij à ℥ij. — Extrait, ℥ss à ℥j. — Conserve, ℥ss à ℥j.

P. Altérant, antiscorbutique.

CODAGA-PALE, *Nerium antidysentericum*, Pentand. monogyn. Apocin. Inde orient. (Écorce.)

F. D. Poudre, en électuaire avec un sirop aromatique, ℥ss à ℥ss.

P. Tonique, astringent.

Cas part. Diarrhée, dysenterie chron.

Obs. Peu connue, peu usitée.

COING, *Pyrus Cydonia*, Icosand. pentagyn. Rosac. Franc. cult. (Fruit, semences.)

F. D. Fruit, décoct. infus. ℥j à ℥iij par ℔ij d'eau. — Sirop, ℥ss à ℥ij. — Pulpe, à l'extér. en cataplasme. — Semences, décoct. Q. S. pour lotion, fomentation.

P. Fruit, astringent. — Semences, émollientes.

COLCHIQUE, *Colchicum autumnale*, Héxand. trigyn. Jonc. Europ. mérid. (Bulbe.)

F. D. Poudre, gr. j à iv.—Sirop, ʒ ij à ʒ j.—Vinaigre, cochl. β. — Oximél, cochl. j.

P. Purgatif, diurétique.

Obs. Dangereux, peu usité, remplacé par la scille.

COLCOTHAR, *Voy.* FER.

COLLE DE POISSON, *V.* YCTHYOCOLLE.

COLOMBO, plante inconnue, qu'on suppose être le *Menispermum hirsutum*. Indes. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒ j à ʒ β. — Décoct. ʒ β à ʒ j par lb j d'eau, (par tasses).—Vin, ʒ β à ʒ j par lb ij (plusieurs cuillerées par jour).—Teinture, ʒ j à ʒ ij. — Extrait, gr. xvij à ʒ β.

P. Stomachique, anti-émétique.

COLOPHONE, résine du *Pinus sylvestris*, Monoéc. monadelph. Conif. Franc.

Obs. Elle entre dans quelques emplâtres.—En poudre, comme astringent et styptique contre les hémorrhagies.

COLOQUINTE, *Cucumis Colocynthis*,
Monoéc. syngén. Cucurbit. Franc. cult.
(Fruit.)

F. D. Pulpe, comme altérant, gr. ss, toutes les 3 heures; comme purgatif, gr. ij à xij. — Poudre, comme vermifuge, gr. ij à vj. — Extrait, gr. ij à xij. — Teinture, g^{tte} iv à x et rarement ℞j.

P. Drastique, diurétique, emménag.
Obs. Peu usitée en France.

CONCOMBRE, *Cucumis sativus*, (Graine.)

F. D. En émulsion, j à ̄ iv.

P. Adoucissant, rafraîchissant.

Obs. L'une des 4 semences froides majeures.

— SAUVAGE, *Momordica Elaterium*,
(Racine, fruit.)

F. D. Racine, poudre, gr. vj à xv. — Extrait, gr. j à viij et rarement ℞j.

P. Drastique, émétique.

CONSOUDE, *Symphitum officinale*, Pen-

tand. monogyn. Borrag. Franc. (Racine, herbe, fleur.)

F. D. Racine, décoct. $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{ij}$ par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau. — *Fleurs*, infusion, pinc. ij à iiij par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau. — *Sirop*, $\text{℥} \text{j}$ à $\text{℥} \text{iiij}$. — *Feuille*, en cataplasme, lotion, fomentation.

P. Astringent faible.

CONTRAYERVA, *Dorstenia Contrayerva*, Tétrand. monogyn. Urtic. Amériq. mérid. (Racine.)

F. D. Poudre, $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{j}$. — *Infus.* $\text{℥} \text{ij}$ à $\text{℥} \text{j}$ par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau.

P. Tonique, astringente, sudorifique.

COPAHU, *Voy. TÉRÉBENTHINE DE COPAHU*.

COQUELICOT, *Papaver Rhæas*, Polyand. monogyn. Papav. Franc. (Fleur.)

F. D. Pétales, infusion, pinc. ij à iiij et plus par $\text{℔} \text{ij}$ d'eau. — *Eau distil.* $\text{℥} \text{j}$ à $\text{℥} \text{iiij}$. — *Sirop*, $\text{℥} \text{ij}$ à $\text{℥} \text{j}$. — *Teinture*, gtte xviij à $\text{℥} \text{ss}$ dans une potion. — *Extrait des capsules*, gr. ij à vj .

P. Narcotique, pectoral.

Cas part. Affections aiguës de poitrine, insomnie.

CORALLINE, *Corallina officinalis*, (Espèce de zoophyte.) Europe.

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infus. 3j à 3j par ℥ij d'eau. — Sirop, 3ss à 3j.

P. Astringente, vermifuge.

CORIANDRE, *Coriandrum sativum*, Pentand. digyn. Umbell. Franc. (Graines.)

F. D. Poudre, ℥j à 5ss. — Infus. 3j à 3j par ℥ij d'eau. — Huile essent. gttē ij à xij.

P. Carminative, légèrement narcotique.

Obs. Peu usitée.

CORNE DE CERF.

F. D. Décoct. 3j à 3ij par ℥ij d'eau. — Gelée, cochl. ij à vj et plus.

P. Adoucissante, nutritive.

COULEUVRÉE, *Voy.* BRYONE.

COUPEROSE BLANCHE, *Voy.* SULFATE DE ZINC.

— BLEUE, *Voy.* SULFATE DE CUIVRE.

— VERTE, *Voy.* SULFATE DE FER.

COURGE, *Cucurbita Lagenaria*, Monoéc.
syngén. Cucurbit. Franc. cult. (Graine.)

F. D. Emulsion, \mathfrak{z} j à \mathfrak{z} iv.

P. Rafraîchissante, adoucissante.

Obs. L'une des 4 semences froides maj.

CRAIE, *Voy.* CARBONATE DE CHAUX.

CRÈME DE TARTRE, *Voy.* TARTRATE
ACIDULE DE POTASSE.

CRESSON ALÉNOIS, *Lepidium sativum*, Tétr.
rad. silicul. Crucif. Franc. cult. (Herbe.)

F. D. Suc, \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} iv.

— ÉLÉGANT, *Cardamine pratensis*.
Herbe, fleur.)

Obs. Peu usité.

— DE FONTAINE, *Sisymbrium Nasturtium*.
Herbe.)

F. D. Infus. \mathfrak{z} j à \mathfrak{z} ij par \mathfrak{v} ij d'eau. — Eau
stil. \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} iij. — Sirop, \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} ij. — Suc, \mathfrak{z} ij
 \mathfrak{z} iv. — Extrait, \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} j.

Obs. Très-employé.

P. Toutes ces plantes sont antiscorbu-
tiques et stimulantes.

CUIVRE. Inusité à l'état métallique.

Oxides rouge et noir, (*Protoxide* et *Deutoxide de cuivre.*)

Obs. Ils ne sont employés qu'à l'extérieur comme cathérétiques, ou incorporés dans des onguens.

Oxide de cuivre ammoniacal, (*Deuto-ammoniate de cuivre.*)

F. D. En pilules, progressivement $\frac{1}{8}$ de grain à gr. ij dans 20 fois autant d'excipient.

P. Antispasmodique.

Cas part. Épilepsie, hydrophobie.

CUMIN, *Cuminum Cyminum*, Pentand. digyn. Ombell. Afriq. (Graine.)

F. D. Poudre, ℞j à 3℞. — Infus. ʒj à ʒiij par ℥ij d'eau. — Huile essent. gttē ij à x. — *A l'extér.* en lotion, fomentation.

P. Carminatif, diurétique, résolutif.

Obs. Peu employé à l'intérieur.

CYNOGLOSSE, *Cynoglossum officinale*, Pentand. monogyn. Borragin. Euro. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, poudre, ℥j à 3j. — Décoct. ℔ à 3ij par ℔ij d'eau. — Sirop, 3ij à 3ij. — Extrait, gr. xij à 3℔. — *Feuilles*, infusion, manip. 3 par ℔ij d'eau.

P. Calmante, antispasmodique, narcotique.

CYNORRHODON, *V. ROSIER SAUVAGE.*

D.

DATURA-STRAMONIUM, *Voy. POMME PINEUSE.*

DATTES, fruit du *Phoenix dactylifera*, Cryptogam. Palm. Indes.

F. D. Décoct. n° x à xv par ℔ij d'eau. — En compotte, Q. V.

P. Adoucissantes, pectorales, légèrement stringentes.

DENT-DE-LION, *Voy. PISSENLIT.*

DENTELAIRE, *Plumbago Europæa*, Pennand. monogyn. Plombagin. France. (Racine, rarement les feuilles.)

F. D. Poudre, gr. ij à viij. — Infus. gr. ij à viij

par ℥j d'eau. — *A l'extér.* bouillie dans l'huile en friction.

P. Emétique, purgative, irritante, rubéfiante.

Obs. Peu usitée à l'intérieur ; prescrite quelquefois comme *Sialagogue*.

DIAGRÈDE, *Voy.* SCAMMONÉE.

DIGITALE, *Digitalis purpurea*, Didym. nam. angiosperm. Person. France. (Plan. entière, particulièrement la feuille.)

F. D. Feuilles, poudre, gr. xviii à ℥j en plusieurs prises. — Infus. ℥j à ℥iij par ℥ss d'eau. — Teinture, gttē xv à ℥ss dans une potion. — Extrait, gr. xij à xxx. — *A l'extér.* en lavement, fomentation, lotion, onguent, en plâtre.

P. Diurétique, sédative ; provoque quelquefois le vomissement et les selles.

Cas part. Hydropisie, scrophules, phthisie, épilepsie, etc.

Obs. Très-usitée ; son emploi demande de la prudence.

DORSTÉNIE, *Voy.* CONTRAYERVA.

DOMPTE-VENIN, *Voy.* ASCLEPIAS VIN-
CETOXICUM.

DOUCE - AMÈRE, *Solanum Dulcamara*,
Pentand. monogyn. Solan. Fran. (Tige ,
feuille.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Décoct. ʒij à ʒβ
par ʒij d'eau. — Extrait, progressivement,
gr. xij à ʒj, ʒβ.

P. Diurétique, sudorifique.

Cas part. Rhumatisme et goutte chroni-
ques, dartres, scrophules.

E.

EAUX MINÉRALES, naturelles et artifi-
cielles.

— *sulfureuses, thermales.* Barèges (H.-
Pyrénées), D. D. P. (Ce signe veut dire
qu'on trouve ces eaux aux dépôts d'eaux
minérales à Paris.) — Saint-Sauveur (*id.*).
— Bonnes (B.-Pyrénées), D. D. P. —
Cauterets (*id.*), D. D. P. — Cambo (*id.*),
— Bagnères-de-Luchon (H.-Garonne),

D. D. P. — Aix-la-Chapelle , D. D. P. — Saint - Amand (Nord). — Ax (Arriège). — Digne (B.-Alpes). — Gréoulx (*id.*). — Bagnols (Lozère). — Bade (Suisse). — Baden (Souabe). — Evaux (Creuse). — Wisbaden (Allemagne). — Bagnolles (Orne). — Aix (Mont-Blanc). — Acqui (Italie). — Arles (Pyrénées-Orientales).

Eaux Sulfureuses , froides. Enghein (Seine-et-Oise), D. D. P. — Roche - Posay (Vienne).

D. Par verres ℥ j, ij, progressivement ℥ vj coupées avec le lait ou une décoct. émolliente. — *A l'extér.* bain , douche , lotion , injection.

P. Apéritives , diurétiques , fondantes.

Cas part. Dartres , scrophules , rhumatisme et goutte chroniques ; paralysie , convulsions ; blessures anciennes , etc.

Eaux acidules ou gazeuses , thermale Nérís (Allier). — Chaudes-Aigues (Cantal) — Mont-D'or (Puy-de-Dôme), D. D. P.

— Chatel-guyon (*id.*), D. D. P. — Clermont-Ferrand (*id.*). — Saint-Mart (*id.*). — Dax (Landes). — Encausse (H.-Garonne). — Ussat (Arriège).

Eaux acidules, froides. Chateldon (Puy-de-Dôme), D. D. P. — Bar (*id.*). — Saint-Myon (*id.*), D. D. P. — Médague (*id.*). — Vic-le-Comte (*id.*). — Mont-D'or (*id.*), D. D. P. — Mont-Brison (Loire). — Saint-Galmier (*id.*). — Langeac (H.-Loire). — Pougues (Nièvre), D. D. P. — Seltz (Hesse-Cassel), D. D. P. — Alfter (Principauté de Salm). — Sulzmatt (H.-Rhin).

D. Par verres, progressivement, ℥ss à ℥iv , seules ou coupées avec le vin ou avec une infusion aromatique ou amère.

P. Rafraîchissantes, diurétiques, apéritives, antispasmodiques.

Cas part. Affections spasmodiques, hypochondrie, leucorrhée, etc.

Eaux ferrugineuses acidules, thermales.
 Vichi (Allier), D. D. P. — Bourbon-
 l'Archambault (*id.*). — Rennes (Aude).

— *ferrugineuses acidules, froides.* Spa
 (Pays-Bas), D. D. P. — Tongres (*id.*).
 — Forges (Seine-Infér.), D. D. P. —
 Aumale (*id.*). — Rouen. (*id.*). — Saint-
 Pardoux (Allier). — Chapelle-Godefroi
 (Aube). — Bussang (Vosges), D. D. P. —
 Saint-Gondon (Loiret). — Noyers (*id.*).
 — Ferrières (*id.*). — Segray (*id.*). —
 Contrexeville (Vosges), D. D. P. —
 Fontenelle (Vendée). — Watwelier
 (Haut-Rhin). — Passy (Seine), D. D. P.
 — Mont-Lignon (Seine-et-Oise). — Bou-
 logne (Pas-de-Calais). — Alais (Gard).
 — Cransac (Aveyron), D. D. P. — Ser-
 maise (Marne). — Vals (Ardèche), D.
 D. P. — Provins (Seine-et-Marne).

D. Par verres ℥j, ij, progressivement ℥ xij,
 pures ou coupées avec l'eau ou le vin, etc. —
A l'extér. bain, douche, lotion, fomentation.

P. Toniques , astringentes , altérantes.

Cas part. Leucorrhée , gonorrhée , épuisement.

Eaux salines , thermales. Plombières (Vosges), D. D. P.—Bains (*id.*).—Luxeuil (Haute-Saône). — Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), D. D. P. — Sylvanès (Aveyron). — Lucques (Italie). — Lamotte (Isère), D. D. P. — Balaruc (Hérault), D. D. P. — Saint-Gervais , près Genève. — Bagnères (Hautes Pyrénées), D. D. P. — Aix (Bouches-du-Rhône).

— *Salines , froides.* Pyrmont (Westphalie), D. D. P. — Pouillon (Landes). — Sedlitz (Bohême), D. D. P. — Seydschutz (*id.*). — Epsom (Angleterre). — Jouhe (Jura).

D. Par verres ℥j , ij progressivement ℥xij.
— *A l'extér.* bain , douche , lotion.

P. Apéritives , purgatives , résolitives.

Cas part. Engorgemens des viscères

abdominaux , ictère , apoplexie séreuse , asthme , paralysie , etc.

ECORCE DE WINTER, selon quelques naturalistes , *Drymis Winteri* , *Drymis Forsteri* , Polyand. polygyn. Drymyrrh. Amériq. ; selon d'autres , *Winterania Canella* , *Canella alba*.

F. D. Poudre, gr. xij à 3ß. — Infus. dans du vin, 3ß à 3j.

P. Stomachique , carminative.

Obs. Peu usitée ; succédané de la cannelle.

ECREVISSSES.

F. D. Infus. n° viij à xij par ℥ij d'eau. — *Yeux ou pierres* , poudre, 3j à 3j.

P. Entières , diurétiques , aphrodisiaques. — *Yeux* , absorbans , anti-acides.

ELATERIUM , *Voy.* CONCOMBRE SAUVAGE.

ELÉMI, *Amyris Elemifera*, Octand. monogyn. Térébenth. Indes. (Gomme-résine).

Obs. Inusitée seule ; employée dans quelques composés officinaux. On la dit diurétique , vulnéraire.

ELLÉBORE. BLANC, *Veratrum album*, Polygam. monoéc. Jonc. France. (Racine).

F. D. Poudre, gr. ij à vj. — Infus. ʒj à ʒij par ℥j d'eau, à prendre par cuillerée. — Infus. ʒj par ʒxx de vinaigre (une cuillerée toutes les 2 ou 3 heures). — *A l'extér.* une petite pincée comme sternutatoire.

P. Emétique ; drastique.

Obs. Dangereux ; presque inusité.

— NOIR, *Helleborus niger*, Polyand. polygyn. Renoncul. France. (Racine).

F. D. Poudre, gr. x à ʒj. — Décoct. ʒ℥ à ʒj par ℥ij d'eau, à prendre par verres jusqu'à effet purgatif. — Vin, cochl. j à ij. — Teinture, j à ʒ℥. — Extrait, gr. x à ʒj.

P. Purgatif, émétique, emménagogue, vermifuge.

ÉMÉTIQUE, *Voy.* TARTRATE ANTIMONIÉ DE POTASSE.

ENULA CAMPANA, *Voy.* AUNÉE.

EPINARD, *Spinacia oleracea*, Dioéc.
pentand. Chénop. Franc. cult. (Feuilles).

F. D. Décoction, manip. j par ℥ij d'eau. —
A l'extér. en lavement, fomentation, lotion,
bain, cataplasme.

P. Délayant, adoucissant, émollient.

EPINE - VINETTE, *Berberis vulgaris*,
Héxand. digyn. Berbér. Franc. (Fruit).

F. D. Suc, ℥ij par ℥ij d'eau. — Sirop, ℥j
à ℥ij. — Suc pur, ℥ij à ℥ss.

P. Rafraîchissante, diurétique.

ERYSIMUM, *Voy.* VÉLAR.

ESPRIT DE MINDÉRÉRUS, *Voy.* ACÉTATE
D'AMMONIAQUE.

ETAIN.

F. D. Poudre, gr. x à ʒj et même ʒss par jour,
incorporée dans de la mélasse ou un électuaire.

Oxide blanc d'étain, (*Deutoxide
d'étain*).

F. D. Poudre, gr. vj à xij.

P. Vermifuge.

Obs. Amalgame d'étain, ʒj, pendant plusieurs jours , dans la lèpre.

ETHERS, acétique, muriatique, nitrique, sulfurique.

F. D. ʒj à ʒj dans une potion. — Quelques gttes sur du sucre. — Sirop, ʒij à ʒj. — *A l'extér.* ʒij à ʒss en liniment, en fomentation, en vapeurs.

P. Calmans , antispasmodiques.

Obs. Il n'y a guère que l'éther sulfurique d'usité.

ETHIOPS MARTIAL, *Voy.* FER.

— MINÉRAL , *Voy.* SULFURE DE MERCURE.

EUCALYPTUS , *Eucalyptus resini - fera* (Withe) , Icosand. monogyn. Myrtoid. Nouvelle-Hollande. (Résine).

F. D. Gr. xvj à xl en pilules.

P. Antidysentérique.

Obs. Peu connue.

EUPATOIRE , *Eupatorium cannabinum* , Syngén. polygam. eg. Corymbif. Franc. (Feuille).

F. D. Décoction, manip. j à ij par ℥ ij d'eau ou de petit lait. — Teinture, g^{tte} xx à xxxvj. — Suc, ℥ ij à ℥ iv. — *A l'extér.* cataplasme.

P. Purgative, hydragogue, résolutive.

Obs. Peu ou point usitée.

EUPHORBIE, *Euphorbia officinarum*, Don. décand. trigyn. Tithymal. Afriq. (Gomme-résine).

F. D. Gr. ij à viij dans du vin blanc. — Eau de lavement, ℥ j à ℥ ss. — *A l'extér.* poudre, onguent, liniment.

P. Drastique violent, rubéfiant, vésicant.

Obs. Très-dangereux à l'intérieur.

EUPHRAISE, *Euphrasia officinalis*, Didym. angiosp. Rhinant. Franc. (Herbe).

F. D. Poudre, ℥ ss à ℥ j. — Infus. théiforme. — Eau distil. ℥ ij à ℥ iv. — Suc, ℥ j à ℥ iij. — *A l'extér.* lotion, collyre.

P. Calmante, antispasmodique, astringente.

Obs. Peu usitée à l'intérieur.

EXTRAIT DE SATURNE, *Voy.* ACÉTATE
DE PLOMB.

F.

FENOUIL, *Anethum Fœniculum*, Pentand. digyn. Ombell. Franc. (Plante entière, particulièrement les semences).

F. D. Semences, poudre, ʒj à ʒß.—Infus. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Teinture, g^{tte} xx à xxx. — Huile essent. g^{tte} ij à viij. — Racine, décoct. ʒß à ʒj par ℥ij d'eau. — Feuilles, en cataplasme. — *A l'extér.* vapeur, fumigation, lavement, lotion, bain, etc.

P. Stimulant, diurétique, résolutif.

Obs. Une de 5 racines apéritives; une des 4 semences chaudes majeures.

FER (LIMAILLE DE).

F. D. Gr. xij à ʒj, quelquefois ʒj en pilule, ou en suspension dans un liquide.

OXIDE DE FER NOIR, (Ethiops martial, Protoxide de fer).

D. Gr. xij à ʒß en plusieurs prises.

Oxide de fer rouge, (Safran de Mars astrigent, *Deutoxide de fer*).

D. Comme le précédent.

Vin chalibé, ʒ ss à ʒ j.—Teintures martiales : ʒj à 3 ss.—Eau ferrée, par verres. — *A l'extérieur* lotion, fomentation, injection.

P. Toniques, astringens, styptiques.

Cas part. Chlorose, aménorrhée, blennorrhée, etc.

FÈVE DE SAINT-IGNACE, *Ignacia amara*, *Strychnos Ignatii*, Pentand. monogyn. Apocyn. Inde orient.

F. D. Poudre, gr. ij à vj, très-rarement gr. x et xx.—Teinture, une cuillerée à café, dans une tasse d'infusion aromatique, 2 ou 3 fois le jour.

P. Purgative, fébrifuge.

Cas part. Fièvre intermittente, goutte.

Obs. Peu usitée ; elle paraît avoir les vertus de la noix vomique.

FIEL DE BOEUF, *Voy.* BILE DE BOEUF.

FIGUIER, *Ficus carica*, Polygam. trioéc. Urt. Franc. cult. (Fruit).

F. D. Décoct. n^o vj à x par ℔ij d'eau ou

de lait. — En compottes. — *A l'extér.* gargarisme.

P. Pectorales, laxatives, adoucissantes.

FLEURS DE BENJOIN, *Voy.* ACIDE BENZOÏQUE.

— DE MUSCADE, (MACIS,) *Voy.* MUSCADE.

— DE SOUFRE, *Voy.* SOUFRE.

FOIE D'ANTIMOINE, } *Voy.* SULFURES.

— DE SOUFRE,

FOLLICULES DE SÉNÉ, *Voy.* SÉNÉ.

FONDANT DE ROTROU, *V.* ANTIMOINE.

FOUGÈRE MALE, *Polypodium Filix mas*,
Cryptogam. Foug. Franc. (Racine).

F. D. Poudre, ʒss à ʒij. — Décoct. ʒss à ʒj
par 1℔j d'eau ou de lait. — Eau distil. ʒij à ʒiv.
— Vin, ʒss à ʒj. — Teinture, ʒss à ʒj. — Ex-
trait, ʒss à ʒj.

P. Vermifuge, tonique, emménagogue.
Cas part. Tænia.

FRAISIER, *Fragaria vesca*, Icosand. po-
lygyn. Rosac. Franc. (Racine, fruit).

F. D. Racine, décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau.
— *Fruit*, suc, ʒij à ʒiv par ℥ij d'eau.

P. Racine, diurétique, légèrement astringente. — *Fruit*, rafraîchissant.

FRAMBOISE, fruit du *Rubus idæus*.

F. D. Suc, ʒij à ʒiij par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒj à ʒij.

P. Rafraîchissant.

FUMETERRE, *Fumaria officinalis*, Diadelph. héxand. Papav. Franc. (Plante entière).

F. D. Poudre, ʒss à ʒij. — Décoction, manip. j par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒij à ʒij. — Extrait, ʒss à ʒij. — Suc, ʒij à ʒvj.

P. Tonique, emménagogue.

G.

GALANGA, *Maranta Galanga*, Monand. monogyn. Drymyrrh. Indc. Franc. cult. (Racine-).

F. D. Poudre, gr. vj, ʒj à ʒj. — Alcool, ʒss à ʒj.

— Teinture, 3℥ à 3 ij. — Extrait, gr. xij à 3℥.

P. Stimulant, stomachique, carminatif.

GALBANUM, *Bubon Galbanum*, Pentand. digyn. Ombell. Afriq. (Suc épaissi).

F. D. Poudre, gr. iv à ʒj en pilules ou dans une potion, dissoute avec le jaune d'œuf. — Teinture, g^{tte} x à xx. — *A l'extér.* emplâtre, fumigation.

P. Antispasmodique, emménagogue, stimulant.

Cas part. Asthme, hystérie, engorgemens froids.

GALLES (NOIX DE), végétation produite par la piquûre d'un insecte (*Cynips*), sur les feuilles du *Quercus ilex* ou du *Quercus cerris*, Monoéc. polyand. Ament. Europ. Asie.

F. D. Poudre, gr. x à ʒj et même 3j. — Infus. 3j à 3 ij par ℥ij d'eau. — *A l'extér.* décoct. rapprochée, en injection, fomentation, lotion.

P. Astringentes, fébrifuges, styptiques.

GARANCE, *Rubia tinctorum*, Tétrand. monogyn. Rubiac. Franc. (Racine).

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ j. — Décoct. ʒ ij à ʒ j par ℥ ij d'eau.

P. Astringente, diurétique.

Obs. Une des 5 racines apéritives.

GAROU, *Daphne Mezereum*, *D. Gnidium*, *D. Laureola*, *D. Thymelœa*, Octand. monogyn. Daph. Franc. (Ecorce).

F. D. Poudre, gr. iv à x. — Décoct. ʒ ss à ʒ j par ℥ iij d'eau réduite à ℥ ij, (ʒ iv, 2 à 4 fois par jour. *Alexis Russel*). — Extrait, gr. j à iij. — *A l'extér.* ramollie dans le vinaigre, comme vésicatoire.

P. Sudorifique, émétique, vésicant, corrosif.

Cas part. Syphilis, dartres.

Obs. Dangereux, peu usité à l'intérieur.

GAYAC, *Guaiacum officinale*, Décand. monogyn. Rutac. Amériq. (Bois, écorce).

F. D. Poudre, ʒ j à ʒ j. — Décoct. ʒ ss à ʒ i par ℥ ij d'eau. — Teinture, ʒ ss à ʒ j. — Extrait

℥j à 3℔. — *A l'extér.* teinture dans un gargarisme.

P. Sudorifique, antisypilitique.

Cas part. Goutte et rhumatisme chroniques, odontalgie.

Obs. Très-usité. Un des 4 bois sudorifiques.

GÉLATINE (Extrait de).

D. ℥j à 3j. — *P.* Fébrifuge.

GENIÈVRE, *Juniperus communis*, Dioéc. monadelph. Conif. Europ. (Bois, baies).

F. D. Bois, infus. ℥j à 3ij par ℔ij d'eau. — Baies, poudre, 3℔ à 3j. — Infus. 3ij à 3℔ par ℔ij d'eau. — Eau distil. 3ij à 3iv. — Huile essent. gtte x à xx. — Teinture, 3℔ à 3j. — Extrait, ℥j à 3j. — *A l'extér.* fumigation, vapeur, bain, cataplasme.

P. Tonique, vermifuge, diurétique, désinfectant.

GENTIANE, *Gentiana lutea*, Pentand. digyn. Gentian. Franc. (Racine).

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Décoct. 3ij à 3℔ par ℔ij d'eau. — Vin, 3ij à 3iv. — Teinture, 3℔ à 3ij. — Extrait, ℥j à 3℔. — Suc, 3ij à 3iv.

P. Tonique , fébrifuge , vermifuge.

Obs. Très-usitée.

GÉOFFROYE , *Geoffroya inermis* , Diadelph. décand. Légumin. Amér. (Ecorce).

F. D. Décoct. ℥ j par ℔ ij d'eau réduites ℔ jss (℥ j toutes les heures jusqu'à effet purgatif).

P. Purgative , vermifuge.

— DE SURINAM , *Geoffroya Surinamensis*. (Ecorce).

F. D. Décoct. ℥ iij par ℔ j d'eau , pour les adultes.

P. Vermifuge très-vanté.

GERMANDRÉE , *Teucrium Chamædrys* Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Sommités).

F. D. Poudre, ℥ss à ℥j. — Infusion. pinc. à ij par ℔ ij d'eau. — Eau distil. ℥ ij à ℥ iv. — Extrait, ℥ j à ℥ j. — Suc , ℥ ij à ℥ iv.

P. Tonique , stomachique , emménagogue.

GERMANDRÉE AQUATIQUE , *Teucrium Scordium*. Fr. (Herbe).

F. D. Poudre, ℥j à ℥ij. — Infusion, manip. par ℥ij d'eau. — Eau distil. ℥j à ℥iij. — Teinture, 3℔ à 3j dans une potion. — Sirop, 3℔ à 3j. — Suc, 3ij à 3ij. — Extrait, 3℔ à 3j. — *A l'extér.* en cataplasme.

P. Tonique, diaphorétique, résolutive.
GÉROFLE (CLOUS DE), *Caryophyllus aromaticus*, Polyand. monogyn. Caryoph. Inde orient. (Calice de la fleur non ouverte).

F. D. Poudre, gr. vj à 3j. — Teinture, 3℔ à 3j. — Eau distil. 3ij à 3iv. — Alcool, 3℔ à 3j. — Huile essent. g^{tte} ij à x. — Extrait, gr. xij à 3℔.

P. Tonique, stomachique, emménagogue, sialagogue.

GINGEMBRE, *Amomum Zinziber*, Moind. monogyn. Drymyrrh. Inde. (Racine).

F. D. Poudre, gr. ij à x. — Décoct. 3℔ à 3j.

par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒ ss à ʒ iij. — Eau distillée ʒ ij à ʒ iv. — Teinture, ʒ ss à ʒ j. — Extrait gr. x à ʒ j.

P. Stimulant, carminatif, stomachique.

GINSENG, *Panax quinquefolium*, Pco lygam. dioéc. Umbell. Indes. (Racine)..

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ j. — Décoct. ʒ ij à ʒ j par ℥ij d'eau. — Teinture, ʒ ss à ʒ ij. — Extrait ʒ ss à ʒ j.

P. Stimulant, tonique, aphrodisiaque.

Obs. Très-rare; confondu souvent avec le Ninzen (*Sium Ninsi*), qui a les mêmes propriétés.

GLAND, *Voy.* CHÊNE.

GOMME ADRAGANT, suc de l'*Astragalus Tragacantha*, Diadelph. décand. Légumine Europ.

F. D. Infus. ʒ j à ʒ ij par ℥ij d'eau. — Gr. iv à xx dans une potion. — Mucilage, ʒ ss à ʒ j. — *A l'extér.* lavement, collyre.

P. Adoucissante, pectorale.

Obs. Elle entre dans la confection des loock, des pastilles, etc.

GOMME AMMONIAC, gomme-résine d'une plante inconnue qui appartient, dit-on, à la famille des ombellifères. Afriq.

F. D. Teinture, g^{tte} x à ʒj. — Extrait, gr iv à xij et même ʒß en pilules ou dans une potion, dissous avec le jaune d'œuf. — *A l'extér.* laement, emplâtre.

P. Stimulante, emménagogue, maturative.

Obs. Elle entre dans beaucoup de composés officinaux.

— ARABIQUE, suc du *Mimosa Nilotica* et du *M. Senegal*, Polygam. monoéc. Légumip. Asie, Afriq.

F. D. Dissolution à froid, ʒij à ʒj par ℥ij d'eau. — ʒß à ʒj dans une potion. — Sirop, j à ʒ iij.

P. Adoucissante, pectorale.

Obs. Elle peut être remplacée souvent par la gomme d'abricotier ou de cerisier.

GOMME GUTTE, suc du *Gambogia Guttu*.
Polyand. monogyn. Guttif. Indes.

F. D. Gr. vj à xij et même ℥j en pilules
poudre, potion.

P. Drastique, quelquefois émétique.

Cas part. Hydropisie passive, ictère
chronique, tænia.

— KINO, *Voy.* KINO.

GOUDRON, poix-résine retirée des diffé-
rentes espèces de pins, *Pinus sylvestris*.
Monoéc. monadelph. Conif. Europ.

F. D. ℥ss à ℥j par ℥ij d'eau; on agite le
mélange, on le laisse reposer, puis on le décante
(℥v à ℥xij par jour). — *A l'extér.* emplâtre,
onguent.

P. Tonique, antipsorique, maturatif.

GRAMEN, *Voy.* CHIENDENT.

GRATIOLE, *Gratiola officinalis*, Diand.
monogyn. Person. Franc. (Plante entière
particulièrement la racine).

F. D. Poudre, ℥j à ℥ss. — Décoct. ℥ss par
℥ij d'eau, (par verres jusqu'à effet purgatif). —
Extrait, gr. xij à ℥j.

P. Purgative, vermifuge.

Cas part. Hydropisies passives.

Obs. Peu usitée; elle fait la base des bouteilles hydragogues de quelques charlatans. ʒj à ʒij de la racine pulvérisée, emplace, dit-on, l'ipécacuanha.

GRENADIER, *Punica Granatum*, Icosand. Monogyn. Mirt. Franc. méridion. (Fleur, fruit).

F. D. Fleurs du grenadier double (balaustes), Infus. ʒss à ʒij par ℥ij d'eau. — *Ecorce du fruit*, poudre, ʒss à ʒj. — Infus. ʒij à ʒjss par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒij. — *Pulpe du fruit.* Q. V.

P. Astringent; pulpe, rafraîchissante.

GRENOUILLE, cuisses et frai du *Rana sculenta*.

F. D. Cuisses, décoct. n° xx à xxiv par ℥ij d'eau. — *Frai*, à l'extér. en cataplasme.

P. Chair, adoucissante; frai, rafraîchissant, répercussif.

GROSEILLIER, *Ribes rubrum*, Pentand. Monogyn. Saxifr. Franc. (Fruit.)

F. D. Suc, ℥ ij à ℥ iij par ℔ ij d'eau. — Sirop ℥ j à ℥ iij . — Gelée, Q. V.

P. Délayant , rafraîchissant , diurétique.

GRUAU, *Voy.* AVOINE.

GUIMAUVE , *Althæa officinalis* , Monadelph. polyand. Malv. Franc. (Plante entière.)

F. D. Racine , décoct. ℥ j par ℔ ij d'eau. — Fleurs , infusion, manip. j par ℔ ij d'eau. — Sirop, ℥ j à ℥ iij . — *A l'extér.* les feuilles cataplasme, fomentation, lotion, lavement bain.

P. Adoucissante, pectorale, émolliente.
GUTTE, *Voy.* GOMME-GUTTE.

H.

HELLÉBORE, *Voy.* ELLÉBORE.

HELMINTHOCORTON, *Voy.* MOUSSE DE CORSE.

HERBE A ÉTERNUER, *Voy.* PTARMIQUE.

HERBE AUX PUCES, *Plantago Psyllium*
Tétrand. monogyn. Plantag. Fr. (Graine

F. D. Décoct. ʒij à ʒß par ℥ij d'eau. —
A l'extér. collyre, lotion, fomentation.

P. Adoucissante, émolliente.

HERMODATES, *Voy.* IRIS TUBÉREUSE.

HIÈBLE, *Sambucus Ebulus*, Pentand.
 trygyn. Caprifol. Franc. (Plante entière.)

F. D. Racine et seconde écorce de la tige,
 décoct. ʒiij à ʒj par ℥j d'eau. — Suc, ʒß à
 ʒjß . — Fleur, infus. théiforme. — Baies, rob,
 ʒj à ʒij . — Semences, infus. ʒj à ʒß par ℥j
 de vin. — Feuilles, cataplasme, fomentation,
 lotion.

P. Fleur, diaphorétique, légèrement
 narcotique. — Feuille, résolutive. — Les
 autres parties, drastiques, émétiques,
 diurétiques.

Cas part. Hydropisies passives.

HOUBLON, *Humulus Lupulus*, Dioéc.
 pentand. Urti. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒß à ʒij — Décoct. ou infus.
 ʒß à ʒij par ℥ij d'eau. — Suc, ʒij à ʒiv . —
 Extrait, ʒß à ʒj . — *A l'extér.* en cataplasme

P. Tonique, diaphorétique, diurétique, résolutif.

Cas part. Scrophules, dartres, gale, vers.

HOUX COMMUN, *Ilex aquifolium*, Tétrand. tétragyn. Rhamnoïd. Franc. (Racine, écorce, feuilles).

F. D. Feuille. Poudre, ʒ ss à ʒ j. — Racine et écorce, décoct. ʒ ij à ʒ j par ℥ ij d'eau.

P. Diurétique; feuilles, fébrifuges.

Obs. Peu usité.

HOUX (PETIT), *Ruscus aculeatus*, Dioéc. syngén. Aspar. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ j. — Décoct. ʒ ss à ʒ i par ℥ ij d'eau. — Vin, ʒ ij à ʒ vj. — Extrait ʒ j à ʒ j.

P. Diurétique, emménagogue.

Obs. Une des 5 racines apéritives.

HUILE ANIMALE DE DIPPEL, *Voy.* HUILE PYRO-ZOONIQUE.

HUILES ESSENTIELLES, *Voy.* les substances qui les fournissent.

HUILE GRASSES, *Voy.* les substances qui les fournissent.

— PYRO - BITUMEUSE, *Voy.* PÉTROLE.

— PYRO-SUCCINIQUE, *V.* AMBRE JAUNE.

HUILE PYRO-ZOONIQUE RECTIFIÉE, (Huile animale de Dippel.)

F. D. Progressivement, g^{tte} x à xxx dans une émulsion ou sur du sucre. — *A l'extér.* en solution aqueuse ou incorporée dans l'axonge.

P. Stimulante.

Cas part. Paralysie, épilepsie, dartres, teigne.

Obs. Son emploi demande beaucoup de circonspection.

— DE VITRIOL, *Voy.* ACIDE SULFURIQUE.

HYDROGÈNE (GAZ), (Air inflammable.)

On a proposé de faire respirer ce gaz mêlé à une ou deux parties d'air atmosphérique, pour ralentir la respiration.

HYDROGÈNE SULFURÉ (GAZ), (Gaz hépatique, *Acide hydro-sulfurique.*)

Dissous dans l'eau , ce gaz forme la base des eaux minérales sulfureuses.

P. Stimulant du système cutané.

HYSOPE , *Hyssopus officinalis*, Didynam. gymnosper. Labi. Franc. (Soumis-tés.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ ij d'eau. — Eau distil. ʒ ij à ʒ iij. — Sirop , ʒ β à ʒ ij.

P. Tonique , expectorant , diaphorétique.

I.

ICTHYOCOLLE (colle de poisson).

Elle sert à clarifier quelques préparations officinales, et entre dans la confection de quelques gelées et pastilles.

IMPÉRATOIRE , *Imperatoria Ostruthium*, Pentand. digyn. Umbell. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre , ʒ j à ʒ j. — Infus. ʒ ij à ʒ β par ℥ ij d'eau ou de vin. — *A l'extér.* gargarisme.

P. Tonique , carminative , sialagogue.

Obs. Souvent remplacée par l'*Angélique*.

IPÉCACUANHA, *Psychotria emetica*, *Callicoca Ipécacuanha*, Pentand. monogyn. Rubiac. Amériq. (Racine.)

F. D. Poudre, comme émétique, gr. xij à xxx dans ℥ iij ou ℥ iv d'eau, en deux prises ; comme altérant, gr. j à iij en plusieurs prises. — Vin, ℥ ss à ℥ j. — Teinture, ℥ ss à ℥ j. — Sirop, ℥ ss à ℥ ij. — Les pastilles doivent contenir un demi-grain de cette racine.

P. Emétique, purgatif, tonique, diaphorétique.

Cas part. Péritonite puerpérale, dysenterie.

IRIS COMMUNE, *Iris Germanica*, Triand. monogyn. Irid. Franc. (Racine).

— DE FLORENCE, *Iris Florentina*.

Obs. Elle entre dans quelques composés officinaux.

— DES MARAIS, *Iris Pseudo Acorus*.

F. D. Des 3 espèces ci-dessus. Poudre, gr. xij à ℥ j. — Suc, ℥ j à ℥ iij.

P. Purgatives.

IRIS GIGOT, *Iris fœtidissima*.

F. D. Poudre, gr. xij à 3 ℥. — Suc, 3 ℥ à 3 j.

— TUBÉREUSE (Hermodates), *Iris Tuberosa*.

F. D. Poudre, 3 ℥ à 3 j. — Infus. 3 j à 3 ij par 3 iv de vin.

P. Purgative, expectorante, comme les autres espèces.

Obs. Ces substances perdent de leur vertu purgative en se desséchant.

IVETTE, *Teucrium Chamæpitys*, Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Herbe.)

F. D. Poudre, 3 j à 3 j. — Infus. 3 j à 3 iij par 3 ij d'eau. — Eau distil. 3 ij à 3 iv. — Extrait, gr. xvij à 3 ℥. — Suc, 3 ij à 3 iij.

P. Tonique, stomachique, diaphorétique.

J.

JALAP, *Convolvulus Jalapa*, Pentand. monogyn. Convolvulac. Asie, Amériq. (Racine.)

F. D. Poudre, gr. xij à 3℥.—Vin, 3j℥ à 3iv.
 —Teinture, 3j à 3℥ dans une potion.—Résine,
 gr. vj à xij triturés avec du sucre et dans une
 émulsion. — Décoct. 3j pour un lavement.

P. Purgatif.

JAUNE D'OEUF, *Voy.* OEUF.

JOUBARBE (PETITE), *Sedum acre*, Dé-
 cand. pentagyn. Succulent. Fr. (Herbe
 fraîche.)

F. D. Poudre, comme altérant, gr. ij à iv,
 progressivement, 3j. — Décoct. 3j dans 3xij
 de bière, dose de cette boisson 3ij. — Suc, 6j
 à 3℥. — *A l'extér.* broyée avec de l'huile d'o-
 lives, en cataplasme.

P. Purgative, émétique, altérante.

Obs. Dangereuse à l'intérieur, quoi-
 qu'on l'ait encore employée dernièrement
 dans le traitement de l'épilepsie. — *A*
l'extér. Sur les cors aux pieds. Quelques
 praticiens assurent avoir obtenu de bons
 effets de son application sur les ulcères
 carcinomateux.

JUJUBES, *Rhamnus Zizyphus*, Pentand. monogyn. Rhamnoïd. Fr. cult. (Fruit.)

F. D. Décoction, ℥j à ℥ij par ℔ij d'eau. — Sirop, ℥j à ℥iij. — Pâte, ℥℔ à ℥j.

P. Adoucissantes, pectorales.

JUSQUIAME, *Hyoscyamus niger*, Pentand. monogyn. Solan. Franc. (Plant. entière.)

F. D. Feuilles, poudre, gr. j à ij. — Extraire gr. ℔ à ij, progressivement ℥j. — *A l'extér.* cataplasme, lotion, fomentation, bain. — Huile de la graine, en liniment sur une surface peu étendue.

P. Narcotique, antispasmodique, résolutive.

Cas part. Convulsions, épilepsie, cancer.

Obs. Son emploi demande beaucoup de prudence.

K.

KARABÉ, *Voy.* AMBRE JAUNE.

KERMÈS ANIMAL, insecte qui se trouve

ur les feuilles de l'*Ilex quercus cocci-*
fera.

F. D. Poudre, gr. vj à ʒj. — Infus. ʒ ʒ à ʒj
par ℥ij de vin. — Sirop, ʒj à ʒij.

P. Tonique, diurétique.

Obs. Abandonné; il entre dans la con-
fection *Alkermès*.

KERMÈS MINÉRAL, *Voy.* ANTIMOINE.

KINO, gomme d'un arbre inconnu.
Afriq.

F. D. Poudre, gr. xvij à ʒ ʒ. — Décoct. ʒj
à ʒij par ℥ij d'eau. — Teinture, ʒ ʒ à ʒj dans
une potion.

P. Tonique, fébrifuge, astringent.

KYNORRHODON, *V.* ROSIER SAUVAGE.

L.

LAIT D'ANESSE; il passe pour le plus
adoucissant de tous.

— DE CHÈVRE; tonique.

— DE FEMME, pris au sein même; adou-
cissant, analeptique.

LAIT DE BREBIS, DE JUMENT, DE VACHE.

Plus riches en principes que les précédens et de plus difficile digestion.

D. Une tasse le matin et une tasse le soir.

P. Adoucissans, nutritifs.

Cas part. Epuisement, phthisie commençante, dartres, etc.

— (PETIT), *Serum lactis*.

D. ℥j à ℥iij dans les 24 heures.

P. Adoucissant, relâchant.

Obs. Il sert de véhicule à beaucoup de médicamens.

— DE BEURRE.

D. ℥j à ℥ij.

P. Laxatif.

— DE POULE, *Voy.* OEUUF.

LAITUE, *Lactuca sativa*, Syngén. polygam. eg. Chicor. France. (Feuille graine.)

F. D. Feuille, infus. décoction, manip. j pœ ℥ij d'eau. — Eau distil. ℥j à ℥iv. — Suc,

℥ iij. — *A l'extér.* cataplasme, lotion, fomentation.

P. Adoucissante, antispasmodique.

Obs. La graine fait partie des quatre semences froides mineures.

LAITUE VIREUSE, *Lactuca virosa*.

F. D. Extrait, gr. j à ij, progressivement ℥ j et même ℥ iij.

P. Antispasmodique, narcotique.

Obs. Peu usitée, quoique possédant beaucoup de vertus, selon les anciens.

LAURÉOLE, *Voy.* GAROU.

LAURIER-CERISE, *Prunus Laurocerasus*, Cosand. monogyn. Rosac. Franc. cultiv. (Feuille.)

F. D. Poudre, gr. j à iv. — Eau distil. gtte iv à vj dans une potion.

P. Diurétique, narcotique.

Obs. Peu usité, dangereux; quelques praticiens ont donné l'eau distillée à la dose de gtte xxx à lx, plusieurs fois le jour.

LAVANDE, *Lavandula spica*, Didynna gymnosperm. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infus. ʒj à ʒiv. par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒiv. — cool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gttē ij à viij. Teinture, ʒss à ʒj. — Vinaigre, ʒij à ʒj. — *l'extér.* lotion, fomentation, vapeur, bain.

P. Stimulante, stomachique.

LICHEN D'ISLANDE, *Lichen Islandicus*. Cryptogam. Alg.

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Décoct. ʒss à ʒiv. par ℥ij d'eau réduite à ℥ij. — Gelée, coctē ij à iv.

P. Adoucissant, pectoral.

Cas part. Toux, hémoptysie, catarrh pulmonaire chronique, phthisie.

Obs. Très-usité.

— PULMONAIRE, *Lichen pulmonarius*.

F. D. P. Comme le précédent, mais moins actif.

LIERRE COMMUN, *Hedera Helix*, Pentand. monogyn. Caprif. Franc. (Feuille.

Obs. Usité pour le pansement des cautères. — La gomme résine entre dans quelques préparations officinales. On la dit vulnéraire.

LIERRE TERRESTRE, *Glecoma Hederacea*,
Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Feuille.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ ij d'eau. — Eau distil. ℥ j à ℥ iv. — Sirop, ℥ ij à ℥ iij. — Suc, ℥ j à ℥ iij. — Conserve, ℥ j à ℥ j.

P. Tonique, expectorant.

LIMAÇONS pilés et lavés.

F. D. Décoct. n° x à xx par ℥ ij d'eau. — Sirop, ℥ ij à ℥ iij.

P. Adoucissans, pectoraux.

LIMAILLE D'ÉTAİN, *Voy.* ÉTAİN.

— DE FER, *Voy.* FER.

LIN COMMUN, *Linum usitatissimum*,
Pentand. pentagyn. Caryoph. France.
(Graine.)

V. D. Infus. prolongée, pinc. j à ij par ℥ ij d'eau. — Huile récente, ℥ ij à ℥ iij. — *A l'extér.* lavement, lotion, fomentation, bain. — *Farine*, en cataplasme.

P. Adoucissant, laxatif, émollient.

LIN CATHARTIQUE, *Linum catharticum*
(Herbe.)

F. D. Poudre, 3j à 3ij. — Infus. 3ij à 3ss par ℥ij d'eau.

P. Purgatif, diurétique.

Obs. Peu usité.

LITHARGE, *Voy.* PLOMB.

LIVÊCHE, *Ligusticum Levisticum*, Penn.
and. digyn. Umbell. Franc. (Racine
graine.)

F. D. Racine, poudre, 3ss à 3j. — Décoc.
3j à 3ij par ℥ij d'eau. — Graine, poudre, 3j
à 3ss. — Infus. 3ij à 3ss par ℥ij d'eau.

P. Carminative, diurétique, emménagogue.

Obs. Peu usitée.

LOBÉLIE, *Lobelia syphilitica*, Syngén.
monogam. Campan. Amériq. (Racine.)

F. D. Décoct. 3ij à 3ss par ℥j d'eau réduite à ℥ss (par cochl. dans les 24 heures)
— Extrait, gr. iv à xvj en plusieurs prises.

P. Sudorifique, antisypilitique, purgative, et même émétique.

Obs. Peu usitée en France ; son emploi demande de la prudence.

LYS BLANC, *Lilium candidum*, Hexand. monogyn. Liliac. Asie, Franc. cult. (Pétale, Bulbe.)

F. D. *Pétale*, infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ℥ij à ℥iv. — Huile par macération, à l'extérieur, en liniment. — Pulpe du *bulbe*, en cataplasme.

P. Délayant, émollient, maturatif.

Obs. Peu usité.

M.

MACIS, *Voy.* MUSCADE.

MAGNÉSIE, (Carbonate de magnésie, Proto-carbonate de magnésium.)

F. D. Gr. vj à xij pour les enfans. — ʒß à ʒj et même ʒß pour les adultes ; rarement en poudre ; préférablement dans une potion.

P. Absorbante, purgative, neutralisante.

Cas part. Eructations acides, coliques des enfans, empoisonnement par les acides minéraux.

MAGNÉSIE CALCINÉE, (*Protoxide de magnésium*).

F. D. Gr. xij à ʒj, en 2 ou 3 prises.

Cas part. Aphthes confluens.

MANGANÈSE. Il n'est point usité à l'état métallique.

Oxide noir de manganèse, (*Deutoxide de manganèse*).

F. D. A l'extér. poudre, ʒj à ʒij par ʒj d'axonge, en friction. — En fumigation.

P. Excitant léger ; désinfectant.

Cas part. Teigne, gale, dartres ulcérées.

MANIGUETTE, *Amomum Granum Paradisi*, Monand. monogyn. Drymyrh. Indes orient. (Graine.)

F. D. Poudre, gr. xij à ʒj.

P. Excitante, emménagogue, antispasmodique.

Obs. Peu usitée; elle entre dans des composés officinaux; elle est aussi connue sous le nom de *grand cardamome*.

MANNE, suc épais du *Fraxinus Ornus*, Polygam. dioéc. Lilac. Europe.

F. D. ℥℥, ℥ij à ℥iij dans Q. S. d'eau ou de lait.

P. Purgative, minorative.

Obs. Il existe trois espèces de manne: 1^o, la manne canellée ou en larmes; 2^o, la manne en sorte; 3^o, la manne grasse; il ne faut employer que la première, les deux autres étant souvent sophistiquées.

MANDRAGORE, *Atropa Mandragora*, Pentand. monogyn. Solan. Europ. (Racine, feuille.)

F. A l'extér. en vapeur, bain, fomentation, et lotion. — Les feuilles en cataplasme.

P. Narcotique, antispasmodique.

Obs. On a prescrit la poudre de la racine à la dose de gr. ʒ à gr. iv à l'intérieur contre l'*hystérie* et l'*épilepsie*; mais il est bon de s'en abstenir.

MARJOLAINE , *Origanum Majorana* ,
Didynam, gymnosperm. Lab. Franc. cult..
(Sommités.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infus. ʒj à ʒijj
par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Al-
cool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gttē ij à vj. —
A l'extér. lavement, vapeur, lotion, fomen-
tation, bain.

P. Stimulante, carminative, stomachi-
que.

MARRONIER D'INDE, *Æsculus Hippocas-
tanum*, Heptand. monogyn. Malpigh. Asie,
Europ. (Ecorce.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Décoct. ʒj à ʒijj
par ℥ij d'eau. — Vin, ʒj à ʒijj. — Extrait,
ʒj à ʒj dans ʒj à ʒij d'eau aromatique.

P. Tonique, fébrifuge, quelquefois pur-
gatif.

MARRUBE, *Marrubium vulgare*, Didy-
nam. gymnosperm. Lab. Franc. (Herbe.)

F. D. Infusion, pinc. j à ij par ℥ij d'eau.
— Vin, ʒj à ʒijj. — Sirop, ʒss à ʒij. — Suc,
ʒj à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒj.

P. Emménagogue, apéritif, béchique.

MATRICAIRE, *Matricaria Parthenium*,
Syngén. polygam. superfl. Corymb. Franc.
(Sommités.)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infus. 3j à 3ij
par ℥ij d'eau. — Eau distil. 3j à 3iij. — Suc,
3j à 3ij. — *A l'extér.* lavement, lotion, fo-
mentation. — *Feuilles*, cataplasme.

P. Emménagogue, tonique.

MAUVE, *Malva rotundifolia*, Mon-
adelph. polyand. Malvac. Franc. (Herbe,
fleur.)

F. D. Fleur, infusion, manip. j par ℥ij
d'eau. — *Herbe*, lotion, fomentation, bain, la-
vement, cataplasme.

P. Adoucissante, pectorale, émolliente.

MÉCHOACAN, *Convolvulus Mechoacanna*,
Pentand. monogyn. Convolv. Amérique
mérid. (Racine.)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infus. 3j à 3ij
dans un verre de vin blanc.

P. Purgatif, tonique.

Obs. Peu usité.

MÉLILOT, *Trifolium Melilotus*, Diadelph. décand. Légumin. Franc. (Herbe, fleur.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒss. — Infusion, pinc. j à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — *A l'extér.* collyre, lotion, fomentation, bain.

P. Légèrement tonique, résolutif.

MÉLISSE, *Melissa officinalis*, Didynam. gymnosp. Lab. Franc. (Feuille.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒss. — Infusion, pinc. j à ij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒiv. — Alcool, ʒss à ʒij. — Huile essent. gtte ij à viij. — Sirop, ʒss à ʒij. — *A l'extér.* lotion, fomentation, etc.

P. Stimulante, antispasmodique, emménagogue.

MELON, *Cucumis Melo*, Monoéc. syn-gén. Cucurbit. Franc. cult. (Semences.)

F. D. ʒij à ʒiv en émulsion.

P. Tempérant, rafraîchissant.

Obs. Une des 4 semences froides majeures.

MENTHE AQUATIQUE, *Voyez* MENTHE
POUILLOT.

— CRÊPUE, *Mentha crispa*, Didynam.
gymnosp. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infusion, pinc.
j à ij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒiv.
— Alcool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gtte ij à viij.
— Sirop, ʒss à ʒij. — *A l'extér.* comme les
autres labiées.

P. Carminative, stomachique, anti-
spasmodique, emménagogue.

— POIVRÉE, *Mentha piperata*. (Som-
mités.)

F. D. P. Comme la précédente.

— POUILLOT, *Mentha Pulegium*. (Som-
mités.)

F. D. P. Comme la précédente.

MÉNYANTHE, *Voy.* TRÈFLE D'EAU.

MERCURE, (vif-argent.)

F. D. Décoction pendant une heure, ℥j
par ℥ij d'eau (2 à 3 tasses).

Obs. L'eau qui a bouilli sur le mer-

cure , l'antimoine , le bismuth , l'étain , le fer, etc. est vermifuge. On a proposé, dans le *convolvulus* , de faire avaler plusieurs onces de mercure , mais cette pratique avait de grands inconvéniens.

Oxide gris-noirâtre de mercure, (Ethiops *per se* , *Protoxide de mercure.*)

F. D. En pilules , progressivement gr. ss à gr. v , par jour. — Mêlé à 20 parties de gomme arabique et dissous dans cochl. ij à iij d'eau distillée (mercure soluble). — *A l'extér.* incorporé dans l'axonge (onguent mercuriel).

P. Antisymphilitique, vermifuge, excitant.

Obs. Il entre dans beaucoup de composés officinaux.

Oxide rouge , (Précipité rouge , *Deutoxide de mercure.*)

F. D. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ grain par jour , étendu dans une poudre. — *A l'extér.* incorporé dans le cérat ou autre onguent.

P. Excitant , escarrotique.

Obs. Dangereux à l'intérieur et quelquefois même à l'extérieur.

MERCURIALE, *Mercurialis annua*, Dioéc.
dodécand. Tithymal. Franc. (Herbe.)

F. D. Décoction, manip. j par ℥j d'eau. —
Sirop, ℥ij à ℥j. — Suc, ℥ij à ℥iv. — Miel,
℥j à ℥iij en lavement. — *A l'extér.* cataplasme,
fomentation, bain.

P. Purgative, émolliente.

Obs. Elle n'est guère employée qu'en
lavement et à l'extérieur.

MIEL.

F. D. Décoct. ℥j à ℥iij par ℥ij d'eau (hy-
dromel). — Sirop, ℥j à ℥ij.

P. Adoucissant, laxatif.

Obs. Il sert d'excipient à beaucoup de
médicamens. On l'emploie pour édulcorer
les boissons.

MILLE-FEUILLE, *Achillea Millefolium*,
Syngén. polygam. frustr. Corymbif. Franc.
(Feuille, fleur.)

F. D. Fleur, Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij
d'eau. — Eau distil. ℥ij à ℥iv. — Huile essent.
g℥te xv à 3 ℥ dans une potion. — Sirop, ℥ss à ℥ij.
— Feuille, infusion, pinc. j à ij par ℥ij d'eau.

— Extrait, ℥j à 3j. — *A l'extér.* lavement, lotion, bain.

P. Antispasmodique, astringente, styptique.

MILLE-PERTUIS, *Hypericum perforatum*, Polyadelph. polyand. Hypéricoïd. (Sommités.)

F. D. Infusion, pinc. j à ij par ℥ij. d'eau. — Teinture, ℥j à 3℥. — *A l'extér.* vapeur, lotion, fomentation.

P. Diurétique, résolutif.

Obs. Inusité; il entre dans quelques composés officinaux. L'huile d'*hypericum* n'est employée qu'à l'extérieur.

MINIUM, *Voy.* PLOMB.

MOLÈNE, *Voy.* BOUILLON-BLANC.

MORELLE, *Solanum nigrum*, Pentand. monogyn. Solan. Franc. (Feuille.)

F. D. Poudre, gr. j à iv. — Infus. x à xij feuilles, par ℥ij d'eau. — Eau distil. 3j à 3iij. — Extrait, gr. j à iv. — *A l'extér.* cataplasme, lotion, fomentation, bain.

P. Narcotique, résolutive.

Obs. Presque inusitée seule à l'intérieur ; elle entre dans beaucoup de préparations officinales.

MOUSSE DE CORSE, mélange d'un grand nombre de plantes marines , formé principalement du *Fucus Helminthocorton*, Cryptogam. Alg.

F. D. Poudre, ℥j à 3j dans de l'eau sucrée, du lait ou du miel. — Décoct. 3ij à 3j, dans 2 ou 3 tasses d'eau. — Sirop, 3ij à 3iv.

P. Anthelmintique.

Obs. Pour les enfans, poudre , gr. xij à xxx.

MOUTARDE, *Voy.* SENEVÉ.

MUGUET, *Convallaria majalis*, Hexand. monogyn. Asper. Franc. (Fleur.)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Extrait , comme purgatif, ℥j à 3℥. — *A l'extér.* la poudre, comme stérutatoire, pinc. j.

P. Antispasmodique , purgatif.

MURIATE D'AMMONIAQUE , (Sel ammoniac, *Hydro-chlorate d'ammoniaque.*)

F. D. Gr. vj à ʒβ uni à une poudre aromatique. — ʒβ à ʒij en solution par ℥ij d'eau ou dans une potion. — *A l'extér.* en vapeur ; — Bain général , ʒ viij. — Lotion, fomentation , ʒij à ʒvj par ℥ij d'eau.

P. Diaphorétique , diurétique , fébrifuge , excitant , tonique.

Obs. Il entre dans quelques composés officinaux.

MURIATE D'AMMONIAQUE ET DE FER ,
(Fleurs de sel ammoniacal martiales, *Deutohydro-chlorate de fer et d'ammoniaque.*)

F. D. Gr. ij à xij en pilules ou dans une potion stimulante.

P. Excitant , peu usité.

— D'ANTIMOINE , (Beurre d'antim. *Chlorure d'antimoine.*)

Obs. Usité à l'extérieur comme caustique.

— DE BARYTE , (Terre pesante salée ,
Proto-hydro-chlorate de Baryte.)

F. D. $\frac{I}{4}$ à $\frac{I}{3}$ de grain dans une potion mucilagineuse.

P. Excitant du système lymphatique.

Cas part. Scrophules.

Obs. Dangereux.

MURIATE DE CHAUX, (Sel marin calcaire,
Proto-hydro-chlorate de calcium.)

F. D. Gr. v à xx et même 3 iij.

P. Stimulant du système lymphatique,
purgatif à haute dose.

Obs. Peu usité ; préconisé dans les scrophules.

— D'ÉTAIN, (*Proto et deuto - hydro-chlorate d'étain.*)

F. D. Gr. ij à iv, dans un lavement.

P. Vermifuge, purgatif.

Obs. Peu usité ; il faut attendre de nouvelles expériences.

— DE MERCURE SUR OXIDÉ, (Sublimé corrosif, *Per-chlorure de mercure.*)

F. D. En pilules ou mêlé à une poudre, $\frac{1}{4}$ de grain pendant plusieurs jours, ensuite $\frac{1}{2}$ grain. — En solution, gr. xij à xvij par ℥ ij d'eau distil. (Liqueur de Wan-Swieten), cochl. j pendant plusieurs jours, ensuite cochl. j

matin et soir, dans une tasse de lait ou de tisane mucilagineuse. Dose totale pour un traitement, gr. xvij à 3 ℥. — *A l'extér.* ℥j à 3 ℥ par ℥j d'eau de chaux (Eau phagédénique), pour lotion, injection.

P. Antisymphilitique ; *à l'extér.* antipsorique.

Obs. Très-usité. Son emploi demande de la prudence. On l'a proposé en lavement, gr. ℥ ; en bain général, gr. ℥ par chaque ℥ij d'eau.

MURIATE DE MERCURE DOUX, (Calomelas, *Sous-chlorure de mercure.*)

F. D. Comme altérant, gr. j à iv ; comme purgatif, gr. vj à xij et même gr. xx, en pilules ou mêlé à une poudre. — *A l'extér.* en poudre uni à 4 ou 5 parties de gomme arabique, dissous dans la salive ou incorporé dans un onguent, sur les chancres atoniques.

P. Vermifuge, antisymphilitique.

Cas part. Gale, dartres, engorgemens de l'abdomen.

Obs. Peu employé à l'intérieur comme antisypilitique.

MURIATE D'OR, (*Proto-hydro-chlorate d'or.*)

F. D. Gr. j mêlé à gr. ij de réglisse ou d'iris en poudre, pour 15 frictions faites chaque jour sur les gencives ou sur la langue. — En pilules, $\frac{x}{120}$ à $\frac{x}{60}$ de grain mêlé à gr. j d'extrait de garou. (D'abord une pilule chaque jour; on augmente tous les 8 jours d'une pilule.)

P. Fondant, antisypilitique.

Cas part. Syphilis, squirrhe de l'utérus.

— DE POTASSE, (Sel fébrifuge de Sylvius, *Deuto-hydro-chlorate de potassium.*)

F. D. Comme altérant, gr. x à 3ß. Comme purgatif, 3ß à 3jß.

P. Tonique, fébrifuge, purgatif.

— DE POTASSE OXIGÈNÉ, (*Deuto-chlorate de potassium.*)

F. D. Gr. ij à xviii dans 3ij à 3iij d'eau.

P. Antisypilitique.

Obs. Peu usité; très-dangereux sous

forme sèche, la moindre pression le faisant détonner.

MURIATE DE SOUDE, (Sel marin, *Deutch hydro-chlorate de sodium.*)

F. D. 3ij à 3j dissous dans l'eau. — 3j à 3iij dans un lavement, en lotion, fomentation, pétilu diluve.

P. Diurétique, purgatif, résolutif.

Obs. Il n'est guère usité qu'à l'extérieur et en lavement.

MURIER NOIR, *Morus nigra*, Monoéc. tétrand. Urtic. Franc. (Ecorce de la racine, fruit.)

F. D. Fruit, suc, dans l'eau jusqu'à acidité agréable. — Sirop, 3j à 3iv. — *A l'extér.* dans les gargarismes. — *Racine*, poudre, 3ß à 3iij. — Décoct. 3ij à 3iv par ℥vj d'eau réduite à ℥ij (une à trois tasses par jour). Cette boisson est très-amère.

P. Fruit. Adoucissant, légèrement astringent. *Racine.* Vermifuge, légèrement purgative.

Obs. On emploie de préférence comme

vermifuge, l'écorce de la racine du *Morus alba*.

Musc, suc renfermé dans une poche située près du nombril du *moschus moschiferus*. Inde orient.

F. D. Gr. j à viij en pilules ou dans une potion.—Eau distil. ℥j à ℥iij . — Teinture, gttē xv à ℥β dans une potion. — Gr. x à xv, dans un lavement.

P. Sédatif, antispasmodique, sudorifique, aphrodisiaque.

Obs. Dans le traitement de quelques névroses comme la rage, le tétanos, on l'a donné par jour à la dose de ℥j , ℥β et même ℥j .

MUSCADE, *Myristica Moschata*, Dioéc. hexand. Laur. Indes orient. (Fruit.)

F. D. Poudre, gr. x à ℥β . — Huile, gr. v à xij dans une potion. — Teinture, ℥β à ℥j . — *A l'extér.* en friction.

Macis, 2^e enveloppe de la noix muscadée.

F. D. Poudre, gr. vj à xviii. — Eau distill. ʒj à ʒij. — Huile essent. gte ij à xij, dans une potion. — Teinture, ʒss à ʒj. — Extrait, ʒj à ʒss.

P. Tonique, stimulante, stomachique.

Obs. Ces deux substances entrent dans beaucoup de composés officinaux.

MYROBOLANS, *Phyllanthus Emblica*, Monoéc. tétrand. Tithymal. Inde. (Fruit.)

F. D. En substance, ʒss à ʒij. — Décoction ʒij à ʒss et même ʒj par ℥ij d'eau.

P. Astringens en substance; laxatifs en décoction.

Obs. Peu usités; il y en a de deux espèces dans le commerce qui ne paraissent pas fournis par le même arbre.

MYRRHE, gomme-résine d'un *Laurus*, suivant quelques-uns, d'un *Mimosa*, suivant quelques autres. Asie. Afriq.

F. D. Poudre, gr. vj à ʒss. — Teinture, ʒj à ʒj dans une potion. — Huile essent. gte v à xij. — *A l'extér.* liniment, onguent.

P. Tonique, vermifuge, emménagogue, excitante.

Obs. Peu usitée à l'intérieur ; elle entre dans des préparations officinales.

N.

NAVET, *Brassica Napus*, Tétradyn. siliq. Crucif. Franc. (Racine.)

F. D. Décoction, n^o x à xij par ℥ij d'eau. — Sirop, ℥j à ℥iij. — *Pulpe*, en cataplasme.

P. Adoucissant, pectoral, résolutif.

Obs. Peu usité.

NÉNUPHAR, *Nymphaea alba*, *N. lutea*, Polyand. monogyn. Hydroch. (Racine, fleur.)

F. D. Fleur récente, infus. ℥ij à ℥ss par ℥ij d'eau. — Eau distil. ℥ij à ℥iv. — Sirop, ℥ij à ℥ij. — *Racine*, décoct. ℥ss à ℥j par ℥ij d'eau. — *Suc*, ℥ij à ℥iv.

P. Narcotique léger, rafraîchissant.

NERPRUN, *Rhamnus Catharticus*, Pentand. monogyn. Rhamn. Franc. (Baies.)

F. D. En substance, n^o vj à xx. — Décoct. n^o xx à xxx par ℥ij d'eau. — Sirop, ℥ij à ℥ij. — Rob, ℥j à ℥jss. — *Suc*, ℥j à ℥ss.

P. Purgatif, vermifuge.

NICOTIANE, *Voy.* TABAC.

NITRATE D'ARGENT, (Cristaux de Lune
Deuto-nitrate d'argent.)

F. D. Gr. ij à vj en poudre ou en pilules.

P. Purgatif.

Obs. Peu usité.

— D'ARGENT FONDU, (Pierre infernale
Deuto-nitrate d'argent fondu.)

F. D. $\frac{1}{16}$ à $\frac{1}{10}$ de grain en pilules dans
ou 15 fois autant d'excipient (en deux prises
— *A l'extér.* comme cathérétique.

P. Antispasmodique, caustique.

Cas part. Chorée, épilepsie.

Obs. Dangereux à l'intérieur.

— DE BISMUTH avec excès d'oxide
(Magistère de bismuth, *Sous-deuto-nitrate*
de bismuth.)

F. D. Gr. j à vj en poudre, en pilules
en pastilles. On en a donné jusqu'à ℥j.

P. Antispasmodique.

NITRATE DE MERCURE, (Nitrate mercuriel,
Proto-nitrate de mercure.)

F. D. P. Comme antisyphilitique dans un sirop. (*Voy.* sirop de Bellet, 2^e section.) — *A l'extér.* dissous dans l'eau (eau mercurielle), comme escarrotique.

— DE POTASSE, (Sel de nitre, *Deuto-nitrate de potassium.*)

F. D. Gr. xij à ʒj par ℥ij de tisane diurétique ou de vin blanc. — Gr. xij à ʒj en poudre, en pilules ou dans une potion. — Comme purgatif, ʒss à ʒj.

P. Diurétique, rafraîchissant, laxatif.

Obs. Sous forme sèche, il perd de sa propriété diurétique; employé avec succès dans le traitement du rhumatisme à la dose de ʒss à ʒj en 24 heures dans ℥ij de tisane sudorifique.

— DE POTASSE FONDU, (Cristal minéral, *Deuto-nitrate de potassium fondu.*)

F. D. P. Comme le précédent.

NOIX DE GALLE, *Voy.* GALLES.

NOIX MUSCADE, *Voy.* MUSCADE.

—VOMIQUE, *Strycnos Nux vomica*.

Pentand. monogyn. Apocyn. Ind. (Fruit)

F. D. Poudre, gr. iv à xv. — Décoct. 3℥ à 4℥ par ℥ ij d'eau réduite à ℥ j (par cuillerées)

—Extrait alcoolique, progressivement, gr. ij à ʒj

—Extrait aqueux, progressivement, gr. ij à ʒj

P. Tonique, vermifuge, excitante de la moelle rachidienne.

Cas part. Paralysie.

Obs. Son emploi demande de la prudence. Gr. iv d'extrait alcoolique, en prises, à la distance de 3 heures, suffisent pour déterminer, pendant 2 ou 3 jours, la convulsion des muscles paralysés.

NOYER, *Juglans Regia*, Monoéc. polyand. Térébent. Franc. cult. (Feuille, écorce verte du fruit (*Brou*), amandes.)

F. D. *Brou*, infus. ʒj à 3ij par ℥ ij d'eau

— ʒj à 3iij dans un lavement. — ℥ j pour bain général. — *Feuille*, à l'extér. en lotion, fomentation, cataplasme.

P. Tonique, astringent.

Obs. On prépare , avec diverses parties du noyer , une eau recohobée , appelée *eau des trois noix* , qu'on prescrit comme stomachique et diurétique depuis ʒ ij jusqu'à ʒ iv . — L'huile de noix est peu usitée.

NYMPHÆA, *Voy.* NÉNUPHAR.

O.

OEILLET, *Dianthus Caryophyllus*, Décand. digyn. Caryoph. Franc. (Pétales.)

F. D. Infusion , ʒ ij à ʒ ss par lb ij d'eau. — Eau distil. ʒ ij à ʒ iv . — Sirop , ʒ ss à ʒ ij .

P. Adoucissant , pectoral , astringent léger.

OEUF DE POULE.

— BLANC, *voy.* ALBUMINE.

— JAUNE. En émulsion avec l'eau et le sucre (lait de poule). — Il sert à tenir en suspension dans l'eau, les huiles fixes, les résines , etc. — On en retire une huile douce employée à l'extérieur comme adoucissante dans l'érysipèle, les gerçures , les crevasses , etc.

OIGNON, bulbe de l'*Allium Cepa*.

F. D. P. Comme l'ail, *Voy.* AIL.

OLIBAN, résine du *Juniperus Lycia v. thurifera*, Dioéc. monadelph. Conif. Asie.

Il entre dans quelques composés officinaux. — *A l'extér.* comme odontalgique on en place un petit fragment sur la dent douloureuse. — Comme excitant, en fumigation, bain de vapeur, fumigatoire.

OLIVIER, *Olea Europæa*, Diand. monogyn. Lilac. Franc. (Fruit.)

F. D. Huile, $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{vj}$. — *A l'extér.* lavement, liniment, embrocation. — Marc, en bain.

P. Huile, purgative, émétique, adoucissante.

Obs. L'huile entre dans beaucoup de composés officinaux et dans presque tous les savons.

OPIUM, suc épais du *Papaver somniferum*, Polyand. monogyn. Papav. Asie, Europe.

F. D. En substance ou extrait, $\frac{\text{I}}{7}$ de grain par gr. ss à gr. j . — Sirop, $\text{℥} \text{j}$ à $\text{℥} \text{ss}$ dans une po

tion. — Opium de Rousseau, g^{tte} ij à iv à chaque prise; g^{tte} viij à xvij dans une potion; g^{tte} xij à ℥j dans un lavement. — Teinture, g^{tte} vj à xvij. — *A l'extér.* friction, lotion, fomentation.

P. Narcotique; sédatif du système nerveux, excitant du système sanguin.

Obs. On peut donner ce médicament à très-haute dose, en augmentant progressivement; il entre dans beaucoup de composés officinaux.

OPOPONAX, *Pastinaca Opoponax*, Pentand. digyn. Ombell. France méridionale. (Gomme-résine.)

F. D. Poudre, gr. x à ℥j en pilules ou dans une potion, dissoute avec le jaune d'œuf. — En lavement, ℥β à ℥j. — *A l'extér.* liniment, emplâtre, onguent.

P. Emménagogue, antispasmodique.

Obs. Très-peu usité; il entre dans des composés officinaux.

OR divisé par le mercure.

F. D. Gr. j incorporé dans la poudre d'iris

ou de réglisse, en friction sur les gencives ou la langue ; au bout de quelques jours on portera la dose à gr. jss.

Oxide d'or, (*Protoxide d'or.*)

F. D. Gr. ss, au bout de 8 jours, gr. j, et ensuite gr. ij, en friction, comme l'or divisé.

P. Stimulans de la circulation, antisypilitiques.

Cas part. Syphilis, squirrhe de l'utérus.

Obs. Plutôt employé à l'état de *muriate*.

La découverte de la propriété antisypilitique de l'or est due à M. Chrestien, qui l'a consignée dans sa *Méthode iatropathique*.

ORANGER, *Citrus Aurantium*, Polyadelph. polyand. Hespér. Franc. (Plante entière.)

F. D. Feuille, poudre, ℥j à 3j. — Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Extrait, gr. xvij à 3ss. — Fleur, infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. 3ij à 3iv. — Alcool, 3ss à 3j. — Huile essent. g^{tte} iv à viij. — Sirop,

3 ij à 3 iij. — *Ecorce du fruit*, poudre, ℥j à 3 ℥.
 — Infus. 3 ij à 3 iij par ℥ij d'eau. — Huile
 essent. g^{tte} ij à vj. — Sirop, 3 j à 3 iij. — *Pa-*
renchyme du fruit, suc, 3 iv à 3 viij par ℥ij
 d'eau sucrée (orangeade). — Les petites oran-
 ges et le bois servent à faire des pois à cautère.

P. Feuille et fleur, antispasmodiques ;
écorce du fruit, tonique, astringente ; *pa-*
renchyme du fruit, rafraîchissant.

ORGE, *Hordeum Distichum*, *H. vul-*
gare, Triand. digyn. Gramin. Franc. cult.
 (Graine.)

F. D. Décoction, 3 ℥ à 3 j par ℥ij d'eau.
 — *A l'extér.* lavement, collyre, lotion ; *farine*,
 en cataplasme.

P. Adoucissant, émollient.

Obs. Très-usité. Dépouillé de son écorce
 (*orge mondé*), arrondi (*orge perlé*), con-
 cassé par la meule (*gruau d'orge*). On se
 sert pour les tisanes, des deux premières
 préparations.

ORIGAN, *Origanum vulgare*, Didynam.
 gymnosperm. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. P. Comme la marjolaine, *Voy.* cette dernière.

ORME, *Ulmus campestris*, Pentandrigyn. Ament. Franc. (Ecorce moyenne)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Décoct. 3j à 3℔ par ℔ij d'eau réduite à ℔j, (3 viij matin et soir). — Teinture, g^{tte} xxx à xl. — Extraire gr. xvij à 3℔.

P. Altérant, astringent.

Obs. Il a été très-employé dans le traitement des exanthèmes chroniques; maintenant il est presque inusité.

ORONGE (FAUSSE), *Agaricus Muscarius*, Cryptogam. Champ. Franc.

F. D. Poudre, gr. xij à 3j dans de l'eau ou du vin, ou en pilules. — *A l'extér.* sur les ulcères atoniques.

P. Tonique, antispasmodique, excitant.

Cas part. Epilepsie, scrophules.

ORPIMENT, *Voy.* SULFURE D'ARSENIC.

ORPIN, *Sedum Telephium*, Décandropentagyn. Succul. Franc. (Racine et feuilles fraîches.)

Obs. Feuilles contuses et suc à l'extérieur comme adoucissant, dans le traitement des cors aux pieds et des hémorrhoïdes.

ORTIE BLANCHE, *Lamium album*, Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Herbe.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒij à ʒij. — Suc, ʒj à ʒiij. — Extrait, ʒj à ʒss.

P. Stimulante, tonique, astringente.

Obs. Peu usitée.

— GRIÈCHE, *Urtica urens*, Monoéc. tétrand. Urtic. Franc. (Herbe.)

F. D. Infusion, manip. ij par ℥ij d'eau. — Suc, ʒj à ʒiij. — Extrait, ʒj à ʒss. — *A l'extér.* lotion, gargarisme, cataplasme.

P. Astringente, résolutive.

Cas part. Scorbut, hémorrhagies passives.

OSEILLE, *Rumex Acetosa*, Hexand. trigyn. Polygon. Franc. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, décoct. ʒss à ʒj par ℥ij d'eau. — Feuille, infusion, manip. j par ℥ij

d'eau. — Suc, ʒj à ʒij. — *A l'extér.* en cataplasme.

P. Délayante, rafraîchissante, antiscorbutique, maturative.

OXALATE ACIDULE DE POTASSE, (Sell d'oseille, *Sur-deutoxalate de potassium.*)

F. D. ʒss à ʒj par ℥ij d'eau.

P. Rafraîchissant.

Obs. Il entre dans la limonade sèche de *Fascio*.

OXIDES, *Voy.* les métaux qui les forment.

OXIGÈNE, (air vital.)

Obs. Employé, sans succès, à l'état de pureté ou mêlé à l'air atmosphérique, dans la phthisie pulmonaire.

P.

PAIN D'OISEAU, *Voy.* JOUBARBE.

PALMA CHRISTI, *Voy.* RICIN.

PANACÉE MERCURIELLE, *Voy.* MURIATE DE MERCURE DOUX.

PAPAYER, *Papaya Carica*, Décand.
monogyn. Cucurbit. Indes. (Suc.)

F. D. Suc liquide, cochl. j dans cochl. iij
Eau bouillante. — Suc desséché, ʒj à ʒij
dans eau bouillante, Q. S. — On peut donner
les feuilles en infusion, la racine en décoction;
mais les doses en sont encore peu connues.

P. Anthelmintique.

Obs. Peu connu, peu usité en France.
PAREIRA BRAVA, *Voy.* VIGNE SAUVAGE.
PARIÉTAIRE, *Parietaria officinalis*,
Polygam. monoéc. Urtic. Franc. (Herbe.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Infusion, ma-
ip. j par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv.
— Extrait, ʒj à ʒj. — Suc, ʒij à ʒiij. —
Décoction, en lavement.

P. Diurétique.

PAS-D'ANE, *Voy.* TUSSILAGE.
PASSERAGE (Grande), *Lepidium latifolium*,
Tétradyn. silicul. Crucif. Franc.
(Racine, feuille.)

F. D. Feuille, infus. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau
ou de vin, en 3 ou 4 prises. — Racine, décoct.

℥ss à ℥j par ℔ij d'eau. — *A l'extér.* en cataplasme.

P. Antiscorbutique, excitante, résolutive.

Obs. Peu usitée. Il en est de même de la petite passeraie, *Lepidium Iberis*.

PATIENCE, *Rumex Patientia*, Hexand. trigyn. Polygon. Franc. (Racine, feuille)

F. D. Racine, poudre, ℥ss à ℥j. — Décoction, ℥ss à ℥ij par ℔ij d'eau. — Extrait, ℥j à ℥ss. — Feuille, suc, ℥j à ℥ij.

P. Tonique, astringente, antiscorbutique.

Obs. Le *Rumex acutus* et le *R. aquaticus* sont aussi employés de la même manière.

PAVOT, *Papaver somniferum*, Polyand. monogyn. Papav. Franc. cult. (Capsule)

F. D. Décoct. n° ij à iij par ℔ij d'eau. Sirop (*sirop Diacode*), ℥ij à ℥jss. — Extrait, ℥j à ℥ss et plus. — *A l'extér.* lavement, lotion, fomentation, bain.

P. Narcotique, antispasmodique.

Obs. Il n'y a guère que la décoction

d'usitée, il est remplacé par l'*opium* dans toutes les préparations officinales.

PÊCHER, *Amygdalus Persica*, Icosand. monogyn. Rosac. Franc. cult. (Feuille, fleur, fruit.)

F. D. Feuille, infus. $\mathfrak{z}\text{ss}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$ par ℥j d'eau. — Fleur, poudre, $\mathfrak{z}\text{ss}$ à $\mathfrak{z}\text{j}$. — Infusion, $\mathfrak{z}\text{ij}$ à $\mathfrak{z}\text{ss}$ par ℥j d'eau. — Sirop, $\mathfrak{z}\text{ij}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$. — Suc, $\mathfrak{z}\text{ss}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$.

P. Purgatif, vermifuge.

Obs. Toutes les parties du pêcher sont plus actives fraîches que sèches. Le fruit est un aliment agréable et sain. L'amande a été prescrite quelquefois en émulsion à la dose de $\mathfrak{z}\text{ij}$ à $\mathfrak{z}\text{iiij}$, comme carminative, vermifuge et diurétique.

PENSÉE SAUVAGE, *Voy.* VIOLETTE TRICOLORE.

PERSIL, *Apium Petroselinum*, Pentand. trigyn. Umbell. Franc. cult. (Racine, feuille, graine.)

F. D. Racine, poudre, $\mathfrak{z}\text{j}$ à $\mathfrak{z}\text{ss}$. — Décoct. $\mathfrak{z}\text{ss}$ à $\mathfrak{z}\text{j}$ par ℥ij d'eau. — Extrait, $\mathfrak{z}\text{j}$ à $\mathfrak{z}\text{ss}$. —

Suc, $\mathfrak{z}\text{j}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$. — *Graine*, poudre, gr. xij à 3j .
 — Infus. $\mathfrak{z}\text{j}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$ par $\mathfrak{H}\text{ij}$ d'eau. — Eau dist.
 $\mathfrak{z}\text{j}$ à $\mathfrak{z}\text{ij}$. — *Feuille*, à l'extér. en épithème.

P. Diurétique, emménagogue, résolutif.

Obs. Actif; mais peu usité. La racine est une des 5 racines apéritives; la graine est une des 4 semences chaudes mineures.

PERVENCHE, *Vinca minor*, *V. minor*, Pentand. monogyn. Apocin. France (Feuille.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iiij par $\mathfrak{H}\text{ij}$ d'eau.
 — *A l'extér.* gargarisme.

P. Styptique, légèrement astringent.

Obs. Peu usitée.

PÉTROLE, (Naphte, Huile de Gabiar, Huile de pierre), suc dont la nature est peu connue, qui suinte entre les rochers. France. Italie.

F. D. G^{te} vj à xv sur du sucre. — *A l'extér.* friction, sur le ventre, comme vermifuge; sur les membres, comme excitant.

P. Calmant, antispasmodique, vermifuge.

PHELLANDRIUM, *Voy.* CIGUE AQUATIQUE.

PHOSPHATE DE CHAUX, (*Proto-phosphate de calcium.*)

D. 3ß, plusieurs fois le jour.

Cas part. Rachitis.

Obs. Peu usité; il entre dans des préparations officinales et magistrales.

PHOSPHATE SATURÉ DE SOUDE, (*Sous-deuto-phosphate de sodium.*)

F. D. Comme altérant, 3ß à 3ij. — Comme purgatif, 3ß à 3jß.

P. Diurétique, purgatif doux.

Obs. Très-usité.

PHOSPHORE.

F. D. Progressivement, $\frac{1}{4}$ de grain, gr. j, gr. ij dissous dans l'éther ou suspendu dans une émulsion et rarement en pilules.

P. Excitant général, aphrodisiaque.

Cas part. Fièvres adynamiques et atoniques, paralysie.

Obs. Dangereux. M. Lescot, pharma-

cien à Paris, est parvenu à dissoudre gr. iij de phosphore par ℥j d'une liqueur particulière. Sous cette forme, ce médicament paraît moins dangereux.

PIED-DE-LION, *Alchemilla vulgaris*, Tétrand. monogyn. Rosac. France (Feuille.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau.
— Suc, ℥ ij à ℥ iv.

P. Astringent, styptique.

PIED-DE-VEAU, *Arum maculatum*, Gynand. polyand. Aroïd. Franc. (Racine fraîche.)

F. D. Poudre, gr. iv à xij et même ℥j dans du miel. — Décoct. ℥j à ℥ ss par ℥ij d'eau. — *Racine sèche*, double dose. — *A l'extér.* épithème.

P. Excitant, diurétique, rubéfiant, vésicant.

Obs. Peu usité.

PIERRE A CAUTÈRE, *Voy.* POTASSE.

— **INFERNALE**, *Voy.* NITRATE D'ARGENT

FONDU.

PIGNONS DOUX, semences du *Pinus pinea*, Monoéc. monadelph. Conif. Franc.

F. D. En émulsion, \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} iv par ℥ij d'eau.

P. Délayans, adoucissans.

PISSENLIT, *Leontodon Taraxacum*, Syngén. polygam. ég. Chicor. France. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, décoct. \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} ij par ℥ij d'eau. — Feuille, infusion, manip. j par ℥ij d'eau. — Suc, \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} iv. — Extrait, \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} j.

P. Diurétique, laxatif, diaphorétique.

PISTACHE, semence du *Pistacia vera*, Dioéc. pentand. Térébent. Asie. Europ. cult.

F. D. En émulsion, \mathfrak{z} ij à \mathfrak{z} iv par ℥ij d'eau.

P. Délayante, adoucissante.

PIVOINE, *Pæonia officinalis*, Polyand. digyn. Renoncul. Franc. (Racine, fleur, graine.)

F. D. Racine, poudre, \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} j. — Décoct. \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} j. — Teinture, \mathfrak{z} ss à \mathfrak{z} j. — Extrait, \mathfrak{z} j à \mathfrak{z} j. — Suc, \mathfrak{z} j à \mathfrak{z} ij. — Fleur, infusion,

pinc. ij à iij par ℥ ij d'eau. — Sirop, ℥ ij à ℥ iij.
 — Eau distil. ℥ ij à ℥ iv. — Graine, infusion,
 ℥ ij à ℥ ss par ℥ ij d'eau.

P. Antispasmodique, légèrement narcotique.

PLANTAIN (grand), *Plantago major*,
 Tétrand. monogyn. Plantag. France.
 (Feuille.)

F. D. Infusion, manip. j à ij par ℥ ij d'eau.
 — Eau distil. ℥ ij à ℥ iv. — Suc, ℥ ij à ℥ iij. —
A l'extér. collyre, cataplasme.

P. Astringent faible.

Obs. Peu usité; il en est de même des
Plantago media, *P. lanceolata*. Il n'y a
 guère que le *P. Psyllium* d'employé, Voyez
 HERBE AUX PUCES.

PLOMB, inusité à l'état métallique.

Oxide jaune, (Massicot, Protoxide de
 plomb.) Fondu, il constitue la litharge.

— ROUGE, (Minium, Deutoxide de
 plomb.)

— BRUN, (Tritoxide de plomb.)

F. D. *A l'extér.* en poudre, en emplâtre, en onguent.

P. Sédatifs, astringens, répercussifs.

Obs. Il ne faut employer ces médicamens que sur des surfaces de moyenne étendue.

POIRÉE, *Beta alba*, *B. rubra*, Pentand. digyn. Chénopod. Franc. (Feuille.)

F. D. Décoction, manip. j par ℥ij d'eau. — Suc, ℥ij à ℥iv. — *A l'extér.* lavement, lotion, fomentation, cataplasme.

P. Rafraîchissante, émolliente, maturative.

POIVRE, *Piper nigrum*, Diand. trigyn. Urtic. Inde orient. (Graine.)

F. D. Grains, n^o j à iij. — Poudre, gr. v à x.

P. Stimulant, stomachique, fébrifuge.

Obs. Peu usité comme médicament.

POIX DE BOURGOGNE, résine du *Pinus sylvestris*, Monoéc. monadelph. Conif.

Obs. Usitée à l'extérieur, en épithème, comme rubéfiante et maturative.

POLYGALA DE VIRGINIE, *Polygala Sc-*

nega, Diadelph. octand. Rhinanth. Amériq.
(Racine.)

F. D. Poudre, gr. xvij à 3j. — Décoct. 3℥ à 3j
par ℥ij d'eau. — Vin, 3℥ à 3j. — Extrait,
gr. x à 3℥.

P. Stimulant, expectorant, diaphorétique, quelquefois purgatif.

Cas part. Catarrhe pulmonaire chronique, morsure des serpens.

Obs. On emploie quelquefois, dans les mêmes cas et sous les mêmes formes, les *Polygala amara* et *P. vulgaris*.

POLYPODE, *Polypodium vulgare*, Cryptogam. Foug. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre, 3℥ à 3j. — Décoct. 3℥ à 3j par ℥ij d'eau.

P. Adoucissant, laxatif.

POMME, *Pyrus malus*, Icosand. pentagyn. Rosac. Franc. (Fruit.)

F. D. Décoction, n° ij à iij par ℥ij d'eau. — Sirop, 3j à 3iij. — *A l'extér.* en cataplasme.

P. Rafraîchissante, laxative, émolliente.

POMME ÉPINEUSE, *Datura Stramonium*,
Pentand. monogyn. Solan. Franc. (Plante
entière.)

F. D. Extrait, gr. ß à gr. ij en pilules ou dans
une potion ; on peut répéter cette dose 2 ou 3
fois par jour. On l'a donné jusqu'à gr. v et
même gr. xij par jour. — *A l'extér.* lotion, fo-
mentation, cataplasme.

P. Narcotique, résolutive.

Cas part. Chorée, épilepsie, cancer.

Obs. Dangereuse même à l'extérieur.

POTASSE CAUSTIQUE, (Pierre à cautère,
Hydrate de deutocide de potassium.)

F. D. *A l'extér.* comme caustique pour éta-
blir les fontanelles. — Très-étendue dans de
l'eau distillée, on a proposé de l'injecter dans
la vessie urinaire pour dissoudre les calculs
formés d'urate d'ammoniaque.

POULET.

F. D. Chair, décoct. ℥ viij à ℥ xij par ℔ ij
d'eau.

P. Adoucissant, pectoral.

POUILLOT, *Voy.* MENTHE POUILLOT.

PRÉCIPITÉ ROUGE, *Voy.* MERCURE.

PRUNEAUX, fruit desséché du *Prunus domestica*, Icosand. monogyn. Rosac. France.

F. D. Comme adoucissant, décoct. n^o xij à xvj par ℥ ij d'eau. — Comme laxatif, décoct. ℥ vj à ℥ viij par ℥ ij d'eau.

PRUNELLIER, *Prunus spinosa*, (Fruit.)

F. D. Décoct. ℥ ij à ℥ iv par ℥ ij d'eau. — Suc épaissi, (*Acacia nostras*,) ℥ j à ℥ ij.

P. Astringent.

Obs. Peu usité.

PSYLLIUM, *Voy.* HERBE AUX PUCES.

PTARMIQUE, *Achillea Ptarmica*, Syngén. polygam. frust. Corymbif. Franc. (Herbe.)

F. D. Poudre, pinc. j, par les fosses nasales, comme sternutatoire.

Obs. Succédané de la Pyrèthre.

PULMONAIRE, *Pulmonaria officinalis*, Pentand. monogyn. Borragin. France. (Feuille.)

F. D. Infusion, manip. j à ij par ℥ ij d'eau.

P. Adoucissante , pectorale.

PYRÈTHRE , *Anthemis Pyrethrum* , Syn-
gén. polygam. superf. Corymbif. Afriq.
(Racine.)

F. D. Poudre , pinc. j, par les fosses nasales,
comme sternutatoire. — Un petit morceau à
mâcher dans la bouche. — Décoction , en lave-
ment.

P. Sternutatoire , sialagogue , irritante.

Q.

QUASSIA , *Quassia amara* , Décand. mo-
nogyn. Tulipif. Amériq. (Racine , bois ,
particulièrement l'écorce.)

F. D. Poudre , ʒj à ʒss. — Infus. ʒj par ℥ij
d'eau. — Vin , ʒss à ʒj. — Teinture , ʒss à ʒj.
— Extrait , ʒj à ʒss.

P. Tonique , stomachique , fébrifuge.

Obs. M. Planche , pharmacien à Paris ,
fait infuser , pendant quelques minutes ,
du vin ou de l'eau dans des gobelets de
bois de *Quassia*. Ces liqueurs s'emploient

dans la débilité de l'estomac. On fait aussi macérer, pendant 12 heures, ʒij d'écorce de quassia dans ℥j d'eau. On en donne cochl. j à des intervalles plus ou moins éloignés.

QUINQUINA, *Cinchona officinalis* var. *Condaminea* (gris), *C. cordifolia* (jaune), *C. oblongifolia* (rouge), *C. lancifolia* (orangé), *C. ovalifolia* (blanc), *Pentaneura* monogyn. Rubiac. Amériq. (Ecorce.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj et même ʒij, en plusieurs prises, pendant l'apyrexie. — Macération, infus. décoct. ʒij à ʒij par ℥ij d'eau. — Vin, ʒij à ʒviij, en plusieurs prises. — Sirop, ʒij à ʒij. — Teinture, ʒss à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒj et même ʒss. — Lavement ʒj à ʒij. — *A l'extér.* lotion, fomentation, bain.

P. Tonique, fébrifuge, antiseptique.

Cas part. Fièvres adynamiques et intermittentes, gangrène, scorbut.

Obs. Il n'y a guère que les quinquina gris et rouge qui soient employés. On peu

en porter la dose très-haut: on en a fait prendre ℥ x à ℥ xj en 24 heures.

QUINTE-FEUILLE, *Potentilla reptans*, Icosand. polygyn. Rosac. Franc. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, décoct. ℥ β à ℥ ij par ℔ ij d'eau. — Feuilles, infusion, pinc. ij à iiij par ℔ ij d'eau. — Eau distil. ℥ ij à ℥ iv .

P. Astringente, styptique.

Obs. Succédané de l'argentine.

R.

RACINE DE JEAN LOPEZ, *Radix Lopeziana*, racine d'une plante peu connue, qu'on croit être le *Lopezia Racemosa*, Epilobiénes, Ventenat. Afriq. Amériq.

F. D. Poudre, ℥ j à ℥ β . — Teinture, ℥ β à ℥ j .

P. Astringente, stomachique.

Cas part. Diarrhée et dysenterie chroniques.

Obs. Peu usitée en France.

RAIFORT, *Cochlearia Armoracia*, Tétra-

dyn. silicul. Crucif. Franc. (Racine fraîche.)

F. D. Infus. 3℥ à 3j par ℔ij d'eau. — Teinture, 3℥ à 3ij. — Extrait, 3j à 3j. — Suc, 3℥ à 3j. — *A l'extér.* en épithème.

P. Antiscorbutique, vermifuge.

Obs. Très-usité.

RAISINS, *Voy.* VIGNE.

RAISIN D'OURS, *Arbutus Uva ursi*, Décand. monogyn. Bicorn. Franc. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, poudre, 3℥ à 3j. — Décoct. 3ij à 3℥ par ℔ij d'eau. — Feuille, comme la racine.

P. Diurétique.

RAPONTIC, *Rumex alpinus*, Hexand. trigyn. Polygon. Europ. (Racine.)

F. D. Poudre, 3j à 3ij. — Décoct. 3ij à 3℥ par ℔ij d'eau. — Extrait, 3℥ à 3ij.

P. Purgative, tonique, astringente.

RATANHIE, *Ratanhia*, Tétrand. monogyn. Rosac. Amériq. (Racine.)

F. D. Décoct. 3℥ par ℔ij d'eau réduite à ℔j; on ajoute à cette décoction, vinaigre 3℥.

P. Astringente.

Cas part. Hémorrhagies passives, leucorrhée.

Obs. Peu usitée en France.

RÉGLISSE, *Glycyrrhiza glabra*, Diadelph. décand. Légumin. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Infus. ʒj à ʒij par lbij d'eau. — Extrait, ʒss à ʒj et davantage.

P. Adoucissante, pectorale.

Obs. Très usitée pour édulcorer les tisanes.

RHUBARBÉ, *Rheum palmatum*, *R. undulatum*, *R. Compactum*, Ennéand. trigyn. Polygon. Europ. Asie. Franc. cult. (Racine.)

F. D. Poudre, comme tonique, gr. iv à xij; comme purgatif, ʒss à ʒj. — Infus. ou décoct. ʒij à ʒiij par lbij d'eau. — Vin, ʒss à ʒj. — Sirop, ʒij à ʒij. — Teinture, ʒj à ʒij. — Extrait, gr. xij, ʒj à ʒj. — En lavement, ʒij.

P. Purgative, tonique

— RAPONTIC, *Rheum Rhaponticum*. (Racine.)

F. D. P. Celles de la rhubarbe.

Obs. Elle est plus astringente que purgative.

RHUE, *Voy.* RUE.

RICIN, *Ricinus communis*, Monoéc. monadelph. Tithym. Amériq. Franc. cult. (Graine.)

F. D. Huile, ʒss à ʒij avec partie égale de sirop.

P. Purgatif doux.

RIZ, *Oryza sativa*, Héxand. digyn. Gramin. Franc. cult. (Graine.)

F. D. Décoct. ʒij à ʒss par ℥ij d'eau. En lavement, double dose.

P. Adoucissant, pectoral.

ROMARIN, *Rosmarinus officinalis*, Dian. monogyn. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infus. ʒj à par ℥ij d'eau ou de vin. — Teinture, ʒj à — Eau distil. ʒij à ʒiij. — Alcool, ʒss à — Huile essent. gtte ij à viij. — Vinaigre, ʒj à — Miel, ʒss à ʒiij en lavement. — *A l'ex.* lotion, fomentation, vapeur, bain.

P. Stimulant, tonique.

RONCE, *Rubus fruticosus*, Icosand. polygyn. Rosac. Franc. (Feuille.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij. — *A l'extér.* en gargarisme.

P. Astringent faible.

ROSE PALE, *Rosa centifolia*, Icosand. polygyn. Rosac. Franc. (Pétales.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒ iij. — Sirop, ʒ β à ʒ ij. — Conserve, ʒ β à ʒ j.

P. Laxative, purgative.

ROSE ROUGE, *Rosa gallica*. (Pétales.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iv par ℥ ij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒ ij. — Sirop, ʒ β à ʒ ij. — Conserve, ʒ β à ʒ j. — Vinaigre, ʒ j à ʒ β. — Suc, ʒ ij à ʒ j. — Miel, ʒ j à ʒ ij en lavement. — *A l'extér.* lotion, fomentation, collyre.

P. Astringente.

ROSIER SAUVAGE, *Rosa Canina*. (Fleur, fruit.)

F. D. *Fleur*, comme celle de la rose pâle. — *Fruit*, sirop, ʒ ij à ʒ ij. — Conserve, ʒ β à ʒ j.

P. Fleur, laxative. *Fruit*, astringent.

ROSEAU AROMATIQUE, *Acorus Calamus*,
Calamus aromaticus, Hexand. monogyn.
Aroïd. Inde. (Racine.)

F. D. Poudre, gr. xij à 3℥. — Décoct. 3j à 3ij
par ℥ij d'eau. — Teinture, 3℥ à 3j. — Eau
distil. 3j à 3iij. — Alcool, 3℥ à 3j. — Extrait,
3j à 3j.

P. Stimulant, stomachique, diurétique.
— A BALAIS, *Arundo Phragmites*, Triand.
digyn. Gramin. Franc. (Racine.)

F. D. Décoct. 3℥ à 3ij par ℥ij d'eau. — Eau
distil. 3j à 3iij. — Extrait, 3j à 3j.

P. Sudorifique, diurétique.

Cas part. Syphilis, scorbut, hydro-
pisie.

Obs. On croit qu'il entre dans le rob
de Laffecteur.

RUE, *Ruta graveolens*, Décand. mono-
gyn. Rutac. Franc. (Feuille.)

F. D. Poudre, gr. xij à 3j. — Infusion,
pinc. j par ℥ij d'eau ou de vin. — Eau distil.
3j à 3ij — Huile essent. g^{te} ij à vj. — Conserve,

gr. xij à ʒβ. — Vinaigre, ʒβ à ʒij en lavement.
— *A l'extér.* lotion, fomentation, vapeur.

P. Emménagogue.

S.

SABINE, *Juniperus Sabina*, Dioéc. monadelph. Conif. Franc. (Feuilles.)

F. D. Poudre, gr. x à ʒj et très-rarement ʒβ. — Infus. ʒj à ʒβ et rarement ʒj par lbij d'eau. — Eau distil. ʒj à ʒij. — Huile essent. gttē ij à x. — Extrait, gr. vj à ʒj et rarement ʒβ. — *A l'extér.* poudre comme cathérétique.

P. Emménagogue, anthelmintique.

Obs. Son emploi demande de la prudence. La poudre n'est guère usitée qu'à l'extérieur.

SAFRAN, *Crocus sativus vel officinalis*, Triand. monogyn. Irid. Franc. (Stygmates.)

F. D. Poudre, gr. xij à ʒj. — Infus. ʒβ à ʒj par lbij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒβ. — Teinture, ʒj à ʒβ. — Extrait, gr. x à xvij, rarement ʒj. — *A l'extér.* en lotion ou dans un cataplasme.

P. Stimulant, emménagogue, résolutif.

SAFRAN DE MARS APÉRITIF, *Voy.* CARBONATE DE FER.

— — ASTRINGENT, *Voy.* FER.

SAGAPENUM, gomme-résine d'une plante peu connue de la famille des Ombellifères.

F. D. En substance, gr. x à ʒj en pilules ou dans une potion avec le jaune d'œuf. — Teinture, g^{tte} x à ʒj et même ʒ ss. — *A l'extérieur* friction, emplâtre.

P. Emménagogue, antispasmodique, maturatif.

SAGOU, fécule retirée de la tige et des branches d'une espèce de palmier; les uns l'appellent *Metroxylon-sagu*, les autres *Sagus* ou *Palma farinaria*. On le retire aussi, d'après quelques-uns, de la tige du *Cycas Revoluta* et du *C. Circinalis*, et même de la racine du *Dioscorea sativa*.

F. D. Décoct. ʒ ss à ʒj par ℥ij d'eau.

P. Adoucissant, pectoral, nutritif.

Obs. Plutôt aliment que médicament.

SALEP, *Orchis Morio*, *O. mascula*, *O. militaris*, etc. Gynand. diand. Orchid. Europ. Asie. (Bulbe préparé.)

F. D. P. Comme le sagou.

SALICAIRE, *Lythrum Salicaria*, Dodéand. monogyn. Calycanth. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ℥j à 3j. — Infusion, pinc. ij à iij par ℔ij d'eau.

P. Astringente.

SALPÊTRE, *Voy.* NITRATE DE POTASSE.

SALSEPAREILLE, *Smilax Sarsaparilla*, Dioéc. hexand. Smilac. Indes orient. et occident. (Tige, racine.)

F. D. Poudre, 3℔ à 3j. — Décoct. rapprochée, 3j à 3ij et quelquefois 3iv par ℔ij d'eau. — Sirop, 3℔ à 3ij. — Extrait, gr. xij à 3℔ et même 3j.

P. Sudorifique.

Cas part. Syphilis, rhumatisme et goutte chroniques.

Obs. Très-usitée ; un des 4 bois sudorifiques.

SANG-DRAGON, *Pterocarpus Draco*, D. adelph. décand. Légumin. Indes. (Gomme Résine.)

F. D. Poudre, gr. x à 3 ℥. — Décoct. 3 j à 3 ℥ par ℥ij d'eau. — *A l'extér.* en poudre comme astringent.

P. Astringent.

Obs. Il est souvent sophistiqué. La décoction a peu de vertu. Le sang-dragon du commerce est souvent retiré du *Calamus Rostang*, du *Dracæna Draco*, du *Pterocarpus Santalinus*.

SANTAL, *Santalum album*, Tétrand. monogyn. Inde. (Bois.)

F. D. Poudre, 3 j à 3 ℥. — Décoct. 3 ij à 3 ℥ par ℥ij d'eau.

P. Excitant, stomachique.

Obs. Il n'y a d'usité que le santal citrin qui est, dit-on, le bois de l'arbre, tandis que le santal blanc n'est que l'aubier. Le

Santal rouge est retiré du *Pterocarpus Santalinus*.

SANTOLINE, *Santolina Chamæ-Cyparissus*, Syngén. polygam. ég. Corymbif. (Feuille, fleur.)

F. D. Poudre, ℥j à 3℥. — Infusion, pinc. à ij par ℥j d'eau.

P. Tonique, vermifuge, emménagogue.

Obs. On donne aussi le nom de santoline au *Semen-contra*.

SAPONAIRE, *Saponaria officinalis*, Décand. digyn. Caryoph. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre, 3℥ à 3j. — Décoct. 3℥ à 3j. — Suc, 3ij à 3vj. — Extrait, 3℥ à 3j.

P. Tonique, sudorifique, diurétique.

Obs. Active; mais peu usitée.

SASSAFRAS, *Laurus Sassafras*, Ennéand. monogyn. Laur. Amériq. (Bois.)

F. D. Poudre, 3℥ à 3j. — Infus. 3℥ à 3ij par ℥ij d'eau. — Teinture, 3℥ à 3j. — Huile essent. g^{tte} ij à viij. — Extrait, 3j à 3j.

P. Sudorifique, diurétique.

Obs. Un des 4 bois sudorifiques.

SAUGE, *Salvia officinalis*, Diand. monogyn. Lab. Franc. (Feuille.)

F. D. Poudre, $\mathfrak{D}j$ à $\mathfrak{3}\text{ss}$. — Infusion, pinte à \mathfrak{ij} par $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ d'eau. — Teinture, $\mathfrak{3}\text{ss}$ à $\mathfrak{3}j$. Eau distil. $\mathfrak{3}\mathfrak{ij}$ à $\mathfrak{3}\mathfrak{iv}$. — Alcool, $\mathfrak{3}\text{ss}$ à $\mathfrak{3}j$. Huile essent. gttē \mathfrak{ij} à \mathfrak{viij} . — *A l'extér.* en peur, lotion, fomentation, bain.

P. Stimulante, tonique, résolutive.

SAULE, *Salix alba*, Dioéc. dian. Ament. Franc. (Ecorce.)

F. D. Poudre, $\mathfrak{D}j$ à $\mathfrak{3}\text{ss}$. — Décoct. $\mathfrak{3}\mathfrak{ij}$ à \mathfrak{ij} par $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ d'eau. — Vin, $\mathfrak{3}\mathfrak{ij}$ à $\mathfrak{3}\mathfrak{iiij}$.

P. Tonique, astringent, febrifuge.

SAVON MÉDICINAL, (Savon Amygdali

F. D. Gr. \mathfrak{vj} à $\mathfrak{D}j$ et même $\mathfrak{3}j$ en pilules. *A l'extér.* eau de savon, en lotion, fomentati Elle entre dans les cataplasmes. Il y a aussi emplâtre de savon.

P. Apéritif, fondant, résolutif.

SAXIFRAGE, *Saxifraga granulata*, Deand. digyn. Saxif. (Plante entière particulièrement la racine.)

F. D. Décoct. $\mathfrak{3}\text{ss}$ à $\mathfrak{3}j$ par $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ d'eau.

P. Diurétique.

SCABIEUSE, *Scabiosa arvensis*, *S. Succisa*, Tétrand. monogyn. Dipsac. (Racine, fleur.)

F. D. Racine, poudre, ʒss à ʒj. — Décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Suc, ʒij à ʒiv. — Extrait, ʒj à ʒj. — Fleur, poudre, ʒss à ʒj. — Infusion, manip. j par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — *A l'extér.* gargarisme, cataplasme.

P. Diaphorétique, résolutive.

SCAMMONÉE, *Convolvulus Scammonia*, Pentand. monogyn. Convol. Asie. (Gomme-Résine.)

F. D. En substance, gr. vj à xvij, rarement ss en pilules. — Résine, gr. vj à xij en pilules, ou dans une émulsion. — Sirop, ʒij à ʒij. — Teinture, g^{tte} iv à x.

P. Purgatif drastique.

Obs. Pour en diminuer l'activité on l'unit au coing, à la rose, au soufre, à la réglisse, etc. Elle prend alors le nom de *Diagrède cydonié, soufré, glycirrhizé*, etc. Dose gr. vj à xv. La scammonée d'Alep est plus estimée que celle de Smyrne.

SCILLE, *Scilla maritima*, Hexand. monogyn. Liliac. Europ. (Bulbe.)

F. D. Poudre, gr. ij à iv. — Extrait, gr. j à ii.
— Vin, ℥ss à ℥j en plusieurs prises. — Vinaigre, ℥ss à ℥j plusieurs fois le jour. — Oximel, ℥ss à ℥j.
— Teinture, ℥j à ℥ij dans une potion. — Miel, ℥ss à ℥j.
en lavement, ℥j à ℥ij.

P. Diurétique, expectorante.

Obs. La scille, en poudre est émétique à la dose de gr. iv à viij.

SCOLOPENDRE, *Asplenium Scolopendrium*, Cryptogam. Foug. Europ. (Feuille.)

F. D. Infusion, manip. j par ℥ij d'eau.

P. Diurétique, Astringente.

Obs. Peu usitée.

SCORDIUM, *Voy.* GERMANDRÉE AQUATIQUE.

SCORSONÈRE, *Scorzonera Hispanica*, *S. humilis*. Syngén. polygam. ég. Chicorée. Franc. (Racine.)

F. D. Décoct. ℥j à ℥ij par ℥ij. — Eau distillée. ℥ij à ℥iv. — Extrait, ℥ss à ℥ij.

P. Diaphorétique, diurétique.

Obs. Plutôt aliment. que médicament.

SCROPHULAIRE, *Scrophularia nodosa*,
 Didynam. angiosperm. Person. Franc. (Ra-
 cine, feuille.)

F. D. Décoct. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ à $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ par $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ d'eau. —
A l'extér. lotion, fomentation, cataplasme.

P. Tonique, sudorifique, résolutive.

Obs. Peu usitée; il en est de même de
 la Scrophulaire aquatique. *S. aquatica*.

SÉBESTES, *Cordia Myxa*, Pentand. mo-
 nogyn. Sébesten. Afriq. (Fruit.)

F. D. Décoction, n^o xij à xx par $\mathfrak{lb}\mathfrak{ij}$ d'eau.

P. Adoucissantes, pectorales, laxatives.

Obs. Peu usitées.

SEL D'ABINTHE, *V.* CARBONATE DE PO-
 TASSE.

— AMMONIAC, *Voy.* MURIATE D'AMMO-
 NIAC.

— DE BENJOIN, *V.* ACIDE BENZOÏQUE.

— DE CANAL, } *V.* SULFATE
 — CATHARTIQUE AMER, } DE MAGNÉSIE.

— DE COLCHOTAR, *V.* SULFATE DE FER.

— COMMUN, *V.* MURIATE DE SOUDE.

— DIGESTIF, *V.* MURIATE DE POTASSE.

SEL DE DUOBUS, *V.* SULFATE DE POTASSE.

— D'EPSOM ANGLAIS, *V.* SULFATE DE
MAGNÉSIE.

— D'EPSOM DE LORRAINE, *V.* SULFATE
DE SOUDE.

— ESSENT. DE TARTRE, *V.* ACIDE TAR-
TARIQUE.

— FÉBRIFUGE DE SYLVIUS, *V.* MURIATE
DE POTASSE.

— FIXE D'AMMONIAQUE, *V.* MURIATE
DE CHAUX.

— DE GLAUBER, *V.* SULFATE DE SOUDE.

— MARIN, *V.* MURIATE DE SOUDE.

— MARIN CALCAIRE, *Voy.* MURIATE DE
CHAUX.

— D'OSEILLE, *V.* OXALATE ACIDULE DE
POTASSE.

— POLYCHRESTE, *V.* TARTRATE DE PO-
TASSE ET DE SOUDE.

— DE PRUNELLE, *V.* NITRATE DE PO-
TASSE FONDU.

— DE LA ROCHELLE, *V.* TARTRATE DE
POTASSE ET DE SOUDE.

SEL DE SATURNE, *V.* ACÉTATE DE PLOMB.

— SÉDATIF DE HOMBERG, *V.* ACIDE BORACIQUE.

— DE SEDLITZ, *V.* SULFATE DE MAGNÉSIE.

— DE SEIGNETTE, *V.* TARTRATE DE POTASSE ET DE SOUDE.

— DE SOUDE, *V.* CARBONATE DE SOUDE.

— DE TARTRE, *V.* CARBONATE DE POTASSE.

— VÉGÉTAL, *V.* TARTRATE DE POTASSE.

— VOLATIL, *V.* CARBONATE D'AMMONIAQUE.

SEMEN-CONTRA, *Artemisia-contra*, *A. Santonica*, *A. Judaïca*, Singén. polygam. superfl. Corymbif. Asie. Afriq. (Graine.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒj. — Infus. ʒj à ʒiij par ℥j d'eau, deux fois par jour. — Teinture, ʒss à ʒj.

P. Tonique, vermifuge.

Obs. Remplacée avec avantage par la graine de l'*Artemisia Campestris*.

SEMENTINE, *V.* SEMEN-CONTRA.

SÉNÉ, *Cassia Senna*, Décand. monoc. gyn. Légumin. Afriq. Asie. Cultivé en Italie. (Feuille, follicule.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒj et rarement ʒij. — Infus. ʒij à ʒss par ʒ v d'eau. — Teinture ʒj à ʒij. — En lavement, ʒij à ʒss.

P. Purgatif.

Obs. On le prescrit rarement seul. Les follicules purgent plus doucement que les feuilles.

SÉNEVÉ, *Sinapis nigra*, *S. alba*, Tétradyn. Siliqueus. Crucif. Franc. (Graine.)

F. D. En substance, cochl. iij à iv pendant l'apyrexie. — Farine, cochl. ij à iij dans un lavement. — *A l'extér.* Farine avec le vinaigre en cataplasme (sinapisme), ʒj à ʒiv dans un pédiluve.

P. Fébrifuge, excitant, rubéfiant.

Obs. La graine entre dans quelques composés officinaux.

SERPENTAIRES DE VIRGINIE, *Aristolochia Serpentaria*, Gynand. hexand. Asar. (Racine.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒss. — Infus. ʒj à ʒi

par ℥j d'eau ou de vin. — Extrait, ℥j à 3℥ et même 3j. — *A l'extér.* gargarisme.

P. Tonique, fébrifuge, diaphorétique.

SERPOLET, *Thymus Serpyllum*, Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ℥j à 3℥. — Infus. 3ij à 3℥ par ℥ij d'eau. — Huile essent. g^{tte} ij à viij. — *A l'extér.* vapeur, lotion, fomentation, bain.

P. Stomachique, stimulant.

Obs. Peu usité. La variété *Serpyllum foliis citriodore*, est usitée quelquefois dans les bains.

SIMAROUBA, *Quassia monoica*, vel *Q. Simaruba*, Décand. monogyn. Tulipif. Amériq. (Ecorce.)

F. D. Poudre, ℥j à 3℥. — Décoct. 3j à 3ij par ℥ij d'eau. — Sirop, 3ij à 3ij. — Teinture, 3℥ à 3ij. — Extrait, 3℥ à 3j et même 3ij.

P. Tonique, astringent, fébrifuge, quelquefois vomitif.

Obs. Très-usité.

SOLDANELLE, *Convolvulus Soldanella*,

Pentand. monogyn. Convolvul. Europ.
(Herbe.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒʒ. — Infus. ʒj à ʒʒ
par lbij d'eau. — Suc, ʒj à ʒʒ.

P. Purgative, hydragogue.

Obs. Peu usitée.

SON, écorce de la graine du *Triticum*
hybernum et du *T. Æstivum*, Trian.
digyn. Gramin. Franc. cult.

F. D. P Décoction, comme émollient
en lavement, fomentation, lotion, bain. —
cataplasme.

SOUCHET, *Cyperus longus*, Trian.
digyn. Cypéroïd. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒʒ à ʒj. — Infus. ʒij à ʒʒ
par lbij d'eau ou de vin.

P. Apéritif, diurétique, emmén-
agogue.

Obs. Peu usité. On emploie aussi
racine du souchet ou safran des Indes
Curcuma longa, à la même dose et dans
les mêmes cas.

SOUDE, (*Deutoxide de sodium.*)

F. D. P. Mêlée à 8 ou 10 parties d'axonge, dans le traitement de la teigne.—Pure, comme caustique.

SOUFRE SUBLIMÉ, (Fleurs de soufre.)

F. D. Poudre, gr. xij à ℥j et même 3j seule ou dans un extrait.—Pastilles, 3j à 3℔.—Baumes de soufre anisé, succiné, térébenthiné, etc., ℥j à 3j.—*A l'extér.* dans l'axonge en friction, en bain fumigatoire partiel ou général.

P. Diaphorétique, expectorant, excitant.

Cas part. Gale, dartres, asthme humide.

SOUFRE DORÉ D'ANTIMOINE, *Voy. ANTIMOINE.*

SQUINE, *Smilax China*, Dioéc. héxand. Smilac. Asie. Amériq. (Racine.)

F. D. Poudre, 3℔ à 3j.—Décoct. 3ij à 3iij par ℔ij d'eau.—Extrait, ℥j à 3j.

P. Sudorifique.

Obs. Un des 4 bois sudorifiques.

STAPHISAIGRE, *Delphinium Staphisa-*

gria, Polyand. trigyn. Renoncul. Fran
(Graine.)

F. D. Poudre, gr. viij à xv. — *A l'exté*
poudre sèche en décoction ou incorporé dans
l'axonge ou l'huile d'olives.

P. Purgatif, vermifuge, antipsorique.

Obs. Il n'est usité qu'à l'extérieur dans
les affections pédiculaires et la gale.

STÉCHAS, *Lavandula Stæchas*, Didynar
gymnosp. Lab. Franc. (Feuille, particu
lièrement la fleur.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infusion, pina
ij à iij par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒij.

P. Stimulant, antispasmodique.

STRAMONIUM, *Voy.* POMME ÉPINEUSE.

STYRAX BENJOIN, *Voy.* BAUME BENJOIN
ET ACIDE BENZOÏQUE.

SUBLIMÉ CORROSIF, *Voy.* MURIATE DE
MERCURE SUR OXIDÉ.

— DOUX, *Voy.* MURIATE DE MERCURE
DOUX.

SUCCIN, *Voy.* AMBRE JAUNE.

SUCRE, *Saccharum officinarum*, Triand.
igyn. Gramin. Indes orient. et occident.

F. D. P. Dose, Q. V. adoucissant. Employé
pour édulcorer les boissons. Il entre dans les
sirops, conserves, pâtes, etc.

— DE LAIT. Dissous dans l'eau, il est
quelquefois employé au lieu du petit-lait ;
mais il n'en possède pas les qualités.

— DE SATURNE, *V.* ACÉTATE DE PLOMB.
SULFATE ACIDE D'ALUMINE ET DE PO-
ASSE, *Voy.* ALUN.

— DE CUIVRE, (Vitriol bleu, *Sur-deuto-*
sulfate de cuivre.)

F. D. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ grain en pilules ou dans une
boisson mucilagineuse. — *A l'extér.* pur, comme
astringent. — \mathfrak{J} à \mathfrak{ss} par \mathfrak{ssj} d'eau, en in-
jection.

P. Stimulant, antispasmodique, astrin-
gent, caustique.

Cas part. Epilepsie, blennorrhée.

Obs. Dangereux à l'intérieur.

— DE CUIVRE AMMONIACÉ, (*Deuto-sul-*
te de cuivre et d'ammoniaque.)

F. D. $\frac{1}{3}$ à $\frac{2}{3}$ de grain, progressivement gr. et même gr. iv mêlé avec du sucre, en poudre ou en pilules.

P. Antispasmodique.

Cas part. Epilepsie, chorée.

Obs. Dangereux.

SULFATE DE FER, (Vitriol vert, *Proto sulfate de fer.*)

F. D. Poudre, gr. vj à xvij en pilules. 3ß à 3j par ℥ij d'eau ou dans une potion. Double dose dans un lavement. — *A l'ext* en lotion, collyre, fomentation.

Obs. Comme fébrifuge, on en a quelquefois donné 3ß à 3j en poudre ou pilules, pendant l'apyrexie.

— DE MAGNÉSIE, (Sel de Sedlitz, *Proto sulfate de magnésium.*)

— DE POTASSE, (Sel de duobus, *Deu sulfate de potassium.*)

— DE SOUDE, (Sel de Glauber, *Deu sulfate de sodium.*)

F. D. P. Des 3 espèces ci-dessus. Comme p

atif, $\text{℥}\beta$ à $\text{℥}\text{ij}$ dans $\text{℥}\text{v}$ à $\text{℥}\text{ij}$ d'eau ou dans
une potion purgative.

SULFATE DE ZINC, (Vitriol blanc, *Deuto-sulfate de zinc.*)

F. D. Gr. ij à iv en pilules ou dans une
potion. — Comme émétique, gr. vj à $\text{℥}\text{j}$. —
à l'extér. collyre, gr. iv par $\text{℥}\text{j}$ de liquide. —
injection, $\text{℥}\text{j}$ à $\text{℥}\text{j}$ par $\text{℥}\text{ij}$ d'eau.

P. Vomitif, astringent, excitant.

Obs. Peu usité à l'intérieur.

SULFITE SULFURÉ de soude, (*Deuto-sulfite sulfuré de sodium.*)

F. D. En pilules, gr. xviiij à $\text{℥}\beta$.

P. Sudorifique, diaphorétique.

Cas part. Dartres.

Obs. Il purge légèrement à la dose de
 ij à $\text{℥}\text{vj}$.

SULFURE D'ANTIMOINE, (Antimoine cru.)

F. D. Gr. viiij à $\text{℥}\text{j}$ et plus.

P. Vomitif infidèle ; abandonné.

— D'ARSENIC JAUNE OU ROUGE, (Orpi-
ment, Réalgar.)

Obs. Inusités en France.

SULFURE NOIR DE MERCURE, (*Ethiops minéral.*)

F. D. Gr. vj à ℥j et même 3j mêlé à une poudre ou à un électuaire.

P. Antisymphilitique.

Obs. Peu employé.

— ROUGE DE MERCURE, (*Cinabre.*)

F. D. Gr. ij à xij mêlé à une poudre ou à un électuaire. — *A l'extér.* mêlé à l'axonge, bain fumigatoire.

P. Comme le précédent.

Obs. Les sulfures de mercure ne sont guère employés qu'en bains fumigatoires. La dose pour chaque bain est de 3j à 3℥. On fait prendre de 20 jusqu'à 30 bains pour un traitement. Le sulfure rouge entre dans quelques composés officinaux.

— DE POTASSE, (*Sulfure de Potassium.*)

F. D. Gr. vj à xviii mêlé à une poudre ou à un extrait, en deux prises. — Sirop, 3ij à 3℥.

— *A l'extér.* lotion, liniment, bain liquide ou fumigatoire.

P. Sudorifique, diaphorétique, excitant.

Cas part. Dartres, gale, croup, catarrhe pulmonaire chronique.

Obs. On peut remplacer le sulfure de potasse surtout à l'extérieur, par les sulfures de chaux, de fer, de soude, etc.

SUREAU, *Sambucus nigra*, Pentand. trigyn. Caprifol. Franc. (Seconde écorce, feuille, fleur, baies.)

F. D. Écorce fraîche, décoct. $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{ij}$ par $\text{℥} \text{v}$ ou $\text{℥} \text{ij}$ d'eau. — Suc, $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{iiij}$. — *Fleur*, poudre, $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{ij}$. — Infusion, pinc. ij à iiij par $\text{℥} \text{ij}$ d'eau. — Vinaigre, $\text{℥} \text{ss}$ à $\text{℥} \text{ij}$. — *Baies*, rob, $\text{℥} \text{ij}$ à $\text{℥} \text{ss}$ et même $\text{℥} \text{ij}$. — *A l'extér.* feuille, en cataplasme. — *Fleur*, lavement, vapeur, lotion, émolument, bain.

P. Ecorce, purgative, diurétique. *Fleur*, feuille, baies, sudorifiques, diaphorétiques, résolutives.

Obs. Ecorce, vantée par Sydenham, dans l'hydropisie.

SUREAU (petit), *Voy. HIÈBLE.*

T. — *Tabacum*

TABAC, *Nicotiana Tabacum*, Pentand.
monogyn. Solan. Franc. Cult. (*Feuilles.*

F. D. Teinture, 3 ij à 3 ss. — Sirop, 3 ij à 3 i.
— Extrait, comme altérant, gr. j à iv; comme
émétique, gr. iv à xij. — *A l'extér.* en lavement
fumigation, lotion.

P. Purgatif, émétique, narcotique, st
mulant.

Obs. Peu usité à l'intérieur. On le pre
crit en infusion comme émétique à la do
se de 3 j à 3 ss dans 3 vj d'eau en 2 ou 3 prises.

TABOURET, *Thlaspi Bursa pastoris*, T
tradyn. silicul. Crucif. Franc. (*Feuille.*

F. D. Poudre, 3 ss à 3 j. — Infusion, mani
j à iij par ℥ij d'eau ou de vin.

P. Antiscorbutique, légèrement astringent.

Obs. Peu usité. Il en est de même
la Monnoyère (*Thlaspi arvense.*)

TAMARINS, *Tamarindus Indica*, Triand. monogyn. Légumin. Inde. (Pulpe du fruit.)

F. D. Décoct. $\mathfrak{z}j$ à $\mathfrak{z}ij$ par $\mathfrak{lb}ij$ d'eau. — On donne la même dose dans $\mathfrak{z}v$ d'eau. — On peut aussi en faire prendre en bols, de $\mathfrak{z}j$ à $\mathfrak{z}\beta$.

P. Purgatif doux.

TAMARISC, *Tamarix Gallica*, Pentand. pentagyn. Portulac. Franc. (Ecorce.)

F. D. Poudre, $\mathfrak{z}j$ à $\mathfrak{z}j$. — Décoct. $\mathfrak{z}\beta$ à $\mathfrak{z}j$ par $\mathfrak{lb}ij$ d'eau.

P. Fébrifuge, astringent.

TANAISIE, *Tanacetum vulgare*, Syngén. polygam. superfl. Corymbif. Franc. (Sommités, graine.)

F. D. Sommités, poudre, $\mathfrak{z}\beta$ à $\mathfrak{z}ij$. — Infusion, manip. j à ij par $\mathfrak{lb}ij$ d'eau ou de vin. — Suc, $\mathfrak{z}ij$ à $\mathfrak{z}j$. — Graine, poudre, gr. xij à $\mathfrak{z}j$. — Infus. $\mathfrak{z}ij$ à $\mathfrak{z}\beta$ par $\mathfrak{lb}\beta$ d'eau ou de lait. — *A l'extér.* lotion, fomentation, bain.

P. Emménagogue, vermifuge, tonique.

Obs. La graine est particulièrement usée comme vermifuge.

TARTRATE ACIDULE DE POTASSE, (Crème de tartre , *Sur - deuto - tartrate de potassium.*)

F. D. Poudre , ʒss à ʒij. — Rendu soluble au moyen d'un 8^e d'acide boracique , ʒij à ʒss dans ʒv ou ℥ij d'eau.

P. Diurétique , rafraîchissant , purgatif.

TARTRATE DE POTASSE , (Sel végétal *Deuto-tartrate de potassium.*)

F. D. P. Comme le précédent.

— DE POTASSE ANTIMONIÉ , (Emétique *Deuto-tartrate de potassium et de protoxide d'antimoine.*)

F. D. Comme purgatif , gr. ss à gr. ij par ℥ij d'eau ; comme émétique , gr. ij à iv par ℥ij d'eau (par verres de demi-heure en demi-heure) ; ou dans une potion calmante , à prendre par cuillerées. — Vin , ʒij à ʒiv en lavement et très-rarement pris par la bouche comme émétique , ʒss à ʒj.

P. Purgatif , émétique.

— DE POTASSE ET DE FER , *Deuto-tartrate de potassium et de fer.*)

F. D. Gr. xij à ʒj et même ʒβ en poudre, pilules ou potion. — *A l'extér.* dissous dans l'eau, en fomentation.

P. Stimulant, tonique, astringent.

Obs. Il existe dans les pharmacies 4 préparations de ce sel, qui ne diffèrent entre elles que par la plus ou moins grande quantité de fer qu'elles contiennent, 1°. *Tartre chalybé*; 2°. *Teinture de mars tartarisé*; 3°. *Tartre martial soluble*; 4°. *Boule de mars ou de Nancy*.

TARTRATE DE POTASSE ET DE SOUDE, (Sel de Seignette, *Deuto-tartrate de potassium et de sodium*.)

F. D. ʒij à ʒj par ℥ij d'eau.

P. Diurétique, purgatif.

TARTRE STIBIÉ, *Voy.* TARTRATE DE POTASSE ANTIMONIÉ.

— MARTIAL, } *Voy.* TARTRATE DE POTASSE ET DE FER.
— CHALYBÉ, }

TÉRÉBENTHINE DE CHIO, suc du *Pistacia terebinthus*, Dioéc. pentand. Térébenth. europ.

F. D. Gr. vj à ʒj et quelquefois ʒj en pilules, ou dans une potion, dissoute avec le jaune d'œuf. — En lavement, ʒj à ʒij dissoute avec le même. — Huile essent. grte iv à viij dans une potion.

P. Diurétique, expectorante, astringente.

Obs. Elle entre dans beaucoup de composés officinaux.

TÉRÉBENTHINE DE COPAHU, suc du *Copaïvera officinalis*. Décand. monogyne. Légumin. Amér.

F. D. Grte viij à ʒβ et même ʒj en pilules avec une poudre et du sucre, ou dans une potion, dissoute avec le jaune d'œuf ou l'alcool. — *A l'extér.* en injection.

P. Astringente, diurétique, expectorante.

— DE LA MECQUE, suc de l'*Amyris Opobalsamum*. Octand. monogyn. Térébenth. Asie.

F. D. Gt^e viij à 3ß en pilules ou dans une potion, dissoute avec le jaune d'œuf.

P. Emménagogue, diurétique.

Obs. Peu usitée, très-rare.

TÉRÉBENTHINE DE VENISE; suc du *Pinus Larix*, Monoéc. monadelph. Conif.

Obs. On l'employe quelquefois à la place de la térébenthine de Chio. Elle entre dans beaucoup d'onguens.

TERRE CIMOLÉE DES COUTELIERS.

Usitée à l'extérieur en épithème, comme tonique, résolutive, astringente.

— DU JAPON, *Voy.* CACHOU.

— FOLIÉE DE TARTRE, *Voy.* ACÉTATE DE POTASSE.

— FOLIÉE MERCURIELLE, *V.* ACÉTATE DE MERCURE.

THÉ, *Thea bocha*, *T. viridis*, Polyand. monogyn. Hespér. Asie. Amér. (Feuille.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau.

P. Diaphorétique, diurétique, stimulant du système nerveux.

THYM, *Thymus vulgaris*, Didynam. gymnosperm. Lab. Franc. (Sommités.)

F. D. Poudre, ʒj à ʒss. — Infus. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Alcool, ʒss à ʒj. — Huile essent. gttē ij à viij. — Extrait, ʒj à ʒss. — *A l'extér.* lotion, fomentation, vapeur, bain.

P. Stimulant, stomachique, carminatif.

THYMÉE, *Voy. GAROU.*

TILLEUL, *Tilia Europæa*, Polyand. monogyn. Tiliac. Franc. (Fleur.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv.

P. Calmant, antispasmodique.

TORMENTILLE, *Tormentilla erecta*, Icosand. polygyn. Rosac. France.

F. D. Poudre, ʒss à ʒj. — Décoct. ʒij à ʒj par ℥ij d'eau. — Suc, ʒss à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒss.

P. Astringente.

TORTUE. (Chair de)

F. D. Décoct. ℥ss à ℥j par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒij.

P. Adoucissante, pectorale.

TOXICODENDRON, *Rhus radicans*, *R. Toxicodendron*, Pentand. trigyn. Térébenth. Amériq. Franc. cult. (Feuille.)

F. D. Extrait, gr. x à ʒj, progressivement, ʒj, ʒij et même ʒj, ordinairement dans une tasse de lait de chèvre. (*Peyrilhe.*)

P. Tonique, antispasmodique.

Cas part. Paralysie, dartres.

Obs. Très-dangereux.

TRÈFLE d'eau, *Menyanthes trifoliata*, Pentand. monogyn. Gentian. Franc. (Racine, feuille.)

F. D. Racine, décoct. ʒij à ʒss par ℥ij d'eau. — Feuille, infus. ʒss à ʒj par ℥ij d'eau. — Extrait, ʒj à ʒj. — Suc, ʒij à ʒiij.

P. Tonique, fébrifuge, antiscorbutique.

TURBITH MINÉRAL, (Sulfate de mercure jaune, *Sous-deuto-sulfate de mercure.*)

F. D. Comme altérant, gr. ss à gr. j uni au camphre; comme émétique, gr. ij à vj.

P. Antisymphilitique, émétique, purgatif.

Obs. Peu usité ; il était particulièrement recommandé dans la rage.

TURBITH VÉGÉTAL, *Convolvulus Turpethum*, Pentand. monogyn. Convolvul. Inde. (Racine.)

F. D. Poudre, gr. x à ℥j et même ℥j. — Décoct. ℥j à ℥ij par ℔ij d'eau (par verres jusqu'à effet purgatif). — Résine, gr. iv à xviii. — *l'extér.* poudre, pinc. j comme sternutatoire.

P. Purgatif infidèle.

Obs. Peu usité.

TUSSILAGE, *Tussilago Farfara*, Syngén. polygam. superfl. Corymbif. Fran. (Plante entière, particulièrement la fleur.)

F. D. Racine, décoct. ℥j à ℥ij par ℔ij d'eau. — Fleur, Infusion, pinc. j à iij par ℔ij d'eau. — Sirop, ℥ij à ℥iij. — Feuille, Infusion, manip. j par ℔ij d'eau. — Suc, ℥ij à ℥iij. — *l'extér.* lotion, fomentation.

P. Adoucissant, pectoral.

Obs. On fume les feuilles desséchées en guise de tabac.

TUTHIE, (Cadmie des fourneaux.) C'est

un oxide formé de zinc , de cuivre et d'étain.

Usitée à l'extérieur en poudre dans les collyres secs. — Elle entre dans des onguens et des emplâtres , comme excitant.

V.

VALÉRIANE , *Valeriana officinalis* , Triand. monogyn. Dypsac. Franc. (Racine.)

F. D. Poudre , ʒß à ʒj et même ʒij. — Infusion ou décoction dans un vaisseau fermé , ʒij à ʒß par ℥ij d'eau. — Teinture , ʒß à ʒj. — Extrait , gr. xij à ʒß et même ʒj. — *A l'extér.* pinc. j comme sternutatoire.

P. Stimulante , tonique , antispasmodique.

Obs. On peut lui substituer la grande valériane (*Valeriana Phu*) , quoiqu'elle possède moins de vertus.

VANILLE ; *Epidendrum Vanilla* , Gynand. diand. Orchid. Indes. (Silique.)

F. D. Poudre, gr. vj à xij et ʒss. — Infus. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau.

P. Stimulante, stomachique.

Obs. Peu usitée ; elle entre dans la composition du chocolat.

VEAU. (chair, poumon de)

F. D. Chair, décoct. ℥ss par ℥ij d'eau. — Poumon, ℥ss par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒiij.

P. Délayant, adoucissant, pectoral.

VÉLAR, *Erysimum officinale*, Tétradyli. siliq. Crucif. Franc. (Herbe, graine.)

F. D. Herbe, poudre, ʒss à ʒj. — Infusion, manip. j par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒij à ʒiij. — Suc, ʒss à ʒij. — Graine, poudre, ʒj à ʒiij. — Décoct. ʒij à ʒss par ℥ij d'eau.

P. Herbe, Stimulante, pectorale ; graine antiscorbutique.

VERDET, *Voy.* ACÉTATE DE CUIVRE.

VERMICULAIRE BRULANTE, *Voy.* JOUE BARBE.

VÉRONIQUE, *Veronica officinalis* Diand. monogyn. Rhinant. Fran. (Feuille.

F. D. Poudre, ʒß à ʒj. — Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiv. — Sirop, ʒij à ʒij. — Extrait, ʒj à ʒj. — Conserve, ʒj à ʒij. — Suc, ʒj à ʒij. — *A l'extér.* vapeur, lotion, fomentation, bain.

P. Stimulante, tonique, astringente.

Obs. Peu usitée, quoique très-vantée par quelques auteurs.

VERVEINE, *Verbena officinalis*, Diand. monogyn. Pyrénac. Franc. (Sommités.)

F. D. Infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ʒij à ʒiij. — Suc, ʒj à ʒij. — *A l'extér.* en cataplasme, lotion, fomentation, bain.

P. Tonique, astringente, rubéfiante.

Obs. Peu usitée.

VIF ARGENT, *Voy.* MERCURE.

VIGNE, *Vitis vinifera*, Pentand. monogyn. Sarmentac. Franc. (Fruit desséché.)

F. D. Décoct. ʒj à ʒij par ℥ij d'eau.

P. Adoucissant, pectoral.

Obs. On emploie souvent les raisins de

Corinthe, fruits du *Vitis apyrena*. Pour les autres produits de la vigne, voyez vins, vinaigre.

VIGNE BLANCHE, *Voy.* BRYONNE.

— SAUVAGE, *Cissampelos Pareira* Dioéc. monadelph. Ménisper. Amérique (Racine.)

F. D. Poudre, ℥j à ʒ ss. — Décoct. ʒij à ʒiij par ℔ij d'eau. — Extrait, ℥j à ʒ ss.

P. Diurétique, fébrifuge.

VINS.

Vins sucrés amers. D'Alicante, du Cap de Madère, de Malaga, de Malvoisie.

P. Toniques, cordiaux.

— *acidules alcooliques.* De Bourgogne, de Champagne méridionale, de Mâcon, etc.

P. Toniques.

— *extracto-alcooliques.* De Bordeaux, de Pontac, de Roussillon.

P. Toniques, astringens.

— *acidules et peu alcooliques.* D'Arbois de Champagne, de l'Orléanais, de la

Moselle, du Rhin. On peut rapporter à ce genre presque tous les vins blancs.

P. Diurétiques, diaphorétiques.

Obs. Les vins servent de véhicule à beaucoup de médicamens.

VINAIGRE.

F. D. ℥ss à ℥ij par ℥ij d'eau miellée, et mieux jusqu'à acidité agréable (Oxycrat). — Sirop, ℥j à ℥iv. — *A l'extér.* dans les gargarismes, dans les lavemens, en fomentation, vapeur, etc.

P. Rafraîchissant, astringent, répercussif.

Obs. Très-usité; il entre dans beaucoup de composés officinaux et sert de véhicule à beaucoup de médicamens.

VIOLETTE, *Viola odorata*, Syngén. monogam. Cistoid. Franc. (Plante entière.)

F. D. Racine, poudre, gr. x à ℥j et même ℥ss. — Décoct. ℥j à ℥iij par ℥ij d'eau (par verres). — Graine, même dose. — Fleur, infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Eau distil. ℥ij à ℥iv. — Sirop, ℥ij à ℥ij. — Miel, ℥ij à ℥ij.

— *Feuille*, à l'extérieur en cataplasme, lotion, fomentation. — *Fleur*, vapeur, lotion, etc.

P. Racine, purgative, émétique; *graine* émétique, diurétique; *fleur*, adoucissante, pectorale, laxative; *feuille*, émolliente.

Obs. Elle est peu usitée comme émétique. On peut la remplacer par le *Viola Canina*.

VIOLETTE TRICOLORE, *Viola tricolor* (Plante entière.)

F. D. Racine, comme la précédente. — *Fleur*, infusion, pinc. ij à iij par ℥ij d'eau. — Sirop, ʒ ij à ʒ iij. — *Feuille*, suc, ʒ ss à ʒ ij.

P. Comme la précédente.

Cas part. Dartres.

VIPÈRE. (Chair de)

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ ij. — Décoct. ʒ ij à ʒ iij par ℥ij d'eau. On y joint ordinairement du veau ou du poulet. — Sirop, ʒ ij à ʒ j. — Vin ʒ iv à ʒ viij par jour.

P. Stimulante, analeptique, aphrodisiaque.

Obs. Elle entre dans beaucoup de composés officinaux.

VITRIOLS DE CUIVRE, DE FER OU DE MARS, DE ZINC, *Voy.* SULFATES.

Y.

YEBLE, *Voy.* HIÈBLE.

YEUX D'ÉCREVISSSES, *Voy.* ECREVISSSES.

YVETTE, *Voy.* IVETTE.

Z.

ZÉDOAIRE, *Kœmpferia rotunda*, Monand. monogyn. Drymyrrh. Inde. (Racine.)

F. D. Poudre, ʒ ss à ʒ j. — Teinture, ʒ ss à ʒ ij.
— Extrait, ʒ j à ʒ ss.

P. Stimulante, tonique, stomachique.

Obs. Peu usitée; elle entre dans beaucoup de composés officinaux.

ZINC, peu ou point usité à l'état métallique.

Oxide blanc de zinc, (Fleurs de zinc
Deutoxide de zinc.)

F. D. Gr. β , progressivement gr. xx et même
 β en pilules, dans une conserve ou un extrait.
— *A l'extér.* en liniment, $\mathfrak{z}\beta$ à $\mathfrak{z}j$ par $\mathfrak{z}j$ d'huile
récente de lin.

P. Antispasmodique.

Cas part. Epilepsie, chorée, coqueluche.

FIN DE LA 1^{re} SECTION DE LA II^e PARTIE

SECONDE PARTIE.

ABRÉGÉ

DE PHARMACOLOGIE.

DEUXIÈME SECTION.

DES MÉDICAMENS COMPOSÉS, OFFICINAUX ET MAGISTRAUX.

A.

ALCOOLS, *Voy.* les substances qui entrent dans leur composition, *Première section.*

ALOÈS VIOLAT. (*Officinal.*)

Dose. Gr. vj à ʒj.

Propriétés. Purgatif drastique.

Observation. Peu usité seul ; il n'entre guère que dans les pilules aloétiques émoullentes.

ALUN TEINT DE MYNSIGHT, OU PILULES D'ALUN D'HELVÉTIUS. (*Offic.*)

D. Gr. vj à ʒʒ.

P. Astringent, diurétique.

Cas particuliers. Hémorrhagies passives

APOZÈME ALTÉRANT COMMUN.

℥ Feuille de bourrache . . .	}	aa manip. j.
———— de buglose . . .		
———— de scolopendre, . .		
———— de chicorée . . .		

Faites bouillir légèrement, dans

Eau commune ℥iv

Passez avec expression ; laissez reposer ; décantez et ajoutez par chaque livre :

Sirop violat, de nénuphar ou d'orgeat, 3j

Faites-y dissoudre,

Nitrate de potasse, sulfate de magnésie ou de soude 3℥

D. ℥ iv à ℥ vj, 3 ou 4 fois le jour.

P. Diaphorétique, diurétique.

APOZÈME ANTISCORBUTIQUE.

℥ Racine de bardane . . .	}	aa 3 iij.
———— d'aunée.		

Eau commune ℥vj

Faites bouillir et réduire à ℥iv

Versez cette décoction sur

Racine de raifort.	}	aa ʒ ij.
Feuilles de cresson		
—— de beccabunga.		
—— de cochléaria		

Laissez infuser et refroidir dans un vase de terre bien fermé ; passez avec expression ; ajoutez à chaque ℥ ij.

Muriate d'ammoniaque. gr. xv

Sirop de limons. ʒ j à ʒ ij

D. ʒ iv à ʒ vj, plusieurs fois le jour.

APOZÈME FÉBRIFUGE. (*Lieutaud.*)

¼ Quinquina concassé ʒ j

Eau commune. ℥ iij

Faites bouillir et réduire à ℥ ij

Jetez la décoction sur

Fleurs de camomille. manip. ʒ

Sommités de germandrée. pinc. j

Laissez infuser ; passez et ajoutez

Sulfate de magnésie ou de soude. . . ʒ ij.

D. Par verres, pendant l'apyrexie.

APOZÈME FÉBRIFUGE PURGATIF.

¼ Quinquina concassé ʒ j

Séné. ʒ j

Sulfate de magnésie.	}	aa 3 6
—— de soude.		

Eau commune. ℥ ii

Faites bouillir et réduire à ℥ ij.

Passez et ajoutez

Sirop de pomme composé, 3 j

D. Par verres, d'heure en heure, pendant l'apyrexie.

B.

BAUME D'ACIER OU D'AIGUILLES. (*Offic.*)

A l'extérieur, Q. S. en friction.

P. Excitant. *Obs.* Abandonné.

BAUME ACOUSTIQUE. (*Offic.*)

D. Quelques gouttes sur du coton qu'on introduit dans les oreilles.

P. Tonique léger. *Obs.* Abandonné.

BAUME ANTI-APOPLECTIQUE. (*Offic.*)

D. Gr. ij à xvij. — *A l'extér.* on le fait respirer.

P. Stimulant, aphrodisiaque, excitant

Obs. Peu usité.

BAUME D'ARCÆUS. (*Offic.*)

P. *A l'extér.* excitant, résolutif.

Cas part. Ulcères atoniques, contusions.

BAUME DU COMMANDEUR. (*Offic.*)

D. Gt^{te} x à 3 β dans une potion. — *A l'extér.* friction, fomentation, injection.

P. Stomachique, carminatif, emménagogue, stimulant.

BAUME DE CONDOM OU DE LECTOURE.
(*Offic.*)

D. Gt^{te} j à v sur du sucre. — *A l'extér.* furation.

P. Stimulant, sudorifique, désinfectant.

Obs. Peu usité.

BAUME DE FIORAVENTI. (*Offic.*)

D. Gt^{te} iv à ∅ j dans une potion. — *A l'extér.* friction, fomentation.

P. Stomachique, excitant.

BAUME HYPNOTIQUE. (*Offic.*)

Obs. Peu usité, employé seulement à l'extérieur en friction aux narines, aux

tempes et aux poignets, comme calmant narcotique. Son emploi demande de la prudence.

BAUME DE JUDÉE, *Voy. TÉRÉBENTHINE DE LA MECQUE, Première sect.*

BAUME DE LUCATEL. (*Offic.*)

D. ʒj à ʒij ordinairement en pilules.
A l'extér. rarement employé.

P. Stimulant, astringent.

Cas part. Catarrhe pulmonaire chronique.

BAUME DE LA MECQUE, *Voy. TÉRÉBENTHINE DE LA MECQUE, Première sect.*

BAUME NERVAL. (*Offic.*)

A l'extér. en friction, comme excitant.

BAUME OPODELDOCH. (*Offic.*)

A l'extér. en friction comme excitant.

BAUME DE PAREIRA-BRAVA. (*Offic.*)

D. ʒj à ʒij.

P. Diurétique, aphrodisiaque.

Obs. Peu usité.

BAUME DU PÉROU, *Voy. Première sect.*

BAUME TRANQUILLE. (*Offic.*)

A l'extér. en friction, comme calmant.

Obs. Il est prudent de ne l'employer qu'en friction, quoiqu'on l'ait donné en lavement à la dose de ʒj à ʒij .

BAUME VERT DE METZ OU DE FEUILLET. (*Offic.*)

A l'extér. comme excitant, cathérétique.

Cas part. Ulcères atoniques et fongueux.

BAUME DE VIE. (*Hoffmann.*)

Huile essent. de lavande	}	$\overline{\text{aa}}$ ʒj
— de marjolaine.		
— de girofle.		
— de macis.		
— de canelle.		
— de citron.		
Huile essent. de rue.	}	$\overline{\text{aa}}$ gr. xij
— de succin.		
Alcool.		ʒx .

Mélez et faites digérer dans un matras, jusqu'à dissolution parfaite, en agitant de temps en temps; filtrez et conservez dans un flacon bien bouché.

D. Grte x à ʒss . — *A l'extér.* en friction.

P. Sudorifique, excitant.

Cas part. Colique, dysenterie chronique.

BAUME DE VIE DE LE LIÈVRE, OU ELIXIR
DE SPINA. (*Offic.*)

D. Cochl. j à iij par jour. — *A l'extér.*
épithème.

P. Stomachique, vermifuge, purgatif.

BAUME DE VINCEGUÈRE, *Voy.* B.
CONDOM.

BAUME VULNÉRAIRE (*Offic.*)

A l'extér. en fomentation, comme résolutif.
Obs. Peu usité.

BAUME UNIVERSEL, *Voy.* BAUME
COMMANDEUR.

BIÈRE DE QUINQUINA, DITE PROPHYL-
TIQUE. (*Mutis.*)

℥ Quinquina rouge	}	aa
— gris.		
— jaune.		
Cannelle.	}	aa.
Muscade.		

Bière. ℞xxiv

Sucre. ℞ij.

D. 2 à 3 verres par jour.

P. Tonique, fébrifuge.

BIÈRE SAPINETTE.

24 Feuilles de cochléaria 3j à 3ij

Racine de raifort. 3ij

Bourgeons de sapin. 3j

Bière ordinaire. ℞iv.

Faites macérer, pendant 3 ou 4 jours, dans un vase bien bouché ; passez.

D. 3 iv, 2 ou 3 fois le jour.

P. Tonique, antiscorbutique.

BIÈRE STOMACHIQUE.

24 Racine de raifort	}	aa 3j
Feuilles de cochléaria.		
— de cresson.		
— de beccabunga		

Bière ordinaire. ℞ij

Laissez macérer, pendant 24 heures, dans un vase bien bouché ; passez.

D. 2 à 3 verres par jour.

P. Stimulante, antiscorbutique.

BISCUITS PURGATIFS.

℥ Jalap en poudre	3 6
Sucre	℥ 6
Farine.	3
OEufs.	n ^o xij

Faites 30 biscuits, qui contiennent chacun neuf grains et demi de jalap.

D. n^o j à n^o ij.

Obs. Usités pour purger les enfans.

BISCUITS VERMIFUGES.

℥ Semen-contrà en poudre	3
Sucre en poudre.	3 ii
Farine.	3
OEufs.	n ^o ii

Huile essent. d'anis ou de citron, g^{tte} viij.

Faites 12 biscuits, qui contiennent chacun six grains de semen-contrà.

D. Un le matin, un le soir, aux enfans.

BLANC-MANGER.

℥ Gelée de corne de cerf	3 vi
Sucre.	3
Amandes douces écorchées.	3
Eau de fleurs d'oranger.	3

Huile essent. de citron g^{tte} iv

Zeste de citrons récents. 3℔.

F. S. L. Une gelée à prendre par cuillerées.

P. Analeptique.

Cas part. Convalescences.

BOIS SUDORIFIQUES, *Voy.* GAYAC, SALSEPAREILLE, SQUINE, SASSAFRAS, 1^{ere} sect.

BOISSON ANTIPHLOGISTIQUE. (*Stoll.*)

℥ Décoction d'orge mondé ℔ ij

Sirop de vinaigre. 3 ij.

D. Une tasse toutes les heures.

P. Délayante, rafraîchissante.

BOISSON EMMÉNAGOGUE.

℥ Limaille de fer 3 ℔

Quinquina jaune pulvérisé. 3 ij

Vin rouge ou eau commune. ℔ ij.

Laissez infuser pendant 12 heures; passez.

D. Par cuillerée d'heure en heure.

BOISSON SUDORIFIQUE.

℥ Gayac rapé	}	aa 3j
Salsepareille.		
Squine.		

Réglisse effilée. 3 6

Eau commune. ℞ ij.

Faites bouillir pendant une demi-heure, ensuite ajoutez

Semences de fenouil. 3 j.

D. 2 ou 3 tasses dans la journée.

BOL ANTI-ASTHMATIQUE.

℞ Soufre sublimé et lavé 3 ii j

Acide benzoïque 3 v

— succinique. 3 ij

Gomme ammoniac. 3 6

Conserve d'aunée, Q. S.

F. S. L. 36 bols.

D. N° ij dans la journée.

BOL CONTRE LA CHLOROSE.

℞ Oxyde de fer noir }
Safran en poudre. } aa gr. vj.

Rhubarbe pulvérisée. }
Sulfate de potasse. } aa 3 j

Sirop d'absinthe, Q. S.

F. S. L. Un bol qu'on partagera en deux prises. Il faut en continuer l'usage pendant plusieurs jours.

BOL CONTRE LA FIÈVRE QUARTE.

- Quinquina en poudre 3j
 Muriate d'ammoniaque. 3ij
 Hiéra-picra ou sirop de gentiane, Q. S.
 F. S. L. 12 bols.
 D. Deux par jour, un le matin, l'autre le soir.

BOL CONTRE LES MALADIES DE LA PEAU.

- Soufre sublimé et lavé gr. x
 Muriate de mercure doux. }
 Extrait de fumeterre. } aa gr. vj
 Sirop de fumeterre, Q. S.
 F. S. L. Un bol à prendre le matin. Il faut
 continuer l'usage pendant long-temps.
Cas part. Gale, dartres.

BOL FÉBRIFUGE.

- Quinquina en poudre 3ij
 Nitrate de potasse. 3ij
 Sirop d'absinthe, Q. S.
 F. S. L. Trente-deux bols.
 D. Deux par jour, un matin et soir.

BOL EMMÉNAGOGUE.

- Aloès succotrin gr. viij
 Safran de Gatinais gr. iv
 Huile de Sabine. gttc ij

Sirop d'absinthe, Q. S.

F. S. L. Un bol, à prendre en une ou deux fois.

BOL FORTIFIANT.

℥ Poudre de serpentaire de Virginie	}	aa 35
——— de contrayerva.		

Acide succinique. gr. 20

Sirop de fleurs d'oranger, Q. S.

Faites deux bols, à prendre en deux fois.

BOL PURGATIF. (D^r Alibert.)

℥ Rhubarbe pulvérisée.	}	aa 2
Jalap pulvérisé		
Tartrate acidule de potasse.		

Faites des pilules de quatre grains.

D. 2 toutes les heures, jusqu'à effet purgatif.

BOL STOMACHIQUE. (Desbois.)

℥ Poudre de gentiane.	}	aa gr.
——— de zédoaire.		
——— de safran		

Baume de Copahu.

Elixir de propriété. gttē

Sirop de Menthe, Q. S.

F. S. L. 24 bols.

D. Six par jour, en 3 fois.

BOUILLON AMER.

℥ Rouelle de veau	℔ ℥
Quinquina concassé.	3 ij
Feuilles de fumeterre	} aa manip. j
Sommités de petite centauree	
Eau commune.	℔ iij.

F. S. L. Un bouillon; passez.

D. 2 ou 3 tasses par jour, pendant l'apyrexie.

P. Fébrifuge.

BOUILLON PECTORAL.

℥ Mou de veau	} aa ℔ ℥
Chou rouge	
Feuilles de pulmonaire.	manip. j
Eau commune.	℔ iij.

F. S. L. Un bouillon; passez; ajoutez par chaque tasse une cuillerée de sirop de gomme.

D. Une tasse matin et soir.

C.

CACHOU A L'AMBRE GRIS, A LA VIOLETTE,
A LA FLEUR D'ORANGER, A LA CANELLE, A
LA RÉGLISSE, etc.

D. Gr. iv à 3 ℥.

P. Stomachique, astringent.

CATAPLASME ANODIN.

℥ Mie de pain blanc 3 lb

Lait de vache lb 16

Faites cuire jusqu'à consistance de cataplasme et ajoutez

Jaune d'œuf n° 11

Safran pulvérisé 3

On y joint souvent

Baume tranquille. 3

Opium ou laudanum. 3 lb

CATAPLASME ÉMOLLIENT.

℥ Farine récente de graine de lin, Q. V.

Décoction de racine de guimauve, Q. S.

Faites cuire jusqu'à consistance de cataplasme.

Obs. Si l'on veut rendre ce cataplasme résolutif, on y ajoute quelques gouttes d'acétate de plomb.

CATAPLASME MATURATIF.

℥ Feuilles d'oseille } aa manip

——— de poirée. }

Oignon de lis n° 11

Mêlez ; faites cuire sous la cendre chaude pilez dans un mortier ; ajoutez ensuite

Onguent basilicum 3

Obs. On peut substituer au basilicum, le vieux levain, la vieille graisse ou l'onguent de la mère.

CATHOLICUM DOUBLE. (*Offic.*)

D. ʒ ij à ʒ ij; rarement seul.

P. Purgatif.

CÉRAT ORDINAIRE OU DE GALIEN. (*Offic.*)

Obs. Employé dans le pansement des plaies et des ulcères, comme adoucissant.

CÉRAT SATURNÉ OU DE GOULARD. (*Offic.*)

℥ Cérat ordinaire	ʒ j
Acétate de plomb.	ʒ j à ʒ ij
Mélez.	

P. Résolutif, répercussif.

Obs. Son emploi demande de la prudence.

CÉRAT SOUFRÉ.

℥ Cérat ordinaire	℔ j
Soufre sublimé	ʒ iv
Huile essent. de citron.	ʒ j à ʒ ʒ
Mélez.	

P. Antiherpétique, antipsorique.

COLLIER CONTRE LE GOÎTRE. (*Mérand*)

℥ Muriate d'ammoniaque . . .	} aa parties égales.
———— de soude décrépitée	
Eponge calcinée et non lavée	

F. S. L. Une poudre.

On fait un collier de taffetas noir, on pose dessus une carde de coton, on y étend la poudre ci-dessus. On recouvre le tout d'une mousseline claire qu'on pique en carrés ou en losanges.

Ce collier s'applique du côté de la mousseline sur la tumeur; il est gardé jour et nuit. On a soin de renouveler la poudre tous les mois.

COLLYRE ÉMOLLIENT.

℥ Eau distil. de roses . . .	} aa 3 ii
———— de plantain . . .	

Faites y infuser

Graine de psyllium ou de lin. . . . pinc.

Passez.

Si on veut le rendre anodin, ajoutez

Safran en poudre. gr. x à xi

COLLYRE DE LANFRANC.

℥ Vin blanc it

Eau distil. de plantain.	}	aa 3 ij
— de roses.		
Sulfure jaune d'arsenic		3 ij
Oxide vert de cuivre.		3 j
Myrrhe	}	aa 3 ij.
Aloès		

Triturez dans un mortier les substances sèches, délayez-les avec le vin blanc et ajoutez les eaux distillées.

Ce mélange, appelé improprement collyre, ne sert qu'à toucher les ulcères vénériens de la bouche et des autres parties du corps. Pour s'en servir on en imbibe un tampon de linge fixé au bout d'un petit bâton.

P. Excitant, cathérétique.

COLLYRE SEC. (*D^r Lagneau.*)

1/2 Sucre candi.	}	aa 3 ij.
Tuthie ou nitrate de potasse.		

Réduisez en poudre très-fine.

Soufflez-le dans l'œil au moyen d'un tuyau de plume.

Cas part. Taches de la cornée transparente.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

℥ Infusion de mélilot	3 xij
Acétate de plomb.	3 6j

CONFECTION ALKERMÈS. (*Offic.*)

D. 3j à 3j.

P. Tonique, stomachique.

CONFECTION HAMECH. (*Offic.*)

D. 3j à 3vj.

P. Purgatif drastique; peu usitée.

CONFECTION D'HYACINTHE. (*Offic.*)

D. Comme la précédente.

P. Stomachique, sudorifique, astringente.

CRÈME PECTORALE. (*D^r Alibert.*)

℥ Sucre blanc	}	aa 3j
Sirop de baume de Tolu.		
— de capillaire de Canada		

Eau, Q. S. pour donner au mélange la consistance de la crème.

CRÈME PECTORALE. (*Tronchin.*)

℥ Beurre de cacao	3i
Sucre blanc.	3i

Sirop de baume de Tolu . . .	}	aa 3j.
— de capillaire.		

Mêlez exactement.

D. Ces deux crèmes se prennent par petites cuillerées.

CRÈME DE PAIN.

℥ Pain très-blanc	3iv
Eau commune.	℔ij.

Faites cuire pendant une heure ; brisez ; passez et ajoutez

Sucre en poudre	3j
Eau de fleurs d'oranger.	3ij.

On peut y joindre quelques grains de canelle pulvérisée.

Us part. Maladies aiguës dans lesquelles il convient de donner un peu de nourriture ; convalescences.

D.

DÉCOCTION AMÈRE.

℥ Racine de gentiane.	}	aa 3℔
Ecorce d'orange amère		
Sommités d'absinthe	}	aa manip. j
— de mille-feuille.		
— de chardon-bénit.		

Vin.	}	aa lb
Eau de fontaine.		

Faites bouillir pendant une demi-heure

passez.

D. 3 à 4 tasses par jour.

P. Tonique, fébrifuge, vermifuge.

DÉCOCTION BLANCHE. (*Sydenham.*)

℥ Carbonate de chaux	}	aa 3
Mie de pain blanc.		
Eau commune.		lb

Faites bouillir et réduire à deux livres

passez et ajoutez

Sucre blanc. 3i

Aromatisez avec eau distil. de fleurs d'orange,
ger, de menthe ou de canelle . . . 3i

Obs. Au lieu de mie de pain, on emploie quelquefois la gomme arabique; au lieu de carbonate de chaux, on se sert de la corne de cerf calcinée.

D. 2 à 4 tasses par jour.

Cas part. Dysenterie chronique; suites des empoisonnemens.

DÉCOCTION DIURÉTIQUE.

℥ Racine de persil.	}	aa 3 ℥
—— d'asperge		
Feuilles de pariétaire		
Eau commune.		℔iv.
Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié ; mettez à infuser		
Semences de carotte.		3 iij.
Passez et ajoutez		
Nitrate de potasse.		3j.
D. 2 à 5 tasses par jour.		

DÉCOCTION DE POLYGALA. (*Peyrilhe.*)

℥ Racine de polygala amer.	℥ iij
Eau commune.	℔ iij.
Faites réduire par l'ébullition, à ℔ j ℥.	
Ajoutez	
Sirop d'hysope	} aa 3j.
— de pavot blanc	
D. 3 iv matin et soir, pendant 1, 2 ou 3 mois.	

Cas part. Catarrhe pulmonaire chronique.

Obs. Pour boisson ordinaire, décoction de polygala coupée avec partie égale de lait.

DÉCOCTION PURGATIVE.

℥ Pulpe de tamarin.	3℔
Phosphate de soude.	3℔
Eau commune.	℔ij
Faites bouillir pendant un quart d'heure	
ensuite faites infuser	
Séné	3℔

Passez et ajoutez

Sirop de violettes.	3j à 3℔
Eau distillée de canelle.	3℔

D. Par verres de demi-heure en demi-heure
jusqu'à effet purgatif.

DÉCOCTION TONIQUE, FÉBRIFUGE.

℥ Quinquina concassé.	
Carbonate de potasse.	gr. xij à 3℔
Eau commune.	℔ij
Faites bouillir et réduire à ℔ij.	

D. 3 à 4 tasses par jour, durant l'apyrexie.

DIAPHÉNIX. (*Electuaire offic.*)

D. 3ij à 3℔. — En lavement, 3j à 3ij.

P. Purgatif, drastique.

DIAPRUN SIMPLE. (*Offic.*)

D. 3℔ à 3j℔. — Lavement, double dose.

DIAPRUN SOLUTIF. (*Offic.*)

D. ʒj à ʒvj.

P. Ces deux électuaires sont purgatifs.

DIASCORDIUM. (*Electuaire offic.*)

D. ʒβ à ʒj.

P. Tonique, astringent.

Cas part. Diarrhée chronique.

DRAGÉES ANTISYPHILITIQUES. (*Keyser.*)

℥ Acétate de mercure	ʒ ij
Sucre blanc.	ʒ vj
Gomme arabique	ʒ j
Guimauve en poudre	} aa ʒ β.
Amidon	
Mucilage de gomme arabique, Q. S.	

Faites des pilules d'un grain; roulez-les dans du sucre.

D. N^o ij à n^o iv par jour.

Obs. Peu usitées.

DRAGÉES VERMIFUGES.

℥ Muriate de mercure doux.	ʒ β
Sucre blanc	ʒ j
Amidon.	ʒ β

Mucilage de gomme adragant , Q. S.

Faites 144 pilules.

D. Une matin et soir.

E.

EAU ANTI-OPHTHALMIQUE.

℥ Alun. 3j

Eau commune. 3vj

Faites dissoudre et ajoutez

Eau-de-vie 3j

Cas part. Ophthalmie chronique.

EAU D'ARQUEBUSADE. (*Offic.*)

D. 3ij à 3j. — *A l'extér.* en lotion, fomentation.

P. Stimulante, résolutive.

Obs. Il existe trois préparations de cette eau qu'on appelle aussi *Vulnéraire*; elle ne diffèrent que par le véhicule qui est l'alcool, le vin ou l'eau.

EAUX D'ARDEL, DE COLOGNE, DE MÉLISSA
COMPOSÉE OU DES CARMES, DE MENTHA
COMPOSÉE, DE MIEL COMPOSÉE. (*Offic.*)

D. 3j à 3ß dans une tasse d'eau ou d'infusion.

aromatique. — *A l'extér.* lotion, fomentation.

P. Stimulantes, antispasmodiques, excitantes.

Obs. L'eau de *Cologne* est principalement usitée pour l'agrément. Il en est de même de l'eau de *Bouquet*.

EAU BLANCHE, VÉGÉTO-MINÉRALE, DE GOULARD OU DE SATURNE.

Acétate de plomb 3ij à 3j

Eau commune. 1b ij

A l'extér. injection, lotion, fomentation.

P. Sédatif, répercussif.

EAU ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE. (*Offic.*)

D. Cochl. j à ij, seule ou dans une potion.

P. Stimulante, antispasmodique.

Obs. Cette eau est de la composition de M. Planche, pharmacien.

EAU DE GONDRAN.

℥ Acide muriatique. 3iv

Pétrole blanc 3j

Mélez en agitant la bouteille.

P. Rubéfiante.

F. D. A l'extér. en bain local à la dose de 3j à 3ij par lbij d'eau dans le rhumatisme chronique.

EAU IMPÉRIALE. (*Offic.*)

D. 3j à 3ß dans une tasse de tisane diurétique.

P. Stimulante, diurétique.

EAU DE LUCE. (*Offic.*)

D. Gtte x à 3ß par lbij de tisane ou dans une potion. — *A l'extér.* en vapeur, en liniment mêlée avec l'huile; pure.

P. Diaphorétique, excitante, rubéfiante.

Cas part. Voy. AMMONIAQUE, 1^{re} sect.

EAU MERCURIELLE, Voy. NITRATE DE MERCURE, première sect.

EAU PHAGÉDÉNIQUE, Voy. MURIATE DE MERCURE SUR-OXIDÉ, première sect.

EAU DE QUERCÉTAN.

℥ Suc de poireau	}	℥ lbij
— d'ognon.		
— de raifort		

Suc de pariétaire	}	aa 3 viij
— de citron		

Mélez, faites digérer pendant plusieurs jours et distillez à feu doux.

D. 3j à 3ij.

Cas part. Affections chroniques des voies urinaires.

EAU DE RABEL, *Voy.* ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ, *première sect.*

EAU DE LA REINE DE HONGRIE, *Voy.* ROMARIN (ALCOOL DE), *première sect.*

EAU THÉRIACALE. (*Offic.*)

D. 3j à 3ß dans une tasse de tisane.

P. Stomachique, sudorifique.

EAU DE TREVEZ, dite FONDANTE.

℥ Sulfate de soude	3j
Tartrate de potasse antimonié . . .	gr. ß
Nitrate de potasse	gr. xij
Eau commune	℔ ij

Faites dissoudre.

A prendre par verres, d'heure en heure.

P. Purgative.

EAU DES TROIS NOIX, *Voy. NOYER, première sect.*

EAU DE LA VRILLIÈRE.

24 Cannelle	3 ij.
Girofles.	3 vj.
Cresson de fontaine	3 vj.
Ecorce récente de citron	3 jβ.
Roses rouges séchées.	3 j.
Cochléaria	℥ss.
Alcool.	℥iij.

Concassez la cannelle et les girofles, coupez les roses et les écorces de citron, écrasez le cresson et le cochléaria; mêlez; faites digérer pendant 24 heures dans l'alcool, et ensuite distillez au bain-marie.

D. Cochl. j pure ou dans un verre d'eau. On s'en gargarise la bouche et l'on en frictionne les dents et les gencives.

P. Tonique, astringent, antiscorbutique.

Obs. Il en est de même de l'élixir odontalgique de *Le Roy de la Faudignère*, de celui de l'abbé *Ancelot*, de l'eau dite de *Stahl*, dont on fait usage à la dose d'une cuillerée à café dans un verre d'eau.

EAU VULNÉRAIRE, *Voy.* EAU D'ARQUE-
BUSADE.

EAU-DE-VIE ALLEMANDE. (*Offic.*)

D. 3 ij à 3 ij.

P. Purgatif drastique.

Cas part. Hydropisies passives, affec-
tions comateuses.

ELECTUAIRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (*D^r*
Mead.)

℥ Quinquina en poudre	3j
Etain pulvérisé	} aa 3℥
Racine de valériane pulvérisée	
Sirop de sucre, Q. S.	

D. 3j à 3j soir et matin pendant 3 mois.
Il faut en interrompre l'usage tous les 10 jours
pendant 24 heures.

ELECTUAIRE ASTRINGENT BALSAMIQUE.
(*Barthez.*)

℥ Conserve de roses.	3iv
Sirop de Tolu.	3j
— de pavot	3ij

Mélez, faites un électuaire.

D. Cochl. iv à vj par jour.

Cas part. Hémoptysie passive, diarrhée chronique.

ELECTUAIRE ASTRINGENT.

℥ Oxide de fer noir	}	aa 3j
Alun pulvérisé		
Quinquina en poudre	}	aa 3j
Conserve de roses		
Sirop d'écorce d'orange, Q. S.		

D. 3 fois par jour, gros comme une noix muscade.

Cas part. Dysenterie chronique, blennorrhée.

ELECTUAIRE DE BAIES DE LAURIER. (*Offic.*)

D. ʒj à 3ij.

P. Carminatif, diurétique, emménagogue.

Obs. Peu usité.

ELECTUAIRE BÉNÉDICTE LAXATIF. (*Offic.*)

D. ʒj à 3j. — Lavement, même dose.

P. Purgatif; peu usité.

ELECTUAIRE CARIOCOSTIN. (*Offic.*)

D. 3j à 3vj.

P. Purgatif.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE.

℥ Quinquina en poudre	3j
Camomille en poudre	} aa 3iij
Muriate d'ammoniaque pulvérisé	
Sirop de fleurs d'oranger , Q. S.	
Faites un électuaire.	

D. 3ij à 3ß par jour en plusieurs prises.

ELECTUAIRE HIÉRA-DIACOLOCYNTHIDOS.

(*Offic.*)

D. 3ß à 3ß et rarement 3j.

P. Purgatif violent ; abandonné.

ELECTUAIRE HIÉRA-PICRA. (*Offic.*)

D. 3j à 3vj.

P. Purgatif drastique.

ELECTUAIRE HYDRAGOGUE. (D^r Fou-
quier.)

℥ Scammonée d'Alep.	} aa 3ij
Jalap pulvérisé	
Scille en poudre	3jß
Résine de jalap	3ß
Sirop de Nerprun , Q. S.	
Faites un électuaire.	
D. Gr. xij à 3j roulés en bols.	

P. Purgatif fort.

Cas part. Hydropisies passives.

ELECTUAIRE DE PSYLLIUM. (*Offic.*)

D. 3j à 3vj.

P. Purgatif ; abandonné.

ELIXIR ALKERMÈS DES ITALIENS.

℥ Noix muscade	}	aa 3j
Girofle.		
Cannelle		
Macis		

Concassez et faites macérer pendant 8 jours dans

Alcool ℔iv.

Faites fondre ensuite sucre blanc . ℔ij

Dans eau commune. ℔iv.

Mêlez et colorez avec le sirop alkermès ou avec

Alun gr. iv

Cochenille 3℔.

Filtrez et mettez dans des bouteilles.

D. Un petit verre le matin.

P. Stimulant , stomachique , carminatif.

ELIXIR ANTI-ASTHMATIQUE. (*Boerrhaave.*)

℥ Racine d'asarum	gr. xviii
——— de calamus aromaticus	} aa 3j
——— d'énula campana	
——— de réglisse.	
Semences d'anis	3j β
Camphre.	gr. vj
Concassez et faites macérer pendant 4 à 5	

jours dans

Alcool 3 xviii

Passez avec expression, filtrez et mettez dans
une bouteille bien bouchée.

D. Gtte ij à xxx dans une tasse d'infusion
aromatique.

ELIXIR ANTISCORBUTIQUE. (*Du même.*)

Semences de moutarde	} aa 3j
——— de raifort	
——— de roquette	
——— d'érysimum.	
——— de cresson	
Feuilles de cochléaria.	} aa manip.
——— de passe-rage.	
——— de raifort	

Pilez dans un mortier de bois , et ajoutez
 Sommités de houblon 3j
 Alcool Hvi

Distillez.

D. 3j à 3ij dans une tasse de tisane ou dans
 une potion.

ELIXIR ANTISCROPHULEUX (*Peyrilhe.*)

℥ Racine de gentiane.
 Carbonate de potasse concret } 3j, 3jss à 3iij
 Eau-de-vie vieille. 3xxx

Faites macérer pendant 4 ou 5 jours ; passez.

D. Une cuillerée à bouche avant le déjeuner,
 le dîner et le souper.

Obs. Pour les enfans , au lieu d'eau-de-vie,
 on se sert de vin de *Madère*.

ELIXIR AMÉRICAIN DE COURCELLES. (*Offic.*)

D. Une cuillerée à café 2 ou 3 fois le jour.

P. Stimulant, diurétique, astringent, etc.

Obs. Peu usité en France ; c'est un de
 ces remèdes qu'on applique à toutes les
 affections.

ELIXIR CORROBORANT. (*M. Hébert* ,
pharmacien , à Paris.)

℥ Extrait de quinquina jaune, préparé avec
 l'alcool faible. ℥vj

Extrait de cachou. ℥iv

Rhubarbe de Chine ℥jβ

Cannelle de Ceylan }
 Anis étoilé } aa ℥jβ

Alcool à 18 degrés lbxvj

Sucre blanc lbiv

On concasse ce qui doit l'être ; on fait macérer le tout pendant 10 jours , excepté le sucre qu'on ne met que vers la fin , et l'on filtre.

D. Cochl. j à ij , 3 fois par jour.

ELIXIR DE GARUS. (*Offic.*)

D. ℥j à ℥β.

P. Stimulant, stomachique.

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ OU DE PARACELSE.
 (*Offic.*)

D. Gtte iv à xxx dans une tasse de boisson appropriée.

P. Stomachique, diaphorétique, emménagogue.

ELIXIR SACRÉ. (*M. Cadet de Gassicourt.*)

℥ Rhubarbe concassée.	3 iij
Aloès succotrin pulvérisé	3 v
Semences de petit cardamome.	3 iij
Eau-de-vie	℔ iij

Laissez infuser pendant 2 ou 3 jours, passez.

D. ʒj à ʒjss.

P. Purgatif tonique.

ELIXIR DE SPINA, *Voy.* BAUME DE LONGUE VIE.ELIXIR DE STOUGHTON. (*Offic.*)

D. G^{tte} xij à ʒss dans une tasse d'infusion aromatique.

P. Stomachique, vermifuge.

ELIXIR THÉRIACAL. (*Offic.*)

D. G^{tte} vj à ʒj dans une tasse de vin ou dans une potion cordiale.

P. Stimulant, sudorifique

ELIXIR DE VIE DE MATHIOLE. (*Offic.*)

D. ʒss à ʒss. — *A l'extér.* en friction. On le fait aussi respirer.

P. Cordial, stimulant.

ELIXIR VISCÉRAL TEMPÉRANT. (*Hoffmann.*)

D. 3 ℥ à 3 ij dans une tasse de boisson.

P. Stomachique, vermifuge, fébrifuge.

Obs. Il porte aussi le nom de *Vin amer alcalisé.*

ELIXIR DE VITRIOL DE MYNSIGHT (*Offic.*)

D. G^{te} ij à 3 ℥ dans une ou plusieurs tasses de boisson.

P. Stimulant, stomachique.

EMBROCATION SIMPLE. (*de la Faye.*)

℥ Huile rosat	} $\frac{1}{2}$ lb
—— d'hypéricum.	
Eau-de-vie	

aa parties égales.

On y ajoute souvent jaune d'œuf, Q. S.

EMBROCATIOM RÉSOLUTIVE. (*Du même.*)

℥ Savon blanc	Q. V.
Eau-de-vie	Q. S.

Faites dissoudre.

EMPLATRES.

Les plus employés sont ceux d'André de la Croix, de cigüe, de céruse, de diachylum, de

diapalme, de minium, de Nuremberg, de savon
de Vigo simple, de Vigo *cum mercurio*, etc.

P. Résolutifs.

Cas part. Engorgemens glanduleux.

EMULSION ASTRINGENTE. (*Cadet.*)

℥ Baume de Copahu.	}	aa 3i
Sirop de Tolu		
Eau de roses		3iiv
Gomme arabique		3i
Acide nitrique alcoolisé		3i
F. S. L. Une émulsion.		

D. En deux prises matin et soir, pendant
5 à 6 jours.

Cas part. Gonorrhée chronique.

EMULSION CAMPHRÉE.

℥ Amandes douces	3i
Camphre.	gr. x à 3i
Sucre.	3iv à 3vj
Eau commune	3vj

Faites d'abord l'émulsion, ensuite triturez
le camphre avec le sucre, mêlez peu à peu.

D. Par cuillerées.

P. Antispasmodique, calmante.

EMULSION PURGATIVE.

Scammonée ou résine de jalap . . . gr. viij

Dissolvez dans jaune d'œuf, Q. S.

Ajoutez

Lait d'amandes ℥iv

Sirop de guimauve ℥j

Eau de fleurs d'oranger ℥j à 5ij

Obs. Purgatif agréable.

EMULSION SIMPLE.

Semences froides majeures. ℥β

Amandes douces ℥j

Amandes amères n^o ij

Eau commune lbv

F. S. L. Une émulsion; ajoutez par chaque
ux livres.

Sirop de nénuphar ℥jβ

Eau de fleurs d'oranger. 3ij

P. Délayante, rafraîchissante.

Obs. On peut, si on le juge à propos,
remplacer les semences froides par une
ce d'amandes douces. Si l'on veut rendre
ette boisson diurétique, on ajoute un
mi-gros de nitrate de potasse par chaque
ux livres.

EPONGES PRÉPARÉES. (*Offic.*)

Obs. Employées à l'extérieur pour maintenir ou agrandir l'ouverture d'un abcès ou d'un trajet fistuleux.

ESPÈCES PECTORALES. (*Offic.*) *Voy. première sect.* CAPILLAIRE, GUIMAUNE, TUSSILAGE, SCOLOPENDRE, etc.

ESPÈCES TONIQUES. (*Offic.*) *Voy. première sect.* MÉLISSE, MÉLILOT, BÉTOINE, PATIENCE, BARDANE, etc.

ESPÈCES VERMIFUGES. (*Offic.*) *Voy. première sect.* ABSINTHE, TANAISIE, CROMMILLE, GRATIOLE, etc.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (*Offic.*) *Voy. première sect.* VÉRONIQUE, MILLE-PERTUIS, PERVENCHE, LIERRE TERRESTRE, CHENOPON-BÉNIT, AIGREMOINE, etc.

ESPRITS, *Voy.* ALCOOLS, *première sect.*
En cherchant les substances qui entrent dans leur composition.

ESPRIT DE SEL AMMONIAC SUCCINÉ. *Voy.*
EAU DE LUCE.

ESPRIT VOLATIL, HUILEUX ET AROMATIQUE DE SYLVIUS. (*Offic.*)

D. G^{tte} iv à xxx dans une potion.

P. Stimulant, sudorifique, emménagogue.

Obs. Peu usité.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE DE STAHL.

— Racine d'impératoire.	}	aa 3ß
— de carline.		
— d'angélique		
— de pimprenelle		
— d'asclépias	}	aa 3j
— d'aunée.		
— de dictame.		
— de contrayerva		
— de valériane		

Alcool Q. S.

D. G^{tte} xx à xl dans une potion ou tisane appropriée.

P. Stimulante, sudorifique.

ESSENCE CARMINATIVE DE WEDELIUS. (*Offic.*)

D. 3j à 3j dans une potion.

P. Stomachique, carminative, emménagogue.

Obs. Peu usitée.

ESSENCE CÉPHALIQUE OU BONFERMIÈRE
(*Offic.*)

Obs. On en introduit quelques gouttes dans les fosses nasales, en la faisant respirer fortement, dans les cas de céphalalgie ou de chutes sur la tête; elle agit comme stimulante de la membrane pituitaire.

ESSENCE VULNÉRAIRE, *Voy.* EAU D'ARQUEBUSADE.

ETHER ACÉTIQUE FERRÉ. (*M. Klaproth.*)

℥ Acétate de fer liquide	3	
Ether acétique.	}	aa
Alcool		

Mélez.

D. Gtte xij à XL.

P. Stimulant, antispasmodique.

ETHER BALSAMIQUE DE TOLU.

℥ Baume de Tolu en poudre.	2
Ether sulfurique rectifié.	

Faites macérer pendant 2 ou 3 jours dans un flacon bouché à l'émeri, agitez souvent jusqu'à dissolution.

Obs. On le fait respirer, comme excitant de la membrane bronchique, dans les catarrhes pulmonaires chroniques avec toux et expectoration abondante.

ETHER DE DIGITALE POURPRÉE.

℥ Feuilles sèches de digitale pourprée	3j
Ether sulfurique	3j

Faites macérer pendant 24 heures dans un flacon bien bouché; filtrez promptement.

D. Gt^{te} x à ʒj sur du sucre ou dans une potion.

P. Diurétique, sédatif des mouvemens du système sanguin.

ETHER PHOSPHORÉ.

℥ Phosphore en petits fragmens. . . gr. viij	
Ether sulfurique	3j

Mettez d'abord l'éther dans un flacon bouché à l'émeri, ajoutez ensuite le phosphore et bouchez aussitôt; agitez souvent jusqu'à solution parfaite.

D. Quelques gouttes sur du sucre.

P. Excitant, stimulant.

EXTRAITS SIMPLES. *Voy.* Les substances qui les fournissent, *première sect.*

EXTRAIT DE RUDIUS. (*Offic.*)

D. En pilules, gr. x à 3 ss.

P. Purgatif drastique.

Cas part. Hydropisies passives, affections comateuses.

Obs. Peu usité.

F.

FARINES RÉSOLUTIVES. Ce sont celles d'orge, de fèves, d'orobe, de lupin; on y joint celles de froment, de lentilles, de lin et de fénugrec.

D. En cataplasme, Q. S.

FLEURS CARMINATIVES. *Voy. prem. sect.*
CAMOMILLE, MÉLILOT, MATRICAIRE, etc.

FLEURS CORDIALES. *Voy. première sect.*
BUGLOSE, BOURRACHE, VIOLETTE.

FOMENTATION ÉMOLLIENTE. (*de la Faye.*)

¼ Racine de guimauve	}	aa 3 ij
Bulbe de lis blanc		
Feuilles de guimauve. . . .	}	aa manip. j
— de mauve		
— de seneçon		
— de pariétaire. . . .		
— de bouillon blanc		
Fleurs de sureau	}	aa pinc. ij
— de camomille		
— de mélilot		
Semences de lin	}	aa manip. j
— de fenugrec. . . .		
Eau commune.		℥ viij
Faites bouillir et réduire à ℥ vj.		

Obs. Cette fomentation est très-composée; peut très-bien supprimer quelques-unes des substances qui entrent dans sa composition.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*Du même.*)

Eau commune.	℥ xx
Sulfate de soude	manip. ʒ

Feuilles de lavande	} $\overline{\text{aa}}$ manip.
— de sauge	

Faites bouillir et réduire aux trois quarts.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*Richter.*)

℥ Eau commune	lib
Vinaigre.	id
Nitrate de potasse	3
Muriate d'ammoniaque	1

Faites dissoudre.

Cas part. Contusions, ecchymoses, fractures, luxations, etc.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*D^r Justmond.*)

℥ Muriate d'ammoniaque.	
Alcool de romarin	1

Mélez.

Cas part. Engorgemens laitux et indolens des mamelles. On aura soin que les compresses soient toujours humectées.

FUMIGATION GUITONIENNE.

℥ Oxyde de manganèse pulvérisé, 2 parti

Muriate de soude 10 parties

Acide sulfurique étendu d'eau . . . 6 parties.

Mélez ensemble l'oxide de manganèse et le muriate de soude dans une capsule de terre cuite et ajoutez l'acide sulfurique.

P. Désinfectant.

Cas part. Maladies épidémiques contagieuses.

Obs. Lorsqu'on fait ces fumigations , il faut fermer toutes les issues de l'appartement , retirer tous les métaux et se retirer soi-même de peur d'être asphyxié.

On peut aussi faire des fumigations en décomposant le nitrate de potasse ou le muriate de soude seul, au moyen de l'acide sulfurique.

G.

GARGARISME ADOUCISSANT.

℥ Décoction de figes grasses dans le lait ℥ viij

Miel rosat ou sirop de mûres . . . ℥ j

Mélez.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE.

℥ Décoction d'orge mondé	3vj
Faites-y infuser	
Feuilles d'aigremoine.	pinc. iiij
Passez et ajoutez	
Suc de citron	3ij
Alcool de cochléaria	3j

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE.

℥ Décoction de racine de raifort et de bardane.	3vj
Alcool de cochléaria.	5j
Acide sulurique, jusqu'à acidité agréable.	

GARGARISME DÉTERSIF.

℥ Feuilles d'aigremoine.	} aa pinc. j.
—— de ronces.	
Sommités de rue	
Faites légèrement bouillir dans	
Eau commune	℞j
Passez et ajoutez	
Miel rosat	3j
Acide sulfurique, jusqu'à acidité agréable.	

GARGARISME RAFRAÎCHISSANT.

Eau de fontaine ou lait.	℞j
Sirop de mûres	℥j
Nitrate de potasse fondu	3℥
Méléz et faites dissoudre.	

GARGARISME DE QUARIN.

Racine de pyrèthre pulvérisée.	3j℥
Muriate d'ammoniaque.	3ij
Eau de sauge	3viij
Alcool de cochléaria	3vj
Laissez digérer pendant 12 heures.	
Passez et ajoutez	
Miel	3℥

P. Stimulant.

Cas part. Paralysie de la langue.

GELÉE DE CHOUX ROUGE. (*Offic.*)

D. ℥j à ℥iv par jour.

P. Adoucissante, pectorale.

Cas part. Catarrhes pulmonaires chroniques, phthisie.

GELÉE DE COING. (*Offic.*)

D. Q. V.

P. Légèrement astringente.

GELÉE DE CORNE DE CERF. (*Offic.*)

D. Plusieurs cuillerées dans le jour.

P. Adoucissante, astringente.

GELÉE DE GROSEILLES. (*Offic.*)

D. Q. V.

P. Rafraîchissante.

GELÉE DE LICHEN D'ISLANDE. (*Offic.*)

D. Cochl. iij à v par jour.

P. Adoucissante, pectorale.

Cas part. Catarrhes pulmonaires chroniques, phthisie.

Obs. Lorsqu'on veut la rendre tonique on y joint du quinquina ou de l'aloë noque.

GELÉE DE MOUSSE DE CORSE. (*Offic.*)

D. Cochl. iij par jour : une avant chaque repas.

Obs. Ce vermifuge, destiné aux enfants doit être continué pendant 3 ou 4 jours de suite.

GOUTTES AMÈRES. (*Offic.*)

D. G^{tte} j à vj dans une tasse d'infusion aromatique.

P. Stimulantes, toniques; peu usitées.

GOUTTES ANODINES D'ANGLETERRE OU DE TALBOT. (*Offic.*)

D. G^{tte} iv à ʒj dans une tasse de tisane ou une potion.

P. Antispasmodiques.

GOUTTES ANODINES D'HOFFMANN.

D. G^{tte} x à 3β et même 3j dans une potion.

P. Antispasmodiques.

Obs. Remplacées par l'éther sulfurique.

GOUTTES ANODINES DE SYDENHAM, *Voy.*
LAUDANUM.GOUTTES CÉPHALIQUES D'ANGLETERRE.
(*Offic.*)

D. G^{tte} x à ʒj dans une potion ou une tasse de tisane.

P. Antispasmodiques.

GOUTTES D'ELLER.

ʒ Liqueur anodine d'Hoffmann. . }
 Esprit de corne de cerf succiné. }
 Mélez.

D. Gtte xij à 3 β dans une tasse de tisane
une potion.

P. Sudorifiques, antispasmodiques.

Cas part. Goutte et rhumatisme chroniques, spasmes.

H.

HIÉRA-DIACOLOCYNTHIDOS, *Voy. ELECTUAIRE, deuxième sect.*

HIÉRA-PICRA, *Voy. ELECTUAIRE, deuxième sect.*

HUILES ESSENTIELLES ET GRASSES, *Voy. Les substances qui les fournissent, première sect.*

HUILE VERTE DE METZ, *Voy. BAUME VERT, deuxième sect.*

HYDROMEL, *Voy. MIEL, première sect.*

I.

INFUSIONS SIMPLES, *Voy. première sect.*INFUSION SUDORIFIQUE. (*D^r Camera.*)

Feuilles d'aya-pana.	3 ij
Semences d'anis	3 j
Eau bouillante.	℥ ij
Laissez infuser.	

INJECTION ASTRINGENTE.

Sulfate de zinc	}	aa 3 ij
Alun.		
Eau distillée de roses	}	aa ℥ ss
— de plantain.		
Mélez et faites dissoudre.		

Cas part. Gonorrhée et leucorrhée chroniques.INJECTION SÉDATIVE. (*D^r Hamilton.*)

Extrait muqueux d'opium.	3 j à 3 iij
Eau chaude.	℥ j
Faites dissoudre et ajoutez	
Acétate de plomb liquide	3 j à 3 iij

Cas part. Les mêmes que pour la précédente.

Obs. Il faut s'abstenir autant que possible de faire usage des injections dans le traitement de la gonorrhée et de la leucorrhée. Il ne faut y avoir recours qu'après l'emploi des autres moyens.

J.

JULEP ACIDE.

℞ Suc de citron clarifié

Eau distillée de menthe

Sirop de sucre.

Mélez.

A prendre par cuillerées.

Cas part. Fièvres inflammatoires et lieueuses.

JULEP CALMANT.

℞ Eau distillée de laitue

————— de fleurs d'oranger.

Sirop d'opium.

— de nymphæa

Ether sulfurique

Faites un julep. A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

JULEP CAMPHRÉ.

Camphre.	gr. xij
Faites dissoudre avec jaune d'œuf . . .	Q. S.
Eau distillée de tilleul	℥ iij
Sirop de sucre.	℥ j
Mélez.	

D. Par cuillerées.

JULEP PECTORAL.

Infusion de fleurs pectorales	℥ iv
Gomme arabique en poudre	gr. xij
Sirop de guimauve	℥ j
Mélez.	

D. Par cuillerées.

JULEP TEMPÉRANT.

Eau distillée de laitue	℥ ij
Sirop de nymphaea	} aa ℥ ij
— de groseilles	
Nitrate de potasse	gr. viij

Faites un julep. A prendre le soir en une ou deux doses.

JUS D'HERBES, *Voy.* 1^{ere} sect. Les substances qui fournissent les sucs.

L.

LAIT DE POULE, *Voy.* OEUF, 1^{ere} sect.

LAIT VIRGINAL, *Voy.* ACIDE BENZOÏQUE, première sect.

LAUDANUM OU VIN D'OPIMUM COMPOSÉ
(*Offic.*)

D. Gtt x à 3 ss et même 3 j par jour en plusieurs prises, ordinairement dans une potion.

P. Narcotique, antispasmodique.

Obs. 16 ou 18 gouttes de ce vin contiennent 1 grain d'opium.

LAVEMENT ADOUCISSANT.

℥ Décoction de graine de lin.

Huile d'olives.

Mélez.

Obs. On y joint souvent une ou deux têtes de pavot.

LAVEMENT ASTRINGENT.

℥ Ecorce de grenade

Roses rouges man.

Faites bouillir dans

Eau commune. 3xx

A réduire à ℥j.

Passez et ajoutez

Diascordium 3iij.

LAVEMENT CAMPHRÉ.

Décoction de graine de lin . . . 3x

Camphre. 3℔ à 3ij.

Faites dissoudre le camphre avec jaune d'œuf

S. et mêlez le tout.

LAVEMENT CARMINATIF.

Feuilles de mercuriale manip.j

Fleurs de camomille. . . . }
 — de mélilot. . . . } aa manip. ℔

Faites bouillir dans

Eau commune. 3xx

A réduire à ℥j.

Mettez à infuser

Semences d'anis 3ij

Passez.

LAVEMENT LAXATIF.

Miel mercurial 3j

Sucre brut. cochl. j

Eau de son. ℥j.

LAVEMENT D'OPIMUM.

- ℥ Décoction de graine de lin . . .
 Extrait muqueux d'opium. . . g.
 Pour deux demi-lavemens. A prendre à quelques heures de distance.

Cas part. Colique nerveuse.

LAVEMENT PURGATIF.

- ℥ Son de froment mani
 Séné.
 Faites bouillir dans
 Eau commune.
 A réduire à fbj.
 Passez et ajoutez
 Sulfate de soude
 Miel commun.

LAVEMENT STIMULANT PURGATIF.

- ℥ Séné. }
 Sulfate de soude } aa
 Faites bouillir dans
 Eau commune.
 Passez et ajoutez
 Vin émétique trouble 3j
 Ou bien émétique. gr. x

Cas part. Apoplexie, affections coma-
euses, hydropisies passives.

LAVEMENT STIMULANT.

Feuilles de tabac.	3℔
Faites bouillir dans	
Eau de fontaine	℔j
A réduire à 3xij.	
Passez et ajoutez	
Térébenthine dissoute avec jaune d'œuf	5ij
Muriate de soude.	3j.

LAVEMENT FÉBRIFUGE.

Quinquina concassé.	3j
Faites bouillir dans	
Eau commune	3xx
A réduire à ℔j.	
Passez et ajoutez	
Camphre dissous avec jaune d'œuf .	3℔.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Racine de fougère mâle	3j
Feuilles d'absinthe.	} aa manip. ℔.
Sommités de tanaïsie.	
Faites bouillir dans	
Eau commune	℔j

Ajoutez

Huile d'hypericum

LIMONADE SÈCHE DE FASCIO.

2^{ss} Oxalate acidule de potasse. 3^{ss}Sucre blanc pulvérisé 3^{ss}Huile essentielle de citron. g^{ss}te v

Faites une poudré.

D. 3j par 1ij d'eau, pour boisson ordinaire.

P. Délayante, rafraîchissante.

LINIMENT AMMONIACAL.

2^{ss} Huile d'amandes douces 3^{ss}Ammoniaque 3^{ss}

On peut y ajouter

Camphre. gr. x à 3^{ss}Ou laudanum ou baume tranquille. g^{ss}te xi

P. Excitant, rubéfiant.

Cas part. Paralysie, rhumatisme chronique.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE.

2^{ss} Huile d'amandes douces 3^{ss}

Camphre {

Laudanum. } ar 3^{ss}

Mêlez.

On en fait des frictions sur les parties affectées de spasmes et particulièrement sur l'abdomen, dans le cas de coliques nerveuses.

LINIMENT ANTIPSORIQUE. (D^r *Valentin*.)

℥ Soufre gris ou natif	}	aa parties égales.
Chaux vive		
Huile d'olives,		Q. S.

Faites un liniment.

LINIMENT CALCAIRE.

℥ Eau de chaux	}	aa 3 ij
Huile d'amandes douces.		

Mélez en agitant.

P. Répercussif.

LIQUEUR ANODINE D'HOFEMANN, *Voy.*

GOUTTES D'HOFEMANN.

LIQUEUR ANODINE DE SYDENHAM, *Voy.*

LAUDANUM.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE DE PRA-

PIER.

℥ Baume de la Mecque	3vj
Quinquina rouge	3j
Safran	3ß

Salsepareille	}	
Feuilles de sauge.		aa 3i
Alcool rectifié.		℞ iij

Dissolvez le baume de la Mecque dans le tiers de l'alcool; faites macérer pendant 24 heures les autres substances dans les deux autres tiers; passez et mêlez les deux liqueurs ensemble; ensuite ajoutez 6 à 7 livres d'eau de chaux et mettez dans des bouteilles bien bouchées.

Lorsqu'on veut se servir de cette liqueur, on en verse quelques gouttes sur un cataplasme de farine de graine de lin, qu'on applique le plus chaud possible sur la partie affectée, et qu'on renouvelle deux fois par jour.

Il faut favoriser l'action de ce cataplasme, en faisant boire au malade deux ou trois verres d'infusion de fleurs de sureau avec addition de quelques gouttes d'ammoniaque.

P. Sédatif, sudorifique.

Cas part. Goutte et rhumatisme chroniques.

LIQUEUR ANTINÉPHRÉTIQUE. (D^r Adams.)

℥ Capsules de pavot	3 vi
Eau de fontaine	℞ ij

Faites réduire à huit onces par ébullition prolongée; passez avec expression et ajoutez,

Nitrate de potasse 3j

D. 3ij matin et soir dans une tasse de tisane mucilagineuse.

P. Sédatif, diurétique.

LIQUEUR CONTRE LES APHTHES. (Dr Sivediaur.)

℞ Borax en poudre. 3ij

Teinture de myrrhe }

Eau distillée de roses } aa 3j

Miel rosat 3ij.

On trempe un pinceau de charpie dans cette liqueur, et on en touche les aphthes 2 ou 3 fois le jour.

LIQUEUR NITRÉE CAMPHRÉE.

℞ Nitrate de potasse 3vj

Eau commune. lb iij

Faites dissoudre et ajoutez

Alcool camphré 3j

Conservez dans des bouteilles bien bouchées.

D. G^{tte} vj à ʒj dans un verre d'eau, 4 ou 6 fois par jour.

P. Stimulante, diurétique.

Cas part. Gonorrhée chronique.

LIQUEUR RÉSOLUTIVE DE PURMANN.

℥ Solution de muriate de soude.	℥ ij
Vinaigre fort	℥ j
Fenilles de sauge.	manip. ij
Sulfate de cuivre.	℥ xij
—— d'alumine.	℥ vj

Faites bouillir pendant 20 minutes.

On applique des compresses trempées dans cette liqueur chaude, autour des articulations affectées d'engorgemens lymphatiques.

LIQUEUR DE VAN-SWIETEN, *V.* MURIATE DE MERCURE SUR-OXIDÉ, *première sect.*

LOOCH ASTRINGENT.

℥ Amidon.	5 ij
Cachou	3 j
Sirop de baume de Tolu	} aa 5 j
Blanc d'œuf battu dans un peu	
d'eau	

F. S. L.

D. Par cuillerées.

LOOCH BLANC DU CODEX. (*Offic.*)

D. Par cuillerées.

P. Adoucissant, pectoral.

LOOCH GOMMEUX KERMÉTISÉ. (*Parmentier.*)

24 Gomme arabique. 3j

Infusion pectorale 3iv

Sirop de guimauve 3i

Oxide d'antimoine hydro-sulfuré-brun. gr. iij.

Triturez le kermès avec la gomme ou le sirop, et versez peu à peu l'infusion.

D. Cochl. j d'heure en heure.

P. Incisif, expectorant.

LOOCH DE JAUNE D'OEUF. (*Offic.*)

D. Par cuillerées.

P. Adoucissant, pectoral.

LOOCH VERT. (*Offic.*)

D. P. Comme le précédent.

M.

MARMELADE DE TRONCHIN.

℥ Manne en larmes.	}	aa	
Pulpe de casse			
Huile d'amandes douces	}	aa	
Sirop de guimauve			
Eau de fleurs d'oranger.			3j à 2
Mélez.			

D. Cochl. j d'heure en heure. On boit une tasse de bouillon léger par dessus chaque cuillerée.

P. Purgatif minoratif.

MERCURE SOLUBLE, *Voyez* MERCURE (Oxide gris de), *première sect.*

MIELS, *Voy.* Les substances qui entrent dans leur composition, *première sect.*

MIEL DE LONGUE VIE.

℥ Suc dépuré de mercuriale.			Hb
———— de bourrache	}	aa	3 i
———— de buglose.			
Racine de glyceul.			3

Racine de gentiane	3℔
Miel blanc	℔j℔
Vin blanc	3vj.

Coupez les racines et mettez-les à infuser à froid dans le vin pendant 24 heures; passez et ajoutez les sucs et le miel; faites cuire à petit feu jusqu'à consistance de sirop. Tandis qu'il est chaud, passez au blanchet.

D. 5j à 3j.

P. Tonique, diaphorétique.

Obs. Si l'on veut le rendre purgatif, on ajoute, pendant la cuisson, une once d'infusion de séné faite à chaud.

MIXTURE ANTILÉTHARGIQUE. (*D^r Franck.*)

2℥ Alcool de menthe poivrée.	3vj
Laudanum liquide	3iv
Ether sulfurique	3vj

Mélez.

D. Une cuillerée à café tous les quarts d'heure ou demi-heures.

MIXTURE ASTRINGENTE.

2℥ Baume de Copahu	3iij.
------------------------------	-------

Faites dissoudre dans

Jaune d'œuf Q.

Ajoutez

Eau distillée de roses	}	aa
———— de plantain		

Alcool de genièvre

Sirop de Tola.	}	aa
— de consoude		

Mélez.

D. Cochl. ij matin et soir.

Cas part. Gonorrhée chronique.

MIXTURE BALSAMIQUE DE FULLER.

.2℥ Baume de Copahu	3
-------------------------------	---

Jaune d'œuf	no
-----------------------	----

Sucre blanc	3
-----------------------	---

Vin blanc	3 vi
---------------------	------

Mélez.

D. Cochl. j matin et soir.

Cas part. Catarrhe pulmonaire et gonorrhée chroniques.

MIXTURE LITHONTRIPTIQUE. (E. Durande.)

2℥ Ether sulfurique.	3 vi
------------------------------	------

Huile essentielle de térébenthine. . 3℔

Mélez.

D. Gtte xij à ʒj le soir dans une tasse d'eau sucrée.

Cas part. Calculs biliaires.

Obs. Comme l'huile essentielle de térébenthine est sujette à donner des coliques, *Fourcroy* a proposé de lui substituer le jaune d'œuf. On peut employer cette mixture en épithème sur la région du foie, au moyen d'un emplâtre de thériaque.

O.

ONGÜENT DE L'ABBÉ PIPON. (*Offic.*)
Inusité; remplacé par le basilicum.

ONGUENT ÆGYPTIAC. (*Offic.*)

P. Excitant, cathérétique.

Cas part. Ulcères fongueux.

ONGUENT D'AGRIPPA OU DE BRYONE.
(*Offic.*)

Obs. Peu usité; on l'employait en fric-

tions sur le ventre , dans les engorgements chroniques de quelque viscère et particulièrement dans ceux de la rate ; il agissait souvent comme purgatif.

ONGUENT D'ALTHÆA. (*Offic.*)

P. Adoucissant, résolutif.

ONGUENT D'ARCÆUS, *Voy.* BAUME.

ONGUENT D'ARTHANITA. (*Offic.*)

Obs. Inusité ; il s'employait en friction sur le ventre ou en épithème sur la région épigastrique , comme vomitif et purgatif ; dans les hydropisies et les affections vermineuses.

ONGUENT BASILICUM OU SUPPURATIF, OU TETRAPHARMACUM. (*Offic.*)

P. Excitant, suppuratif.

ONGUENT BLANC-RHASIS OU BLANC-RAISIN, (*Offic.*)

P. Sédatif, dessicatif.

ONGUENT DE BRYONE, *Voy.* ONGUENT
D'AGRIPPA.

ONGUENT BRUN. (*Offic.*)

P. Cathérétique, corrosif.

Cas part. Chancres syphilitiques.

Obs. Son emploi exige de la prudence.

ONGUENT OU EMLATRE DE CANET.
(*Offic.*)

Obs. Inusité; remplacé par tous les em-
plâtres dits *Fondans*.

ONGUENT CITRIN. (*Offic.*)

D. En friction, ʒβ à ʒij.

Cas part. La gale; les dartres, princi-
palement celles de cause syphilitique.

Obs. Son emploi exige de la circons-
pection, à cause du mercure qu'il contient.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

℥ Térébenthine de Venise	ʒβ
Jaune d'œuf	n ^o ij

Huile d'hypéricum ou cérat . . . 3 ss

Mélez exactement.

P. Excitant léger.

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

2℥ Térébenthine de Venise. . . . 3 ij

Baume d'Arcæus. . . . 3j ss

Basilicum 3j

Huile d'hypéricum ou cérat . . . 3 ss

Alcool étendu d'eau. . . . 5 ij

Mélez exactement.

P. Stimulant, excitant.

Obs. On étend ces *digestifs* sur des plumasseaux de charpie pour exciter les ulcères ou les plaies suppurantes.

ONGUENT GRIS. (*Offic.*)

Obs. Mélange d'un quart ou de moitié d'onguent mercuriel avec l'axonge. Employé en frictions pour détruire les insectes qui attaquent la peau et les poils.

ONGUENT OU HUILE DE LAURIER. (*Offic.*)

Obs. Usité en frictions comme calmant et résolutif.

ONGUENT MARTIATUM. (*Offic.*)

Obs. Abandonné. On l'employait en friction comme résolutif et calmant.

ONGUENT OU POMMADE MERCURIELLE.
(*Offic.*)

D. En friction, tous les deux jours, 3 ss, progressivement, 3 ij.—Etendu sur un plumasseau dans le pansement des ulcères vénériens.

P. Excitant, antisypilitique.

ONGUENT MERCURIEL BLANC. (*Zeller.*)

℥ Mercure précipité blanc	3j
Cérat ou pommade blanche à la rose	3j

Mélez.

D. En friction, 3 ss à 3 j.

Cas part. Affections cutanées psoriques, herpétiques et syphilitiques.

ONGUENT DE LA MÈRE. (*Offic.*)

P. Maturatif, suppuratif.

ONGUENT MODIFICATIF D'ACHE. (*Offic.*)

Obs. Abandonné. Il était usité comme

vulnéraire. On en faisait surtout usage dans la morsure des animaux enragés.

ONGUENT DE MONTPELLIER.

℥	Onguent d'althæa	}	aa 3ii
—	— rosat.		
—	— populeum		
	Miel		

Mélez exactement.

Employé comme adoucissant contre les tumeurs hémorrhoidales.

ONGUENT DE NICOTIANE. (*Offic.*)

Obs. En friction comme excitant dans la gale, etc.

ONGUENT NUTRITUM. (*Offic.*)

P. Répercussif, sédatif.

ONGUENT POMPHOLYX. (*Offic.*)

P. Comme le précédent ; peu usité.

ONGUENT POPULEUM. (*Offic.*)

Obs. Très-employé comme adoucissant et calmant, sur les tumeurs hémorhoï-

ales., les crevasses du sein, etc. — On l'a aussi quelquefois employé en lavement à la dose de *quelques gros*.

ONGUENT ROSAT. (*Offic.*)

P. Adoucissant.

ONGUENT DE STYRAX. (*Offic.*)

P. Stimulant, excitant.

ONGUENT SUPPURATIF, *Voy.* ONGUENT ASILICUM.

ONGUENT DE TUTHIE. (*Offic.*)

Obs. Appliqué sur le bord des paupières, comme excitant dans l'ophthalmie chronique.

OPIAT ANTILEUCORRHÉEN. (*Tissot.*)

Conserve de roses rouges	3 iij
— de romarin	} aa 3j
Quinquina	
Macis	} aa 3ij
Cachou	

Huile essentielle de cannelle. gtt.

Sirop d'écorce d'orange, Q. S.

F. S. L. Un opiat.

D. 3ij matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT. (D^r Larrey.)

℞ Baume de Copahu	}	aa
Sucre		

Gomme arabique

Laque carminée

Eau de menthe poivrée, Q. S.

D. 3j à 3ij matin et soir.

Cas part. Gonorrhées chroniques.

Obs. Pour favoriser l'effet de cet opiat il faut faire un exercice modéré et s'abstenir de faire usage de crudités.

OPIAT DENTIFRICE. (Baumé.)

℞ Pierre ponce préparée	}	aa
Terre sigillée préparée.		

Corail rouge préparé

Sang-dragon

Tartrate acide de potasse

Cannelle.

Girofles.

F. S. L. Une poudre que l'on peut employer en cet état.

Lorsqu'on en veut faire un opiat, on prend

Poudre ci-dessus	3j
Laque carminée	3ij
Miel de Narbonne écumé	3iv
Sirop de mûres	3ij
Huile essentielle de girofles	gtte ij

F. S. L. Un opiat.

On en fait des frictions sur les dents, au moyen d'une petite brosse, pour les nétoyer et pour donner du ton aux gencives.

OPIAT MÉSENTÉRIQUE. (*Offic.*)

D. 3ß à 3ij.

P. Purgatif drastique ; peu usité.

OPIAT DE SALOMON. (*Offic.*)

D. 3j à 3ij.

P. Tonique, stomachique, carminatif.

OPIAT STOMACHIQUE OU PÂTE SUDORIFIQUE D'HELVÉTIUS. (*Offic.*)

D. 3j à 3j.

P. Stomachique, sudorifique, aphrodisiaque.

OPIUM DU PROFESSEUR CHAUSSIER.

℥ Opium choisi et divisé en petits frag-
mens

Eau distillée 3 vi

Laissez macérer à la chaleur de l'atmosphère
pendant 2 ou 3 jours, suivant la saison; filtrez
et ajoutez .

Alcool à trente-six degrés 1 ℔

Conservez dans un flacon bien bouché.

D. Gtte xv à 3 ℔ dans une cuillerée de sirop.

— A l'extér. friction, lotion, collyre.

P. Celles de l'opium.

OPIUM CYDONIÉ DE LANGELOT. (*Offic.*)

D. P. Comme l'opium.

OPIUM DE ROUSSEAU. (*Offic.*), Vo.

OPIUM, première sect.

OR POTABLE D'HELVÉTIUS. (*Offic.*)

D. Gtte vj à xv.

P. Stimulant, tonique.

Obs. Abandonné aussi bien que les 1
meuses gouttes d'or du général La Motte.

je n'en ai fait mention que parce qu'on a introduit de nouveau dans la matière médicale les préparations d'or.

ORVIÉTAN. (*Offic.*)

ORVIÉTAN PRÆSTANTIUS. (*Offic.*)

Obs. Ces deux électuaires sont abandonnés; ils se donnaient dans les mêmes cas et aux mêmes doses que la Thériaque.

OSMAZÔME. (*M. Thénard.*)

Choisissez un muscle bien dégraissé, hachez-le, formez-en une pâte, versez dessus peu à peu de l'eau froide, malaxez, passez au travers d'un linge, faites chauffer jusqu'à ébullition, filtrez et faites évaporer jusqu'à consistance d'extract.

D. ʒß à ʒj.

Cas part. On le prescrit dans les convalescences pour donner du ton aux organes digestifs.

OXICRAT, *Voy.* VINAIGRE, 1^{re} sect.

OXIMEL COLCHIQUE, *Voy.* COLCHIQUE, première sect.

OXIMEL SCILLITIQUE, *Voy.* SCILLE, première sect.

OXIMEL SIMPLE. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒj. — *A l'extér.* en gargarisme.

P. Rafraîchissant, délayant, expectorant.

P.

PASTILLES DE CACHOU, *Voy.* CACHOU, première sect.

PASTILLES DE CANNELLE. (*Offic.*)

D. N^o iij à xij par jour. Chaque pastille doit contenir 5 grains de cannelle.

P. Stomachiques, toniques, emménagogues.

PASTILLES dites AU CITRON ou *adversus sitim*, *Voy.* ACIDE OXALIQUE, 1^{re} sect.

PASTILLES contre la mauvaise odeur de la bouche.

℥ Cachou	ʒ
Corail rouge pulvérisé	ʒ

Sucre 3 iij

Huile essentielle de cannelle. G^{tte} xij

Mucilage, Q. S.

Faites des pastilles de 10 grains.

D. On en laisse fondre une dans la bouche.

PASTILLES contre le croup et la phthisie laryngée. (*Prof. Chaussier.*)

℥ Camphre gr. xij

Opium gr. vj

Sucre. 3 iij

Mucilage, Q. S.

F. S. L. 50 pastilles. Chacune contient à peu près $\frac{1}{8}$ de grain d'opium.

D. N^o iv à vj par jour.

PASTILLES ÉMÉTIQUES DE CHOMEL. (*Off.*)

D. 5j dissous dans un verre d'eau.

Obs. Abandonnées; c'était une mauvaise manière d'administrer l'*Emétique*.

PASTILLES D'ENULA CAMPANA.

℥ Racine d'énula campana en poudre 3 ij

—— d'iris en poudre. 3 6

Sucre lb 6

Mucilage Q S.

F. S. L. Des pastilles de 10 grains.

D. 3ij à 3ß par jour.

Cas part. Scorbut, hydropisie, chlorose.

PASTILLES OU TABLETTES DE GIROFLE. (*Offic.*)

D. N^o iij à n^o xij par jour. Chaque pastille doit contenir deux grains de girofle.

P. Stomachiques, emménagogues.

PASTILLES DE MERCURE SACCHARIN. (*Lagneau.*)

℥ Mercure purifié

Gomme arabique.

Vanille

Sucre en poudre.

F. S. L. 576 pastilles. Chacune contient deux grains de mercure.

D. N^o j pendant quelques jours, ensuite n^o .

P. Antisypilitiques.

Obs. On peut substituer à la vanille huit gouttes d'huile essentielle de *Bergamotte*. Il est des cas où l'on ne doit donner qu'une demi-pastille en commençant.

PASTILLES OU TABLETTES DE SAFRAN. *Offic.*)

D. ʒ ij à ʒ j.

P. Apéritives, emménagogues, pectorales.

PASTILLES VERMIFUGES. (*Barthez.*)

Muriate doux de mercure ʒ ij
Sucre. lb j

Mucilage Q. S.

F. S. L. 288 pastilles. Chacune doit contenir un demi-grain de muriate doux.

D. Pour les enfans, n^o j à ij. Pour les adultes, n^o iv à xij.

PASTILLES D'YEUX D'ECREVISSES. (*Offic.*)

D. ʒ ʒ à ʒ ij et même ʒ iij par jour.

P. Absorbantes, anti-acides.

PATES DE GUIMAUVE, DE JUJUBES, PECTORALE DE PARMENTIER, DE RÉGLISSE, etc. *Offic.*)

P. Adoucissantes, pectorales.

Obs. Toutes ces pâtes, dont la gomme arabique forme la partie médicamenteuse, se donnent à dose indéterminée; cependant il est quelques pharmaciens qui font entrer de l'opium dans leur confection; comme dans le *Suc. de réglisse gommé* de M. Thibierge : alors la dose doit être de $\tilde{3}$ B. tout au plus $\tilde{3}$ ij par jour.

PÂTE SUDORIFIQUE D'HELVÉTIUS, *Voy.*
OPIAT STOMACHIQUE.

PETIT-LAIT, *Voy.* LAIT (petit), 1^{ere} section.

PETIT-LAIT TAMARINDÉ.

℞ Pulpe de tamarins

Petit-lait 1

Mélez.

D. Par verres d'heure en heure.

P. Laxatif.

PETIT-LAIT DE WEISSE.

℞ Follicules de séné }
Sulfate de magnésie. }

aa

Fleurs de sureau }
 Sommités de mille-pertuis . } aa pinc. j.

Faites infuser pendant dix à douze heures dans
 Petit-lait clarifié ℥ viij

D. ℥ j par jour en deux prises.

P. Purgatif recommandé par quelques
 accoucheurs, pour diminuer la sécrétion
 du lait chez les femmes qui ne nourrissent
 pas ou qui ont sevré leurs enfans.

PILULES D'ACONIT MERCURIELLES. (*D^r* *double.*)

Extrait d'aconit napel ʒj
 Muriate de mercure sur-oxidé. . . gr. ij
 Triturez long-temps dans un mortier de
 verre; faites ensuite 20 pilules.

D. Une pilule matin et soir; on augmente
 dose d'une pilule, tous les dix jours.

Cas part. Dartres anciennes compliquées
 de virus syphilitique, psorique ou scro-
 fuleux.

PILULES ALOÉTIQUES ÉMOLLIENTES. (*Off.*)

D. Gr. xij à ʒj.

P. Purgatives.

PILULES D'ALUN D'HELVÉTIUS, *Vo*
ALUN DE MYNSICHT. 2^e sect.

PILULES ANGÉLIQUES. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3j.

P. Stomachiques, purgatives.

PILULES *antè cibum*, PILULES GOU
MANDES OU GRAINS DE VIE. (*Offic.*)

D. P. Comme les précédentes.

PILULES ANTI-ASTHMATIQUES.

℥ Soufre sublimé et lavé. 3

Acide benzoïque. 12

Extrait de gomme ammoniac. 3

Conserve d'énula campana. Q.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N^o iv à n^o vj par jour.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES ANGLAISES.

℥ Nitrate d'argent gr

Mie de pain blanc

Mélez exactement; faites ensuite 20 pilul

D. Une matin et soir.

Obs. Au bout d'un ou deux jours d'anneteté, ces pilules perdent leur vertu.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES. (*Buchan.*)

Aloès succotrin	}	aa 3j
Rhubarbe en poudre		
Savon médicinal		

Mêlez et faites des pilules de 5 grains.

D. N° v à n° vj, 2 à 3 fois dans la journée.

P. Purgatives.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES. (*Greding.*)

Extrait de belladone 3j

Feuilles de belladone en poudre. . gr. xv

Mêlez et faites des pilules d'un demi-grain.

D. Une matin et soir.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (*Pidérít.*)

Assa-fœtida	}	aa 3j
Castoreum.		

Acide succinique concret 3 ℔

Huile animale de Dippel gtte xx

Teinture de myrrhe. Q. S.

S. L. Des pilules de 5 grains.

D. N° ij à n° v.

Cas part. Hystérie.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (D^r A
bert.)

℥ Muriate de mercure doux	}	aa
Résine de gayac		
Guimauve en poudre.		
Sirop de coing.		Q
Faites des pilules de 4 grains.		
D. N ^o v à n ^o vj par jour.		

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (D^r Ch
tien.)

℥ Muriate d'or gr
Extrait de thymélée gr
Mêlez exactement et divisez en 60 pilules.
D. N^o j chaque jour; augmenter tous les
jours d'une pilule.

Obs. Lorsqu'on administre le *Mur*
d'or aux enfans, il faut diviser la ma
ci-dessus en 120 pilules.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (D^r C
lerier.)

℥ Muriate de mercure sur-oxidé gr
Farine de froment

Gomme arabique pulvérisée . . . 3ij
Eau distillée, Q. S.

Mélez; faites des pilules de 3 grains. Chacune contient $\frac{1}{8}$ de grain de muriate sur-oxidé.

D. Deux matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*Profess. Dupuytren.*)

4 Muriate de mercure sur-oxidé . gr. xviii
Extrait de gayac . . . 3iv

Faites 72 pilules. Chacune contient $\frac{1}{4}$ de grain de muriate sur-oxidé.

D. N° j d'abord, au bout de quelques jours
1° j matin et soir.

Obs. Dans quelques cas ce professeur
ajoute extrait muqueux d'opium gr. vj
xij.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*D^r Sé-
illot aîné.*)

Onguent mercuriel . . . 3ij
Savon médicinal . . . 3ij
Amidon ou poudre de réglisse. . . 3j

Mélez; faites des pilules de 4 ou 6 grains.

D. N^o ij d'abord, au bout de 4 à 5 jours on augmente d'une pilule et ainsi progressivement jusqu'à n^o ix et n^o xij.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*Terras.*)

℞ Onguent mercuriel 3j
Poudre d'althæa ou mie de pain, Q. S.
Faites 144 pilules.

D. N^o iij le matin; le 3^e jour on double la dose; ainsi progressivement, jusqu'à n^o xij et même n^o xv en augmentant de n^o iij tous les jours.

PILULES ASTRINGENTES. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3j.

Cas part. Leucorrhée, blennorrhée, hémorrhagies passives.

PILULES ASTRINGENTES. (*D^r Lagneau.*)

℞ Rhubarbe en poudre. } aa 3
Cachou en poudre. }
Baume de Copahu
Térébenthine Q.
Faites 72 pilules.

D. N^o ij le premier jour; n^o iv le deuxième jour, ainsi de suite jusqu'au n^o viij par jour.

Cas part Gonorrhées chroniques.

Obs. Si les pilules étaient trop volumineuses, on pourrait les diviser.

PILULES BALSAMIQUES DE MORTON:
(*Offic.*)

D. Gr. vj à gr. xx.

P. Béchiques, expectorantes.

Cas part. Asthme, catarrhe pulmonaire chronique.

PILULES BALSAMIQUES DE STAHL. (*Offic.*)

D. Gr. ij à gr. xij.

P. Stomachiques, laxatives, emménagogues.

Obs. Peu usitées.

PILULES DE BÉCHER. (*Offic.*)

D. P. Comme les pilules balsamiques de Stahl.

PILULES DE BÉLOSTE. (*Offic.*)

D. Comme altérant, gr. iv à gr. viij. — Comme purgatif, 3ß à 3j.

P. Antisymphilitiques, vermifuges, purgatives.

PILULES CHALYBÉES. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3j.

P. Stomachiques, toniques, emménagogues.

PILULES DE CIGUE. (*Offic.*)

D. Gr. j à gr. iv, progressivement, gr. xij 3j et même 3j.

P. Narcotiques, résolutives, diurétiques.

PILULES COCHÉES MAJEURES ET MINEURES. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3ß.

P. Purgatives.

Obs. Peu usitées; les pilules cochées majeures se prescrivent à plus forte dose que les mineures.

PILULES CONTRE L'AMÉNORRHÉE. (D^r *Alibert.*)

℥ Carbonate de fer.	3 ij
Safran oriental.	} aa 3 j
Cassia lignea	
Extrait d'aloès.	} aa 3 β
—— de rhubarbe.	
—— de rue	

Sirop d'armoise ou miel de Narbonne, Q. S.

F. S. L. 72 pilules.

D. N^o vj par jour en deux prises.

PILULES CONTRE LA DANSE DE SAINT-GUY. (D^r *Mérat.*)

℥ Nitrate d'argent fondu	gr. vj
Extrait gommeux d'opium	3 j
Musc en poudre	℥ ij
Camphre.	℥ iv

F. S. L. 96 pilules. Chacune contient $\frac{1}{16}$ de grain de nitrate d'argent, $\frac{3}{4}$ de grain d'opium, grain de musc, 1 grain de camphre.

D. N^o j matin et soir; ensuite n^o iij par jour et même plus tard n^o iv.

Obs. Utiles aussi dans l'épilepsie. Il faut les employer récentes.

PILULES CUIVREUSES. (D^r *Swediaur.*)

℞ Sulfate de cuivre ammoniacal. . . . gr. xv.
 Mie de pain blanc ℥iv
 Carbonate d'ammoniaque liquide. . . Q. S.
 Divisez en 96 pilules. Chacune doit contenir $\frac{1}{6}$ de grain de sulfate de cuivre.

D. N^o ij à n^o iij par jour.

Cas part. Epilepsie, chorée, hémorrhagies passives.

PILULES DE CYNOGLOSSE. (*Offic.*)

D. Gr. j à gr. vj ordinairement le soir.

P. Antispasmodiques, somnifères.

Cas part. Toux, douleurs de poitrine, asthme.

Obs. Très-usitées.

PILULES ÉCOSSAISES. (D^r *Anderson.*)

℞ Gomme-gutte.	}	aa 3
Aloès succotrin		
Huile essentielle d'anis		

Sirop de sucre, Q. S.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. Comme purgatives, n° iij à n° iv. — N° j

le soir pour tenir le ventre libre.

PILULES FONDANTES. (*Richter.*)

24 Gomme ammoniac	}	aa 3 iij
Assa-foetida.		
Savon médicinal		
Racine de valériane		
Fleurs d'arnica		

Tartrate de potasse antimonié dissous dans

Q. S. d'eau gr. viij à x.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N° iv tous les trois jours.

Cas part. Engorgemens chroniques du foie.

PILULES FONDANTES. (*Vicq-d'Azir.*)

24 Extrait de fiel de bœuf desséché	}	aa 3 iij
—— de petite centaurée.		
Ecorce de Winter	}	aa 3 j
Oxide de fer noir		

Sirop, Q. S.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N^o iv à n^o vj par jour.

Cas part. Comme les précédentes.

PILULES OU PIERRE DE FOUGÈRE. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3j.

P. Astringentes; peu ou point usitées.

PILULES GOURMANDES, *Voy.* PILULES
ANGÉLIQUES et *antè cibum*.

PILULES HYDRAGOGUES DE BONTIUS
(*Offic.*)

D. Gr. xij à xviii et quelquefois 3j.

P. Purgatives drastiques.

Cas part. Engorgemens chroniques de
viscères abdominaux, hydropisies passives.

PILULES HYSTÉRIQUES. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3ß.

P. Antispasmodiques, emménagogues.

PILULES DE KEYSER, *Voy.* DRAGÉES.

PILULES DE MERCURE GOMMEUX
(*Plenck.*)

℥ Mercure bien purifié.

Gomme arabique. 3iij.

Triturez dans un mortier de verre, en ajoutant peu à peu du sirop de chicorée avec rhubarbe, jusqu'à ce que le mélange soit parfait. Ajoutez ensuite

Mie de pain blanc 3j

Mêlez et faites des pilules de trois grains.

D. N° vj matin et soir.

Cas part. Syphilis.

PILULES MERCURIELLES PURGATIVES.
(D^r Alibert.)

4 Mercure purifié	}	aa 3iv
Poudre de jalap		
— de scammonée		
Tartrate acidule de potasse.		3ij
Sirop de nerprun.		3iv

Eteignez le mercure en le triturant avec le tartrate et une partie du sirop; ajoutez ensuite les poudres, mêlez exactement et faites des pilules de six grains.

D. 3j et quelquefois 3j.

Cas part. Syphilis.

PILULES MERCURIELLES. (*Plumier.*)

℥ Muriate de mercure doux . . .	}	aa 3
Oxide d'antimoine-hydro-sulfuré orangé.		
Suc épuré de réglisse		3
Mucilage		Q.

F. S. L. Des pilules de six grains.

D. N^o ij à n^o iij matin et soir.

Cas part. Syphilis, dartres.

PILULES DE PANACÉE MERCURIELLE. (*Lagneau.*)

℥ Muriate de mercure doux	}	gr. xiv
Farine de froment		
Ou manne		
Ou gomme adragant.		
Eau distillée ou sirop simple		Q.

F. S. L. 72 pilules. Chacune contient 6 grains de muriate doux.

D. N^o j, progressivement n^o ij et même n^o iij.

Cas part. Syphilis, vers intestinaux.

PILULES PANCHYMACOGUES. (*Offic.*)

D. Gr. x à 3j.

P. Purgatives drastiques; peu ou point usitées.

PILULES PURGATIVES. (*D^r Alibert.*)

℥ Résine de jalap	}	aa 3j
Muriate de mercure doux		
Savon d'Espagne.		

Huile essentielle d'écorce d'oranges. . g^{tte} vj

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N^o j de demi-heure en demi-heure, jusqu'à effet purgatif.

PILULES PURGATIVES UNIVERSELLES
D'HELVÉTIUS. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3j et même 3℥.

Obs. Peu ou point usitées.

PILULES RELACHANTES.. (*Buchan.*)

℥ Savon médicinal	3j℥
Sagapenum.	℥j
Extrait de pissenlit.	3ij
Aloès succotrin	3j

F. S. L. des pilules de trois grains.

D. N^o iij à n^o vj et même n^o x en 2 prises, soir et matin.

Cas part. Constipation.

PILULES DE RUDIUS, *Voy.* EXTRAIT.

PILULES DE SAVON OU SMECTIQUES. (*Offic.*)

D. Gr. viij à gr. xvj deux ou trois fois le jour.

P. Anti-acides, apéritives, fondantes.

PILULES SAVONNEUSES DE M^{LLE} STEPHENS. (*Offic.*)

D. 3℥ répété trois fois par jour : le matin à jeun, trois heures après le dîner, le soir en se couchant.

Cas part. Gravelle, calcul urinaire.

Obs. Abandonnées.

PILULES DE SCILLE COMPOSÉES. (*Pharmacop. de Londres.*)

℥ Scille desséchée	3
Gingembre.	} aa 3i
Savon médicinal	
Gomme ammoniac	
Sirop, Q. S.	3℥

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N^o iij à n^o vj par jour.

Cas part. Catarrhe pulmonaire chronique.

PILULES SCILLITIQUES. (*Pharmacop. d'Edimbourg.*)

℥ Savon médicinal 3j

Scille pulvérisée } aa 3℥

Nitrate de potasse }

Baume de Copahu, Q. S.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N^o iij à n^o iv le matin.

Cas part. Hydropisies; quelques cas de suppression d'urine.

PILULES DE STARKEY. (*Offic.*)

D. Gr. iv à gr. xij.

P. Apéritives, calmantes, légèrement purgatives.

Cas part. Ictère, hydropisies.

PILULES STOMACHIQUES DE CADET.

℥ Aloès } aa gr. viij

Extrait de quinquina }

Résine de gayac }

Savon médicinal

Gomme ammoniac gr.

Oxide de fer noir. gr.

F. S. L. Douze pilules.

D. N^o ij en se mettant à table.

PILULES TARTARÉES DE SCHRODER. (*Offi*

D. ℥j à 3℥ et même 3j.

P. Purgatives, emmenagogues.

Cas part. Engorgemens chroniques
l'abdomen, chlorose.

PILULES TONIQUES DE BACHER. (*Offi*

D. Gr. ℥ le soir.

Cas part. Hydropisies, particulièrement
l'anasarque.

PILULES TONIQUES DE MOSCOU. (*Huln.*)

℥ Extrait de colombo	}	aa
—— de gentiane		
—— de quassia		
—— de bile de bœuf.		

Poudre de gentiane, Q. S.

F. S. L. Des pilules de quatre grains.

D. N° j à n° ij après le dîner.

Cas part. Dyspepsie.

PILULES DE WERLHOFF.

℥ Cantharides en poudre. gr. j
 Sulfate jaune de mercure gr. β
 Camphre. gr. x
 Mucilage de gomme adragant. . . Q. S.
 Faites 2 ou 3 pilules, à prendre en 2 ou 3 fois.

Cas part. L'hydrophobie.

Obs. L'emploi de ces pilules demande beaucoup de prudence.

POMMADE ANTI-OPHTHALMIQUE.

℥ Cérat ou onguent rosat. ℥ j
 Oxide rouge de mercure. . . gr. xij à xvj
 Mélez exactement.

On en applique gros comme une lentille sur le bord libre des paupières, le soir en se couchant.

P. Excitante, stimulante.

Cas part. Ophthalmie chronique, ulcération du bord des paupières, lippitude.

POMMADE ANTI-OPHTHALMIQUE. (*Idosault.*)

℥ Oxide rouge de mercure . . .	}	aa
—— de plomb demi-vitreux.		
Tuthie préparée		
Alun calciné	}	
Muriate de mercure sur-oxidé . . . gr.		
Axonge, cérat ou onguent rosat. . .		

D. P. Cas part. Comme la précédente

POMMADE ANTI-OPHTHALMIQUE DE R⁺

℥ Acétate de plomb.	}	aa gr
Oxide rouge de mercure . . .		
Camphre		gr
Beurre frais lavé avec de l'eau de rose		gr. LXX

F. S. L. Une pommade.

D. P. Comme les précédentes.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*Prose Boyer.*)

℥ Vieille brique rouge pilée . . .	}	aa
Soufre sublimé et lavé . . .		
Huile d'amandes douces, Q. S.		
Huile essentielle de citron . . .		g ^{te} ij à

F. S. L. Une pommade.

On en frotte le soir en se couchant les efflorescences de la peau et les taches hépatiques qui assiègent le visage.

POMMADE ANTIPSORIQUUR. (D^r Alibert.)

Carbonate de potasse	}	aa 3 iij
Soufre sublimé et lavé		
Axonge		3 iij

Mélez exactement.

On en frotte deux ou trois fois le jour les parties affectées de gale.

POMMADE DE CANTHARIDES.

Axonge.	℥bj
Cantharides pulvérisées.	3j

Faites cuire l'axonge avec quelques feuilles de morelle; passez et ajoutez les cantharides et faites cuire au bain-marie.

Obs. Employée pour exciter les vésicaire.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE.

Charbon pulvérisé	3j
Soufre sublimé	3 ij

Cérat. 33

Mélez exactement.

F. En friction sur le cuir chevelu.

POMMADE DE CONCOMBRE. (*Offic.*)

P. Adoucissante.

Obs. Elle est employée comme cosmétique ; elle est sujette à devenir rance. en est de même de la pommade en crème.

POMMADE DE GAROU.

℥ Axonge 1

Ecorce de garou 33

Faites digérer au bain-marie , et passez avec expression.

Même usage que la pommade de cantharide.

POMMADE DE GOULARD. (*Offic.*)

Obs. Employée dans les mêmes cas que le cérat de Goulard.

POMMADE MERCURIELLE, *V.* ONGUENT

POMMADE MERCURIELLE AU BEURRE DE CACAO. (*M. Planche.*)

℥ Mercure purifié	}	aa
Beurre de cacao récent		

Huile d'œuf gr^{ss} xx

F. S. L. Une pommade.

Obs. Elle s'emploie dans les mêmes cas
t aux mêmes doses que l'onguent mer-
curiel. Ne conviendrait-il pas mieux,
orsqu'on veut faire prendre l'onguent
mercuriel en pilules, de se servir de cette
ommade?

POMMADE CONTRE LA GALE. (*Peyrilhe.*)

Noix de galles pulvérisées	}	aa 3j
Alun pulvérisé.		
Axonge		3 vij

Mêlez exactement.

D. 3j à 3ij en friction.

POMMADE MERCURIELLE. (*Cirillo.*)

Muriate de mercure sur-oxidé.	3j
Axonge	3j

Mêlez et triturez long-temps dans un mortier
e verre; ensuite ajoutez

Muriate d'ammoniaque pulvérisé. . . gr. x

D. 3j en friction sous la plante des pieds.

P. Antisymphilitique.

POMMADE OXYGÉNÉE. (*M. Alyon.*)

℥ Axonge 1℔

Acide nitrique à 32 degrés 3℔

Faites fondre l'axonge ; mêlez peu à peu l'acide en agitant fortement ; tenez sur le feu jusqu'à ébullition, retirez et laissez refroidir.

D. 3j en friction.

Cas part. Dartres, syphilis, mais particulièrement la gale.

POMMADE SAVONNEUSE HYDRO-SULFURÉE. (*D^r Jadelot.*)

℥ Sulfure de potasse 3℔

Savon blanc. 1℔

Huile de pavot. 1℔

Huile essentielle de thym

F. S. L. Une pommade.

D. 3j matin et soir en friction.

Cas part. Gale, dartres.

POMMADE A LA SULTANE.

℥ Cire blanche 3℔

Adipocire

Huile d'amandes douces 3℔

Baume de la Mecque. g^{tte} xij

Lait virginal à l'eau de rose. 3j

F. S. L. Une pommade.

Obs. Plutôt usitée comme *cosmétique*,
que comme médicament ; elle adoucit et
affermit la peau.

POMMADE DE TURBITH. (D^r *Alibert.*)

Sulfate jaune de mercure 3ij

Axonge: ℥ij

Faites fondre l'axonge ; incorporez le sulfate ;
muez jusqu'à entier refroidissement.

Obs. Usitée dans le traitement des dar-
s dépendantes ou compliquées de virus
philitique.

POTION ANTI-ÉMÉTIQUE. (*Rivière.*)

Carbonate de potasse ʒj

Faites dissoudre dans

Eau de fontaine 3℥

Ajoutez au moment de la prendre

Suc de citron }
Sucre blanc pulvérisé } aa 3℥

A prendre en une seule fois.

Cas part. Vomissemens spasmodiques ou produits par une trop forte dose d'éthérique.

Obs. On remplace le suc de citron et le sucre par 3 6 de sirop *tartareux*.

POTION ANTISPASMODIQUE.

℞ Eau de tilleul ou de laitue.
 Eau de fleurs d'oranger.
 Sirop d'armoise ou de karabé ,
 ou diacode }
 Ether sulfurique g^{tte} xxx
 F. S. L. Une potion.
 D. Cochl. j toutes les 1 ou 2 heures.

POTION ANTISCORBUTIQUE. (D^r Frai)

℞ Décoction de quinquina
 Extrait de quinquina.
 Alcool de cannelle
 Sirop de pavot blanc
 Faites une potion.
 D. Cochl. j toutes les demi-heures.

POTION ANTITÉTANIQUE. (D^r Fourn)

℞ Musc pur

Camphre.	3j
Eau de Luce	3ij
Infusion très-rapprochée d'arnica	3iv
F. S. L. Une potion.	
D. Cochl. j toutes les heures.	

Cas part. Tétanos traumatique.

Obs. On y ajoute de 3ij à 3iv de *nitrate de potasse*, suivant l'état des organes urinaux.

POTION ASTRINGENTE. (*Desault et Cho-*
art.)

Eau distillée de menthe.	}	aa 3ij
Alcool		
Baume de Copahu		
Sirop de capillaire		
Eau distillée de fleurs d'oranger.		3j
Acide nitrique alcoolisé		3ij
F. S. L. Une potion.		

D. Cochl. ij le matin, cochl. j à midi, cochl. j
soir, pendant 10 à 12 jours.

Cas part. Blennorrhée.

Obs. Très-usitée.

POTION CALMANTE.

℥ Eau distillée de laitue.	
———— de pivoine	}
———— de fleurs d'oranger.	
Sirop d'opium.	

aa

Faites une potion.

D. Cochl. j toutes les heures , dans la soif

POTION CONTRE L'HÉMOPTYSIE. ((
de Jussieu.))

℥ Eau distillée de plantain	}	— aa
———— de buglose.		
Sirop de consoude		
Eau de Rabel		g ^{tt}
Eau de fleurs d'oranger.		

Mêlez.

D. En deux prises.

POTION CONTRE L'HÉMOPTYSIE.

℥ Suc d'ortie grièche dépuré	
Sirop de consoude	

Mêlez.

D. En deux prises.

POTION CORDIALE. (D^r *Alibert.*)

Eau de scorsonère	}	aa 3iv
— de mélisse simple		
— de fleurs d'oranger		
Sirop d'œillet.	}	aa 3j
Confection alkermès.		
		3j

Faites une potion.

D. Par petites cuillerées, toutes les heures.

POTION ÉMÉTIQUE.

Tartrate de potasse antimonié	gr. iv
Eau distillée de tilleul, ou décoction de racine de guimauve	3iv
Sirop de guimauve	3j

D. Par cuillerées de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'à effet.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*Desbois.*)

Eau distillée d'armoise	3vj
Huile essentielle de rue	} aa g ^{tt} e. vj à vii
— de Sabine.	
Sirop d'armoise composé, ou sirop de fleurs d'oranger	3j

Faites une potion.

D. Cochl. j de 2 heures en 2 heures.

Obs. On y ajoute quelquefois teinture
d'*assa-fœtida*, gttē x à xij.

POTION MINORATIVE.

℥ Huile de ricin.	}	aa
Sirop de limon ou de violettes.		
Eau de fleurs d'oranger.		

Mêlez.
D. A prendre en une fois.

POTION PURGATIVE.

℥ Follicules de séné	}	aa
Faites légèrement bouillir dans		
Eau commune		

Ajoutez
Manne en larmes.
Pulpe de casse.

	}	aa

Phosphate ou sulfate de soude . 3ij
Passez et aromatisez avec
Eau distillée de fleurs d'oranger . 3j
D. A prendre en une fois.

POTION PURGATIVE.

℥ Jalap pulvérisé	3j
Décoction de racine de guimauve	

Sirop de limons ou de violettes . 3j à 3ij

Eau distillée de fleurs d'oranger. 3j à 3ij

Mélez.

D. A prendre en une fois.

Obs. Purgatif agréable et que l'on peut employer toutes les fois qu'un autre purgatif n'est point spécialement indiqué.

POUDRE ABSORBANTE. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3j.

POUDRE D'AMBRE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3ß.

P. Tonique, stomachique.

POUDRE AMÈRE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3j.

P. Stomachique, vermifuge, fébrifuge.

Cas part. La goutte atonique.

POUDRE ANTHELMINTIQUE.

✓ Coraline de Corse	}	3j
Semen-contr.		
Racine de fougère mâle.		
Mélez et pulvérisez.		

D. ʒß à ʒj en pilules ou dans une tasse d'infusion amère.

Obs. On peut joindre à cette poudre *Muriate de mercure doux*, gr. vj à viij.

POUDRE ANTICANCÉREUSE DE SAINT-CÔME.

℥ Sulfure rouge de mercure	3ij
Cendre de vieux souliers	gr. viij
Sang-dragon	gr. xi
Oxide blanc d'arsenic	gr. xxi

D. A l'extér. réduite en pâte avec la salive sur les ulcères chancreux, comme caustique.

Obs. Il ne faut employer cette poudre que sur des surfaces peu étendues; il faut détruire l'ulcère en une ou deux applications pour ne point exaspérer la maladie.

POUDRE ANTI-ÉMÉTIQUE. (*Professeur Chaussier.*)

℥ Acide tartarique en poudre	3j
Carbonate de potasse cristallisé en poudre	3ij
Sucre blanc en poudre	3j

Délaissez dans un verre de tisane ou d'eau distillée appropriée, et faites la poudre en une dose sur-le-champ.

Obs. On peut, au lieu d'acide *Tartarique*, se servir des acides *Citrique* et *Oxalique*.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*Offic.*)

D. Gr. vj à ʒss et même ʒj.

POUDRE ANTISEPTIQUE. (*D^r Swediaur.*)

℥ Poudre de racine d'arnica	} aa parties égales.
———— de quinquina.	
———— de camphre. .	

Mêlez.

On en saupoudre les ulcères atoniques ou qui sont menacés de gangrène.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE. (*D^r C***.*)

℥ Sulfure d'antimoine.	gr. xij
———— noir de mercure	ʒss
———— rouge de mercure	ʒj

F. S. L. une poudre; divisez en 24 ou 18 paquets.

D. D'abord un chaque matin, ensuite matin et soir.

POUDRE ARSENICALE. (*Prof. A. Dubois*)

- ℥ Oxide blanc d'arsenic
 Vermillon de Hollande
 Sang-dragon
 Mêlez.

Obs. Employée dans les mêmes cas de la même manière que la poudre *Saint-Côme*. Il en est de même de celle *Rousselot*.

POUDRE D'ARUM COMPOSÉE. (*Bircmann.*)

- ℥ Racine d'arum.
 ——— de calamus aromaticus }
 ——— de saxifrage }
 Yeux d'écrevisses préparés.
 Cannelle.
 Sulfate de potasse.
 Muriate d'ammoniaque
 F. S. L. Une poudre.

D. Gr. xij à 30 et même 3ij.

P. Stimulante, stomachique, absorbant

POUDRE ASTRINGENTE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 36 et même 3j.

POUDRE ASTRINGENTE.

✓ Poudre de quinquina	36
—— de rhubarbe.	3ij
—— de cascarille.	36

Mêlez et divisez en quatre ou six prises.

POUDRE CAPITALE DE SAINT-ANGE.

✓ Feuilles de cabaret	3j
Racine d'ellébore blanc.	3j
Pulvérisez et mêlez.	

D. Une pincée par le nez, comme le tabac apé.

P. Sternutatoire.

Obs. Son emploi demande de la prudence, parce qu'il peut provoquer l'*écistaxis*.

POUDRE CATHARTIQUE. (*Parmentier.*)

✓ Tartrate acidule de potasse	3ij
Jalap en poudre	3v
Scammonée.	3j

F. S. L. Une poudre.

D. Gr. xviii à ʒj en pilules ou dans une potion appropriée.

P. Purgative.

POUDRE CONTRE LA COQUELUCHE. (*Fothergill.*)

℞ Tartrate de potasse antimonié . . . gr.

Yeux d'écrevisses en poudre . . . ʒss

Mélez exactement.

D. Gr. j dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée.

POUDRE CORNACHINE, de Tribus cornu DE WARWICK. (*Offic.*)

D. Gr. xij à ʒβ et même ʒj.

P. Purgative.

POUDRE CORROBORANTE. (*Werlhoff.*)

℞ Quinquina ʒss

Cannelle. gr.

Mélez et faites une poudre, à prendre en trois fois.

P. Tonique.

Cas part. Convalescence des fièvres intermittentes.

POUDRE DENTIFRICE, *Voy.* OPIAT.

POUDRE DIARRHODON. (*Offic.*)

D. Gr. x à 3 ℥ et même 3 j.

P. Stomachique, astringente.

Obs. Peu usitée.

POUDRE DIATRAGACANTHE FROIDE. (*Offic.*)

D. Gr. vj à 3 ℥ et même 3 j.

P. Adoucissante, rafraîchissante.

Obs. Peu ou point usitée.

POUDRE D'IPÉCACUANHA COMPOSÉE OU DE
OWER.

Sulfate de potasse	}	̄aa 3 j
Nitrate de potasse.	}	
Ipécacuanha	}	̄aa 3 ij
Opium desséché	}	

F. S. L. Une poudre.

D. Gr. xij à 3 j le soir en se couchant.

P. Diurétique, diaphorétique, calmante,
ergative.

Cas part. Catarrhe pulmonaire, rhumatismes chroniques, ictère.

POUDRE DE GRIMALDI. (*Offic.*)

D. ʒj à 3 ʒ.

P. Tonique, fébrifuge, purgative.

Obs. Peu usitée.

POUDRE DE GUTTETTE. (*Offic.*)

D. Gr. xv à 3j.

P. Antispasmodique.

Obs. Peu usitée.

POUDRE HYDRAGOGUE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3 ʒ.

P. Purgatif fort.

Cas part. Hydropisies passives, affections comateuses.

POUDRE D'IRIS COMPOSÉE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3 ʒ.

P. Adoucissante, pectorale.

POUDRE DE KENT. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3 ʒ.

P. Astringente , diaphorétique.

Obs. Peu ou point usitée.

POUDRE LÉTIFIANTE. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3ß et même 3j.

P. Stomachique , antispasmodique.

Obs. Peu ou point usitée.

POUDRE DE MERCURE SACCHARIN. (*D^r Lagneau.*)

℥ Mercure purifié	3 ij
-----------------------------	------

Sucre blanc	3ß
-----------------------	----

Eteignez le mercure en le triturant longtemps avec le sucre.

D. Gr. x dans une tasse de café ou de chocolat.

Cas part. Syphilis des enfans.

POUDRE STERNUTATOIRE.

℥ Feuilles de marjolaine.	}	aa 3j
-----------------------------------	---	-------

— de bétouine.

Fleurs de muguet.	
---------------------------	--

Feuilles de cabaret	3ß
-------------------------------	----

Pulvérisiez chaque substance séparément et mêlez.

D. Une pincée, comme du tabac en poudre.

POUDRE TEMPÉRANTE DE STAHL. (*Offic.*)

D. Gr. vj à ʒj.

Cas part. Angine, fièvre ardente, affections spasmodiques, etc.

POUDRE *de Tribus*, *Voy.* POUDRE COMNACHINE.

POUDRE TONIQUE.

℥ Quinquina	}	aa ʒ
Serpentaire de Virginie.		
Camphre		

Faites une poudre très-fine. A prendre en deux doses.

Cas part. Fièvres intermittentes.

POUDRE DE TROIS SANTAUX. (*Offic.*)

D. Gr. xij à ʒβ et même ʒj.

P. Cordiale, stomachique.

Obs. Peu usitée.

POUDRE DE VERNIX. (*Offic.*)

Usitée à l'extérieur, comme astringente et cathérétique, pour arrêter les hémorrhagies.

R.

RACINES APÉRITIVES, *Voy. 1^{ere} sect.*
 Ache, Asperge, Fenouil, Persil, Petit
 Houx.

RATAFIA DU COMMANDEUR CAUMARTIN.
 (*Offic.*)

D. Un petit verre soir et matin, pendant
 4 à 5 jours.

Cas part. La gravelle.

Obs. On fait en même temps usage, pour
 boisson ordinaire, d'une infusion de *Criste-*
marine.

RATAFIA DES CARAÏBES.

℥ Résine de gayac 3 ij
 Tafia. ℥vj

Concassez la résine et faites-la digérer pen-
 dant 15 jours dans le tafia.

D. 3 ℥ par jour.

Cas part. Goutte et rhumatisme chro-
 niques.

REMÈDE ANTHELMINTIQUE. (*Alston.*)

℞ Etain pulvérisé 3j

Mélasse 3vi

Mélez exactement.

D. Prendre la moitié dans la journée; l'autre moitié, divisée en deux parties, se prendra le lendemain et le surlendemain.

REMÈDE ANTISYPHILITIQUE. (*Peyrilhe.*)

℞ Feuilles de mélisse 3 vi

Follicules de séné. 3j

Eau commune. 1lb

Faites infuser environ pendant une heure dans un vase fermé; passez.

℞ Infusion ci-dessus 3 vi

Sucre blanc. 3j

Faites dissoudre, mettez dans une bouteille et ajoutez

Carbonate d'ammoniaque . . . 3j à 3j

Bouchez bien.

D. En quatre ou six fois, le matin.

REMÈDE ANTISYPHILITIQUE. (*Alex. Russel.*)

℞ Ecorce récente de garou 3j

Eau commune ℥iij

Faites réduire par l'ébullition à ℥ij.

Ajoutez

Régliste effilée. 3j

D. 3iij à 3iv, 2 à 3 fois par jour.

REMÈDE CONTRE LA COLIQUE DES PEINTRES. (*Hôpital de la Charité de Paris.*)

Le 1^{er} jour on donne le lavement purgatif des peintres :

℥ Feuilles de séné 3℔

Faites bouillir dans

Eau commune. ℥ij

Ajoutez à la décoction

Sulfate de soude 3℔

Vin émétique 3iv.

Dans la journée, l'eau de casse avec les

grains :

℥ Eau de casse simple (1). ℥ij

Sulfate de magnésie 3j

(1) Eau de casse simple.

℥ Casse en bâton concassée 3ij

Eau commune. ℥ij

Faites bouillir un quart d'heure et passez.

Tartrate de potasse antimonié. . . gr. iiij

Si la maladie est forte , quelquefois on ajoute :

Sirop de nerprun. 3j

Ou bien confection hamech. . . . 3ij.

Le soir à cinq heures on donne le *lavage* :
anodin des peintres :

℥ Huile de noix 3vj

Vin rouge 3xij.

A huit heures on donne

℥ Thériaque 5j à 3j 5

Opium gr. 6 à gr. j.

Le 2^e jour on donne l'eau dite *bénite* :

℥ Tartrate de potasse antimonié. . . gr. vj

Eau tiède 3xij.

A prendre en 2 fois à une heure de distance.

Quand le malade a vomi , on lui donne le
reste du jour la *tisane sudorifique* :

℥ Gayac } ————

Squine } aa 3j

Salsepareille }

Eau commune. 3j

Faites bouillir et réduire à 1j.

* Ajoutez	
Sassafras	3j
Régliste	3℥.

Faites bouillir légèrement et passez.

Le soir à cinq heures le *lavement anodin* et la *thériaque avec l'opium*.

Le 3^e jour on donne la *tisane sudorifique laxative* :

℥ Tisane sudorifique simple	℥ij
Séné	3j.

Faites jeter quelques bouillons et passez.

A prendre en 4 fois dans la matinée.

Dans la journée la *tisane sudorifique simple*.

Le soir à 4 heures le *lavement purgatif*.

Deux heures après le *lavement anodin*.

A huit heures la *thériaque et l'opium*.

Le 4^e jour on donne le *purgatif des peintres* :

℥ Infusion de séné (1).	3vj
Sulfate de soude	3℥
Jalap en poudre	3j

(1) Infusion de séné.

℥ Séné	3ij
Eau	℥℥.
Faites bouillir et réduire à 3vj.	

Sirop de nerprun. 3j

On aide l'action du purgatif par la tisane sudorifique simple.

Le soir à 5 heures, le *lavement anodin*; à 8 heures, la *thériaque et l'opium*.

Le 5^e jour la *tisane sudorifique laxative*, le soir à 4 heures, le *lavement purgatif*; à 6 heures, le *lavement anodin*; à 8 heures, la *thériaque et l'opium*.

Le 6^e jour le *purgatif des peintres*, la *tisane sudorifique simple*, le *lavement anodin*, la *thériaque et l'opium*.

Ordinairement les malades sont guéris après la deuxième purgation. Quelquefois il faut prolonger le traitement au-delà.

Si les malades ne vomissent ni n'évacuent les purgatifs administrés, on donne les *bols purgatifs des peintres* :

℥ Diagrède	}	aa gr. x	
Résine de jalap			
Gomme gutte			gr. xij
Confection hamech			3j 6.

Sirop de nerprun, Q. S.

Faites 12 bols, dont on prendra un, de 2 heures en 2 heures.

Si cela ne suffit pas, on a recours aux purgatifs doux et huileux.

Pendant les premiers jours on tient le malade à une diète sévère. Le 4^e ou 5^e jour on commence à donner des bouillons et du vin vieux.

REMÈDE CONTRE LA FIÈVRE INTERMITTENTE. (*Peyrilhe.*)

℥ Ecorce récente de marronnier . . .	3j
Gratiole pulvérisée	ʒij
Carbonate de potasse.	3j
Sirop de fleurs de pêcher	Q. S.

Faites un opiat.

D. Gros comme une noix muscade toutes les trois heures pendant l'apyrexie ; on boira par-dessus une tasse d'infusion de chicorée sauvage.

Obs. Ce remède fait pour remplacer le quinquina, ne doit être donné comme lui qu'après l'administration des évacuans.

REMÈDE CONTRE LE TÆNIA. (*D^r Alibert.*)

℥ Racine de fougère mâle	ʒiv
Eau commune	℔ij

Faites bouillir et réduire à ℔ij.

Ajoutez

Sirop de coralline. 3 iij

A prendre par tasses, pour boisson ordinaire.

Trois heures après le repas, on administrera le bol suivant :

℥ Muriate de mercure doux . . .	}	aa gr. iij
Corne de cerf calcinée . . .		
Conserve de roses, Q. S.		

Le soir on donnera une once d'huile d'amandes douces.

Le lendemain on prescrira le purgatif suivant :

℥ Scammonée en poudre	gr. xvii	
Racine de fougère mâle pulvérisée . . .	3 iij	
Gomme-gutte.	}	aa gr. xij
Muriate de mercure doux.		

A prendre en trois doses.

Obs. Il faut modifier le remède suivant l'âge du malade et suivant la plus ou moins grande tenacité du tœnia.

REMÈDE CONTRE LE TÆNIA. (*Professeur Bourdier.*)

Ce professeur fait prendre le matin un gros.

d'éther sulfurique dans un verre d'une forte décoction de racine de fougère mâle; une heure après il prescrit deux onces d'huile de ricin avec parties égales d'un sirop quelconque; il répète ce traitement le lendemain et quelquefois le surlendemain.

Il fait prendre quelquefois un lavement composé d'une forte décoction de fougère mâle et de deux gros d'éther.

REMÈDE DE MADAME NOUFFER CONTRE LE TÆNIA.

Le soir le malade mangera une bonne panade.

Le lendemain matin, il prendra trois gros de racine de fougère mâle en poudre dans six onces de tisane faite avec la racine de fougère et la fleur de tilleul. Deux heures après on lui donnera le bol purgatif suivant :

℞ Muriate de mercure doux	} aa gr. x
Scammonée	
Gomme-gutte	
Confection d'hyacinthe	gr. vj
	Q. S.

On doit modifier ce purgatif selon l'âge, le

tempérament du malade et suivant que le tænn
résiste plus ou moins.

RHODOMEL. (*Offic.*) *Voy.* 1^{ere} secce
ROSE ROUGE. (Miel de.)

S.

SAVON MERCURIEL. (*Prof. Chaussier.*)

℥ Onguent mercuriel double. . . . 3 iij.

Solutum de soude caustique . . . 3 ii

Triturez dans un mortier de verre, en versant
peu à peu le solutum, jusqu'à ce que le mélange
ait acquis de la tenacité; on le met ensuite
dans des moules de papier gris où il acquiert
avec le temps, la consistance du savon.

D. 3ß à 3ij en friction.

Cas part. Affections syphilitiques, psor-
riques et herpétiques.

SAVON DE STARKEY. (*Offic.*)

D. Gr. xij à 3ß et même 3j en pilules. —

A l'extér. friction, lotion, fomentation.

P. Apéritif, diurétique, résolutif.

Cas part. Néphrite, catarrhe vésical et rhumatisme chroniques.

SEL DE GUINDRE.

℥ Sulfate de soude mis en poudre par
son efflorescence naturelle . . . 3 ℥
Nitrate de potasse gr. xij
Tartrate antimonié de potasse. . . gr. ℥
Faites dissoudre dans tisane laxative ℥ij.
D. A prendre par tasses dans la matinée,
comme purgatif.

SEMENCES CARMINATIVES OU CHAUDES
MAJEURES, *Voy.* FENOUIL, ANIS, CARVI,
CUMIN, *première sect.*

SEMENCES CHAUDES MINEURES, *Voyez*
ACHE, PERSIL, AMMI, CAROTTE, *pre-*
mière sect.

SEMENCES FROIDES MAJEURES, *Voyez*
COURGE, CITROUILLE, MELON, CONCOM-
BRE, *première sect.*

SEMENCES FROIDES MINEURES, *Voyez*
LAITUE, POURPIER, ENDIVE, CHICORÉE,
première sect.

SIROPS SIMPLES, *Voy. première section*
 Les substances qui entrent dans leur composition.

SIROP D'ABSINTHE COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. 3ij à 3ij.

P. Tonique, stomachique, carminatif, emménagogue.

SIROP ALEXANDRIN, *Voyez 1^{ère} section*
 CANNELLE. (Sirop de)

SIROP D'ALTHÆA COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. 3ij à 3ij.

P. Adoucissant, expectorant, diurétique.

SIROP ANTHELMINTIQUE.

℥ Ail écrasé	℔ij
Faites infuser pendant une heure dans	
Eau bouillante.	℔ij
Passez et ajoutez	
Sucre blanc	℔ij
<i>D.</i> 3ij à 3ij le matin.	

SIROP ANTISCORBUTIQUE. (*Offic.*)D. ℥ij à ℥ij .SIROP ANTISCORBUTIQUE. (*D^r Duman-
gin.*)

$\frac{1}{2}$ Suc d'oseille ℥iv
 — de cresson ℥ij
 — de citron ℥v .

Filtrez les trois sucs réunis, sans les faire chauffer, et ajoutez

Sucre blanc Q. S.

Faites un sirop à froid.

D. ℥iv le matin.SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ. (*Offic.*)D. ℥ij à ℥℥ .

P. Emménagogue, carminatif, vermifuge.

SIROP DE CALABRE, *Voy.* MIEL DE LONGUE VIE.SIROP DE CHICORÉE COMPOSÉ. (*Offic.*)D. ℥℥ à ℥ij . — Pour les enfans, ℥j à ℥℥ .

P. Purgatif.

SIROP DE CHOU ROUGE. (*Offic.*)*D.* 3ij à 3ij.*P.* Adoucissant, pectoral.SIROP DES CINQ RACINES. (*Offic.*)*D.* 3ij à 3j.*P.* Apéritif, diurétique.SIROP DE CONSOUDE COMPOSÉ. (*Offic.*)*D.* 3ij à 3ij.*P.* Astringent.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

℥ Ipécacuanha pulvérisé	3j
-----------------------------------	----

Quinquina concassé.	3 iv
-----------------------------	------

Opium brut coupé	3j
----------------------------	----

Faites macérer pendant 24 heures dans

Eau froide	℥ ij 3
----------------------	--------

Répétez cette macération jusqu'à ce que les substances ne fournissent plus de principes médicamenteux; filtrez les diverses colatures et ajoutez

Sucre blanc	℥ iij.
-----------------------	--------

Evaporez dans bain-marie jusqu'à consistance de sirop.

D. Une cuillerée à café matin et soir aux enfans au-dessous de deux ans; une cuillerée à bouche à ceux qui sont plus âgés.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE. (*M. Cadet de Gassicourt.*)

℥ Oximel scillitique	3jβ
Sirop d'ipécacuanha.	} aa 3ij
— diacode	
— de fleurs d'oranger	
	3β

Mélez.

D. Cochl. ij dans une tasse de tisane adoucissante, répétées toutes les deux heures.

SIROP DE CUISINIER OU DÉPURATIF.
(*Offic.*)

D. 3ij à 3iij.

P. Diaphorétique, sudorifique.

Cas part. Syphilis, dartres.

Obs. On ajoute souvent par livre de sirop 1, 2, 3 et même 4 grains de *Muriate de mercure sur-oxidé*; on l'appelle alors sirop de la 1^{re}, 2^e, 3^e ou 4^e cuite.

SIROP DIACODE , (*Offic.*) *Voy. première*
sect. OPIUM, PAVOT. (Sirop de)

SIROP D'ÉRYSIMUM COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒij.

P. Légèrement tonique , expectorant.

SIROP DE GLAUBER. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒij.

P. Diaphorétique , fébrifuge.

Obs. Peu ou point usité.

SIROP DE GUIMAUVE COMPOSÉ, *Voyez*
 SIROP D'ALTHÆA COMPOSÉ.

SIROP DE KARABÉ. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒj.

P. Calmant, narcotique.

SIROP DE LONGUE VIE, *Voy.* MIEL DE
 LONGUE VIE.

SIROP MAGISTRAL ASTRINGENT. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒjβ.

P. Il purge d'abord et resserre ensuite.

SIROP DE NICOTIANE , (*Offic.*) Voyez
première sect. TABAC. (Sirop de)

SIROP D'ORGEAT. (*Offic.*)

D. Cochl. j par verre d'eau.

P. Adoucissant , rafraîchissant.

SIROP DE MERCURE GOMMEUX. (*Plenck*)

¼ Mercure purifié 3j

Gomme arabique. 3j

Sirop de chicorée avec rhubarbe . Q. S.

Triturez dans un mortier de verre jusqu'à
 parfaite extinction du mercure. Ensuite ajoutez

Sirop de chicorée avec rhubarbe. . 3jss.

D. Une cuillerée à café matin et soir.

Cas part. Syphilis des enfans.

SIROP MERCURIEL. (*Belet.*)

¼ Nitrate de mercure purifié et fait à

froid 3jss

Ether nitrique rectifié 3ss

Sirop de sucre blanc. 1lbj

Faites dissoudre le nitrate dans un mortier
 de verre avec le moins d'eau possible ; mêlez
 à froid cette solution avec le sirop et l'éther.

Mettez dans une bouteille, bouchez bien agitez.

D. Cochl. j le matin dans un verre de boisson appropriée.

Cas part. Syphilis, dartres, etc.

SIROP DE POMMES COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒij.

P. Purgatif minoratif, apéritif.

SIROP DE POMMES ELLÉBORÉ. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒij.

P. Purgatif plus fort que le précédent, emménagogue.

SIROP DE ROSES PALES COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. ʒβ à ʒij.

P. Purgatif.

SIROP DE STECHAS COMPOSÉ. (*Offic.*)

D. ʒij à ʒij.

P. Tonique, stomachique, emménagogue.

SIROP DE SULFURE DE POTASSE.

Sulfure de potasse	3ij
Eau distillée de fenouil ou d'hysope. 3	viii
Sucre blanc.	℥bj

F. S. L. Un sirop.

D. 3℥ à 3j le matin.

Cas part. Phlegmasies chroniques de la poitrine, dartres.

SIROP DE TORTUE COMPOSÉ OU RÉSUMPTIF. (*Offic.*)

D. 3ij à 3ij.

P. Adoucissant, analeptique.

Obs. Peu ou point usité.

SIROP DE WILLIS.

Sulfure de potasse	3ij
Vin d'Espagne.	℥iiij
Sucre blanc	℥ij.

Faites digérer le sulfure pendant 24 heures dans le vin; filtrez; faites dissoudre le sucre et vaporez au bain-marie jusqu'à consistance de sirop.

D. Cochl. j matin et soir.

Cas part. Affections chroniques des poitrine; dartres.

SUCS DE RÉGLISSE ANISÉ, OU CACHOU, BLOIS, DE LILLE, D'ESPAGNE, etc.

D. Q. V.

P. Adoucissans, béchiques.

Obs. Quelques pharmaciens font entrer de l'opium dans ces compositions, *Voyez* PATE DE RÉGLISSE.

SUCS D'HERBES, *Voyez* première sect. II substances qui les fournissent.

SUCRE ORANGÉ PURGATIF.

℥ Jalap en poudre.	
Sucre blanc	3
Tartrate acidule de potasse soluble	3
Huile essentielle d'orange	

F. S. L. Un *oleo-saccharum*; mêlez-y tartrate et le jalap.

D. 3 ij à 3 iij dans une livre d'orangeade.

SUCRE VERMIFUGE. (*Offic.*)

D. Gr. vj à xij, en pilules avec la gelée de groseilles; en deux prises.

Obs. Son emploi demande de la prudence; le *mercure* en forme la base.

SUPPOSITOIRE CALMANT.

Opium	}	aa ʒj
Safran		
Castoreum		
Miel épaisi, Q. S.		
Pour faire deux suppositoires.		

SUPPOSITOIRE FORTIFIANT. (*Reuss.*)

Racine de tormentille	}	aa ʒij
Ecorce de chêne		
Faites une poudre et ajoutez		
Miel		Q. S.
Pour faire huit suppositoires.		

Cas part. Chute et atonie du rectum.

SUPPOSITOIRE VERMIFUGE.

Extrait de bile de bœuf	}	aa ʒj
Extrait d'absinthe		
Semen-contrain en poudre		gr. xij
Miel épaisi, Q. S.		
Pour 1 ou 2 suppositoires.		

Cas part. Vers ascarides.

T.

TABLETTES ANTIMONIALES DE KUNCKEL.
(*Offic.*)

D. 3j à 3ß le soir et le matin.

P. Excitantes, diaphorétiques.

Obs. Peu ou point usitées.

TABLETTES BÉCHIQUES. (*Offic.*)

D. Q. V.

TABLETTES DE CITRO. (*Offic.*)

D. 3ij à 3vj.

P. Purgatives.

Obs. Peu ou point usitées.

TABLETTES DIACARTHAMI. (*Offic.*)

D. 3ij à 3j.

P. Purgatives ; peu usitées.

TABLETTES MARTIALES. (*Offic.*)

D. 3j à 3ij soir et matin.

P. Stimulantes, emménagogues.

Cas part. Chlorose, aménorrhée.

TEINTURES SIMPLES, *Voy. première sect.*
 es substances qui les forment.

TEINTURE D'ABSINTHE COMPOSÉE. (*Offic.*)

D. G^{tte} x à ʒj et même 3℥ dans une potion.

P. Stomachique, carminative, vermi-
 ge, emménagogue.

TEINTURE DE MARS DE LUDOVIC. (*Off.*)

D. 3℥ à ʒj dans une potion.

P. Stimulante, tonique.

TEINTURE D'OPIUM CAMPHRÉE OU ELIXIR
 ARÉGORIQUE. (*Pharmacop. de Londres.*)

Extrait sec d'opium.	}	aa ʒj
Acide benzoïque		
Huile essentielle d'anis		
Camphre		ʒ ij
Alcool faible		℥ xxiv

Faites macérer pendant 3 jours; filtrez.

D. ʒj à 3℥.

P. Diaphorétique, antispasmodique.

Cas part. Toux spasmodique, catarrhes
 chroniques.

TEINTURE THÉBAÏQUE. (*Pharmac
de Londres.*)

- ℥ Extrait sec d'opium.
 Eau de cannelle
 Alcool
 Faites macérer pendant 8 jours; filtrez.
D. Quelques gouttes.
P. Sédativ , narcotique.

THÉRIAQUE. (*Electuaire offic.*)

- D.* Gr. xij à ℥ij. — *A l'extér.* en épithème.
Q. V.
P. Tonique, stomachique, alexitè
 cordiale, astringente.

TISANE ASTRINGENTE.

- ℥ Riz moude et lavé }
 Corne de cerf rapée. } aa
 Racine de bistorte }
 ——— de consoude } aa
 Eau commune.
 Faites bouillir et réduire à ℥ij; passez.

Pour édulcorer, vers la fin de l'ébullition, on ajoutera

Réglisse effilée. ʒiʒ

Ou bien on mettra dans chaque tasse une cuillerée de sirop de coing ou de sirop d'écorce d'oranges.

D. Quatre ou cinq tasses dans la journée.

TISANE DE FELTZ.

Salsepareille ʒij

Squine ʒj

Sulfure d'antimoine ʒiv

Acthyocolle. }

Ecorce de buis. } aa ʒjʒ

— de lierre }

Eau commune ℞xij

Faites un nouet du sulfure d'antimoine;

faites bouillir et réduire à ℞vj; passez à l'étamine;

laissez reposer; décantez et ajoutez

Muriate de mercure sur-oxidé. . . . gr. iij

D. ℞ij par jour, en 5 ou 6 prises.

Cas part. La syphilis; quelques dartres.

TISANE LAXATIVE.

Pulpe de casse }

— de tamarins } aa ʒj

Phosphate ou sulfate de soude . . .

Faites bouillir dans

Eau commune. ℥ij

Passez et ajoutez

Sirop de roses pâles. 3j à 3

D. Par verres d'heure en heure.

TISANE SUDORIFIQUE.

℥ Salsepareille }

Squine }

Gayac }

Eau commune. ℥ij

Faites macérer pendant 24 heures ; faites
bouillir et réduire à ℥ij ; ensuite mettez à
fuser

Sassafras.

Passez et ajoutez

Miel ou sucre. Q. s.

D. Quatre ou cinq tasses dans la journée.

Cas part. Syphilis, rhumatisme et gouttes
chroniques.

TISANE DE VINACHE.

℥ Salsepareille }

Squine }

Gayac }

Sulfure d'antimoine 3ij
 Eau commune ℥vj
 Faites un nouet du sulfure d'antimoine. Faites
 bouillir dans un vaisseau de terre vernissée et
 réduire à ℥iv; mettez à infuser

Sassafras }
 Séné } aa 3℥
 Passez; laissez déposer et décantez.

D. Deux à trois verres par jour.

P. Diaphorétique, purgative.

Cas part. Syphilis, dartres; rhumatisme
 et hydropisies chroniques.

V.

VINS MÉDICINAUX SIMPLES, *Voy.* Les
 substances qui les forment, *première sect.*

VIN AMER DIURÉTIQUE. (*Professeur
 Corvisart.*)

Quinquina en poudre 3j
 Ecorce de Winter }
 ——— de citron } aa 3ij
 Racine d'asclépias }
 ——— d'angélique } aa 3j
 Scille sèche. }

Feuilles sèches d'absinthe .	}	aa
————— de mélisse. .		
Baies de genièvre.	}	aa
Macis.		
Vin blanc		III
Alcool à trente-six degrés		

Concassez toutes ces substances, mettez-les dans un matras, versez le vin et l'alcool par dessus; faites digérer pendant 24 heures au soleil ou au bain-marie; passez avec expression, filtrez, et conservez dans des bouteilles bouchées.

D. Cochl. iij à iv par jour : une avant chaque repas.

VIN ANTIHYDROPIQUE. (*Fuller.*)

℥ Iris de Florence	}	aa 3
Enula campana		
Scille		
Ecorce de sureau.	}	aa
———— d'hièble		
———— de Winter.		
Séné	}	aa
Ellébore noir		
Jalap.		
Agaric		

Vin blanc , ℥iv

Faites infuser à froid.

D. ℥iv le matin.

Cas part. Hydropisies passives.

VIN ANTIHYDROPIQUE. (*Bayle.*)

℥ Cannelle.	}	aa ℥iv
Nitrate de potasse		

Sommités d'absinthe manip. j

Vin blanc ℥vj

Faites macérer pendant 24 heures; passez
et filtrez.

D. Un verre matin et soir.

Cas part. Hydropisies passives.

VIN ANTISCORBUTIQUE (*Offic.*)

D. ℥j à ℥iv.

VIN AROMATIQUE.

℥ Sommités fleuries de sauge .	}	aa ℥β
_____ de lavande.		
_____ de romarin.		
_____ d'origan .		
_____ de thym .		
Feuilles de laurier		

Muriate d'ammoniaque 3i

Gros vin rouge lbii

Faites infuser à chaud.

D. A l'extér. Q. V. en lotion, fomentation
bain local.

P. Tonique, résolutif.

Cas part. Fractures, luxations, contu-
sions, œdème.

VIN ASTRINGENT.

℥ Ecorce de grenade }

—— de chêne } aa

Roses rouges }

Alun. 3i

Faites macérer.

D. A l'extér. Q. V. en lotion, fomentation
bain local.

Cas part. Chute du rectum et de la ma-
trice.

VIN FÉBRIFUGE DE S..... (*M. Cadet de Gassicourt.*)

℥ Quinquina jaune }

Ecorces sèches d'oranges. } aa 3 v et gr. xvii

Racine de gentiane . . . }

Fleurs de camomille. . . }

Vin d'Espagne. lbj
 Alcool à vingt degrés ℥j
D. ℥j à ℥iv soir et matin, pendant l'apy-
 rexie.

Cas part. Fièvres intermittentes.

VIN D'HUXAM.

℥ Vin de Malaga ℥j
 Tartrate antimonié de potasse. . . gr. j
 Mélez.

D. Gtte xv à xl dans une potion.

P. Sudorifique.

VIN D'OPIMUM COMPOSÉ, *Voy.* LAUDANUM,
sect.

VINAIGRES MÉDICINAUX SIMPLES, *Voy.*
première sect. Les substances qui entrent
 dans leur composition.

VINAIGRE PROPHYLACTIQUE OU DES
 QUATRE VOLEURS. (*Offic.*)

Obs. On le fait respirer; on en frotte
 les tempes, les narines et les mains; on
 en imprègne les habits; on le fait évaporer
 dans les appartemens, comme préservatif

de la contagion ; on le donne , rarement ,
l'intérieur à la dose de ʒj à ʒss.

VINAIGRE THÉRIACAL. (*Offic.*)

D. ʒj à ʒss dans une potion. — *A l'exte*
de même que le vinaigre des quatre voleurs.

P. Tonique , sudorifique , vermifuge
désinfectant.

VULNÉRAIRE SUISSE. (*Offic.*)

D. En infusion , pinc. ij à iv par ℥ij d'eau.

Cas part. Contusions.

Obs. C'est la réunion de plusieurs plantes
plus ou moins stimulantes , telles que
Véronique, le Mille-pertuis, la Pervenche
le Lierre terrestre, la Mille-feuille, etc.

FIN DE LA II^e SECTION DE LA II^e PARTIE

DEUXIÈME PARTIE.

TROISIÈME SECTION.

Séries alphabétiques des principaux médicaments considérés sous le rapport de leurs propriétés médicinales.

A.

ABSORBANS. — *Internes simples.* Carbonate de chaux, magnésie, yeux d'écrevisses.

— *Internes composés.* Pastilles d'yeux d'écrevisses, pilules de savon, poudre absorbante, poudre d'arum composée de *Birckmann*.

— *Externes simples.* Agaric de chêne, colophane en poudre, quinquina pulvérisé, amidon pulvérisé.

ADOUCISSANS. — *Internes simples.* Adipocire, amandes douces, amidon, avoine, bouillon blanc, capillaire, citrouille, concombre, corne de cerf, courge, dattes, épinard, gomme adra-

gant, gomme arabique, grenouilles, guimauve, herbe aux puces, jujubes, lait, lait (petit), laitue, lichen, limaçons, lin, mauve, miel, navet, orge, pignons doux, pistaches, polypode, poulet, pruneaux, pulmonaire, réglisse, riz, sagou, salep, sébestes, sucre, tortue, tussilage, violette.

ADOUCISSANS. — *Internes composés.* Gelée de chou rouge, G. de corne de cerf, G. de lichens, décoction blanche de *Sydenham*, julep pectoral, looch blanc, L. jaune, L. verd, pâte de guimauve, poudre d'iris composée, sirop d'althæa composé, S. de chou rouge, S. d'orgeat, S. de tortue composé, suc de réglisse.

— *Externes simples.* Presque tous les adoucissans internes simples.

— *Externes composés.* Cérat de *Galien*, gargarisme adoucissant, lavement adoucissant, onguent d'althæa, O. populeum, O. rosati, pommade de concombre, P. à la sultane.

AGGLUTINATIFS. — *Composés.* Emplâtre diachylum simple, D. gommé.

ANALEPTIQUE. — *Simple.* Amidon, cacao, corne de cerf, riz, sagou, salep, vipère.

— *Composés.* Blanc-manger, crème de pain, sirop de tortue composé.

ANODINS, *voy.* ADOUCISSANS.

ANTHELMINTIQUES, *voy.* VERMIFUGES.

ANTI-ACIDES, *voy.* ABSORBANS.

ANTI-ARTHRITIQUE. — *Externes composés.*

Liqueur anti-arthritique de *Pradier*.

ANTI-ASTHMATIQUE. — *Internes composés.* Bol anti-asthmaticque, élixir anti-asthmaticque de *Boerrhaave*, pilules anti-asthmaticques.

ANTICANCÉREUX. — *Externes composés.* Poudre anticancéreuse de Saint-Côme, P. arsenicale du Prof. *Dubois*.

ANTIDARTREUX, *voy.* ANTIHERPÉTIQUES.

ANTI-ÉMÉTIQUES. — *Internes simples.* Carbonate de potasse, columbo, quinquina.

— *Internes composés.* Potion anti-émétique de *Rivière*, poudre anti-émétique du prof. *Chaussier*.

ANTI-ÉPILEPTIQUES. — *Internes composés.* Electuaire anti-épileptique du Dr *Méad*, pilules anti-épileptiques anglaises, P. contre la danse de Saint-Guy du Dr *Mérat*, P. cuivreuses du Dr *Swediaur*.

ANTIHERPÉTIQUES. — *Internes simples.* Aconit napel; mercure, soufre et leurs composés.

— *Internes composés.* Bol contre les maladies de la peau, pilules d'aconit mercurielles du

Dr *Double*, pilules mercurielles de *Plumier*, sirop de *Cuisinier*, S. mercuriel de *Belet*, S. de sulfure de potasse, S. de *Willis*, tisane de *Feltz*, tisane de *Vinache*.

ANTIHERPÉTIQUES. — *Externes composés*. Cérat soufré, onguent citrin, O. mercuriel blanc de *Zeller*, pommade antiherpétique du prof. *Boyer*, P. oxigénée de M. *Alyon*, P. savonneuse hydro-sulfurée du Dr *Jadelot*, savon mercuriel du prof. *Chaussier*.

ANTI-ICTÉRIQUES. — *Internes composés*. Mixture lithontriptique de *Durande*, pilules anti-ictériques de *Buchan*, pilules de *Greding*.

ANTILAITÉUX. — *Internes simples*. Canne de Provence, purgatifs, sudorifiques.

— *Internes composés*. Petit-lait de *Weiss*.

ANTIPSORIQUES. — *Internes composés*. Bo contre les maladies de la peau.

— *Externes composés*. Cérat soufré, limmen antipsorique du Dr *Valentin*, onguent citrin, O. mercuriel blanc de *Zeller*, O. de nicotiane, pommades antipsoriques du Dr *Alibert* de *Peyrilhe*, P. oxigénée de M. *Alyon*, P. savonneuse hydro-sulfurée du Dr *Jadelot*, savon mercuriel du prof. *Chaussier*.

ANTISCORBUTIQUES. — *Internes simples*. Al

liaire, beccabunga, cerfeuil, cochléaria, cresson, oseille, passe-rage, patience, raifort, tabouret, trèfle-d'eau.

ANTISCORBUTIQUES. — *Internes composés.* Apozème antiscorbutique, bière sapinette, B. stomachique; élixir antiscorbutique de *Boerrhaave*, pastilles d'énula campana, potion antiscorbutique de *Franck*, sirop antiscorbutique, vin antiscorbutique.

— *Externes composés.* Gargarisme antiscorbutique.

ANTISCROPHULEUX. — *Simples et composés.* Les toniques, les antiscorbutiques et les fondans; élixir antiscrophuleux de *Peyrilhe*.

ANTISEPTIQUES. — *Internes simples.* Acide muriatique, A. muriatique oxigéné, A. nitrique, alliaire, alun, quinquina.

— *Externes simples.* Les mêmes que les précédens; poudre antiseptique de *Swédiaur*.

ANTISPASMODIQUES. — *Internes simples.* Acide benzoïque, ambre gris, ambroisie, assa-fœtida, belladone, caille-lait, camomille, camphre, cardamome, castoreum, citron, cuivre (oxide le), cynoglosse, eaux minérales acidules, éthers, euphrase, galbanum, jusquiame, laitue, laitue vireuse, mandragore, mélisse, menthe,

mille-feuille, musc, nitrate d'argent fondu, N. de bismuth, opium, opoponax, oranger, pavot, pétrole, pivoine, sagapenum, stéchas, sulfate de cuivre, S. de cuivre ammoniacée, tilleul, toxicodendron, valériane, zinc.

ANTISPASMODIQUES. — *Internes composées.*
Eaux d'*Ardel*, etc. E. éthérée camphrée, émulsion camphrée, éther acétique ferré de *Klaproth*, gouttes de *Talbot*, G. anodines d'*Hoffmann*, G. céphaliques d'Angleterre, G. d'*Eller*, juleps calmant, J. camphré, laudanum, opium du prof. *Chaussier*, opium cydonié de *Langen*, Tot, pastilles contre le croup du prof. *Chaussier*, pilules antispasmodiques de *Pidérít*, P. contre la danse de Saint-Guy du Dr *Mérai*, P. cuivreuses du Dr *Swédiaur*, P. de cynoglosse, P. fondantes de *Richter*, P. hystériques, P. de *Starkey*, P. de *Werlhoff*, potions antispasmodique, P. antitétanique du Dr *Fournier*, P. calmante, poudre antispasmodique, P. de *Dower*, P. tempérante de *Stahl*, sirop de karabé, teinture d'opium camphrée, teinture thébaïque.

— *Externes composés.* Lavement camphré, L. d'opium, liniment antispasmodique, onguent de laurier.

ANTISYPHILITIQUES. — *Internes simples.* Acétate de mercure, acide nitreux, A. nitrique, astragale, bardane, gayac, mercure, muriate sur-oxidé de mercure, M. doux de mercure, M. d'or, M. de potasse oxigéné, or, sulfure rouge et S. noir de mercure, turbith minéral.

— *Internes composés.* Dragées de Keyser, pastilles de mercure saccharin du D^r Lagneau, pilules antisypilitiques des D^{rs} Alibert, Bèloste, Chrestien, Cullerier, Dupuytren, Sédillot, Terras, P. de mercure gommeux de Plenck, P. mercurielles purgatives du D^r Alibert, P. mercurielles de Plumier, P. de panacée mercurielle du D^r Lagneau, poudre antisypilitique de C., P. de mercure saccharin du D^r Lagneau; remèdes antisypilitiques de Peyrilhe, de Russel; savon mercurielle du prof. Chaussier; sirop de Cuinier, S. de mercure gommeux de Plenck, S. de Belet, tisane de Feliz, T. de Vinache.

— *Externes simples.* Le mercure et ses composés, l'or et ses composés, bains fumigatoires mercuriaux.

Externes composés. Onguent citrin, O. mercuriel, O. mercuriel blanc de Zeller, pommade mercurielle au beurre de cacao de M. Planche,

pommade mercurielle de *Cirillo*, P. oxigénée de M. *Alyon*, P. de turbith du Dr *Alibert*.

APÉRITIFS. — *Internes simples.* Acétate de potasse, A. de soude, ache, asclépias, aspergillus câprier, eaux minérales sulfureuses, acidulées et salines; houx (petit), marrube, savon de souchet.

— *Internes composés.* Pastilles de safran, pilules de savon, P. de *Starkey*, savon de *Starkey*, sirop des cinq racines, S. de pommade composé.

ASTRINGENS. — *Internes simples.* Acétate de cuivre, A. de plomb; acide muriatique oxigéné, A. nitrique, A. nitrique alcoolisé, A. sulfurique, A. sulfurique alcoolisé, aigremoine, alun, angustura, baume du Pérou, B. de Tolu, B. benjoin, béroiste, bistorte, bois de Campêche, cachou, câprier, chêne, citron, codaga-pâle, coque, consoude, contra-yerva, eaux minérales ferrugineuses, euphrasie, fer, galles, garance, gennadiér, kino, mille-feuille, noyer, orange, orme, ortie, patience, pervenche, plantain, plomb, prunelier, quinquina, racine de *J. Lopez*, rhubarbe, ratanhia, ronce, rose rouge, rosier sauvage, salicaire, sang-dragon, saule, simarouba, sulfates de cuivre, de

de zinc ; tamarisc , tartrate de potasse et de fer ; les térébenthines , tormentille , véronique , verveine , vins de Bordeaux et de Roussillon , vinaigre.

ASTRINGENS. — *Internes composés.* Alun teint de *Mynsicht* , baume de *Lucatel* , cachou à l'ambre gris , confection hyacinthe , diascoridium , électuaire astringent balsamique de *Barthez* , E. astringent , élixir américain de *Courcelles* , émulsion astringente de *Cadet* , gelée de coing , G. de corne de cerf ; looch astringent , nixture astringente , M. balsamique de *Fuller* , piat antileucorrhéen de *Tissot* , O. astringent du Dr *Larrey* , pilules astringentes , P. astringentes du Dr *Lagneau* , P. cuivreuses du Dr *Swédiaur* , potion astringente de *Desault* , P. contre hémoptysie de *M. de Jussieu* , P. contre l'hémoptysie , poudre astringente , sirop de conopode composé , thériaque , tisane astringente.

— *Externes simples.* Presque tous les astringens internes simples , colophane , terre cimolée , vinaigre.

— *Externes composés.* Injection astringente , lavement astringent , pommade à la sultane , onguent astringent.

B.

BÉCHIQUES, voy. ADOUCISSANS, PECTORAUX.

C.

CALMANS, voy. ANTISPASMODIQUES, NARCO-
TIQUES.

CARMINATIFS. — *Internes simples.* Ache,
ammi, anis, camomille, carotte, carvi, co-
riandre, écorce de *Winter*, galanga, gingem-
bre, impératoire, livèche, marjolaine, menthe,
thym,

— *Internes composés.* Baume du *Comman-
deur*, électuaire de baies de laurier, élixir al-
kermès, essence carminative de *Wédélius*,
opiat de Salomon, sirop d'absinthe composé,
S. d'armoise composé, teinture d'absinthe com-
posée.

— *Externes composés.* Lavement carminatif.

CATHARTIQUES, voy. PURGATIFS.

CATHÉRÉTIQUES, {

CAUSTIQUES, {

CORROSIFS, {

voy. ESCARROTIQUES.

D.

DÉLAYANS. — *Simple.* Acides très-étendus.

d'eau, arroche, citron, épinards, groseiller, oseille, pignons doux, pistaches.

DÉLAYANS. — *Composés*. Boisson antiphlogistique de *Stoll*; gelée de groseille, émulsion simple, julep acide, limonade sèche de *Fascio*; oximel simple, sirop d'orgeat.

DENTIFRICES. — *Composés*. Eau de la *Vrillière*, E. de *Stahl*; élixir de l'abbé *Ancelot*, E. de *Leroy*, de la *Faudignère*; opiat dentifrice de *Baumé*.

DÉPURANS, voy. ANTISCOBUTIQUES, DIAPHORÉTIQUES.

DÉSINFECTANS. — *Simples*. Acide muriatique, A. muriatique oxigéné, A. nitreux, A. nitrique; chaux, genièvre, manganèse (oxide de).

— *Composés*. Baume de *Condom*, fumigations *Guittonniènes*, vinaigre prophylactique ou des quatre voleurs, vinaigre thériacal.

DÉTERSIFS. — *Simples*. Acétate de plomb, acide boracique.

— *Composés*. Gargarisme détersif, liqueur contre les aphthes du Dr *Swédiaur*.

DIAPHORÉTIQUES. — *Simples*. Acétate d'ammoniaque, ail, ammoniaque, antimoine (oxide de), bardane, boucage, bourrache, capillaire, ivette, muriate d'ammoniaque, pissenit, polygala, scabieuse, scorsonère, serpen-

taire , soufre , sulfite de soude , sulfure de potasse , sureau , thé.

DIAPHORÉTIQUES. — *Composés.* Apozème altérant commun, eau de Luce , élixir de propriété , miel de longue vie , poudre d'ipécacuanha de *Dower*, sirop de *Cuisinier*, teinture d'opium camphrée , tisane de *Vinache*.

DIURÉTIQUES. — *Simples.* Acétate d'ammoniaque, A. de potasse, A. de soude , ache, acide carbonique, A. muriatique , A. nitrique étendus d'eau , ail , alkékengé , alleluia , alliaire , ammi , asclépias , asperge , bardane , boucage , caille-lait , camphrée , canne de Provence , cantharides, carbonate de soude, C. de potasse , carotte , chardon bénit , C. roland , chicorée , eiguë , colchique, coloquinte , digitale , douce-amère , eaux minérales acidules , salines , sulfureuses ; écrevisses , épine-vinette , fenouil , fraisier , garance , houblon , houx , laurier , cerise , mille-pertuis , muriate d'ammoniaque , nitrate de potasse, pariétaire, persil, phosphate de soude , pissenlit , raisins d'ours , roseau aromatique , roseau à balais , saponaire , safran , safras , saxifrage , scille , scorsonère , souchet , sureau , tartrate acidule de potasse , T. de potasse , T. de potasse et de soude ; térébente

thines, thé, vigne sauvage, vins blancs, violette.

DIURÉTIQUES.—*Composés.* Apozème altérant commun, baume de pareira brava, décoction diurétique, eau impériale, E. de *Quercetan*, électuaire de baies de laurier, élixir américain de *Courcelles*, éther de digitale pourprée, liqueur nitrée camphrée, pilules de cigüe, P. scillitiques, poudre de *Dower*, savon de *Starkey*, sirop d'althæa composé, S. des 5 racines, vin amer diurétique du prof. *Corvisart*, vin anti-hydropique de *Bayle*.

EMOLLIENS.—*Simples.* Epinards, herbes aux puces, lin, lis, mauve, mercuriale, poirée, pomme, son, violette.

— *Composés.* Bains tièdes, B. de vapeur, cataplasme anodin, C. émollient; collyre émollient, fomentation émolliente de *La Faye*.

ÉMÉTIQUES. *Simples.* Antimoine, (oxides de cabaret, gratiole, ipécacuanha, joubarbe, scille, soldanelle, sulfate de zinc, tabac, tartrate antimonié de potasse, turbith minéral, violette.

— *Composés.* Pastilles émétiques de *Chomet*, potion émétique.

EMMÉNAGOGUES.—*Simples.* Absinthe, aloès, angélique, aristoloche, armoise, arrête-bœuf

assa-fœtida, aunée, basilic, bryone, buis, cabaret, camomille, camphre, camphrée, cannelle, cardamome, carotte, castoreum, char-don-roland, coloquinte, fougère mâle, galbanum, germandrée, girofle, gomme-ammoniac, marrube, matricaire, mélisse, menthe, myrrhe, opoponax, persil, rue, sabine, safran, sagapenum, santoline, souchet, tanaïsie.

EMMÉNAGOGUES. — *Composés*. Baume du *Commandeur*, bol emménagogue, élixir de propriété, essence carminative de *Wédélius*, pastilles de cannelle, de girofle, de safran; pilules balsamiques de *Stahl*, P. de *Becher*, P. chalybées, P. contre l'aménorrhée du *Dr Alibert*, P. hystériques, P. tartarées de *Schroder*, potion emménagogue de *Desbois*, sirop d'absinthe composé, S. d'armoïse composé, S. de pommes elléboré, S. de stéchas composé, tablettes martiales, teinture d'absinthe composée.

EPISPASTIQUES, voy. VÉSICANS.

ERRHINS, voy. STERNUTATOIRES.

ESCARROTIQUES. — *Simples*. Acétate de cuivre, acides minéraux concentrés, alun calciné, ammoniacque, cantharides, carbonate d'ammoniacque, garou, muriate d'antimoine, M. de mercure sur-oxidé; nitrate d'argent fondu, N. de mer-

ore, potasse caustique, sabine, sulfate de cuivre.

ESCARROTIQUES. — *Composés*. Baume vert de Metz, collyre de *Lanfranc*, onguent brun, poudre anticancéreuse de Saint-Côme, poudre arsenicale du prof. *Dubois*.

EXCITANS. — *Internes simples*. Acétate d'ammoniaque liquide, alcool, ambre gris, ammoniaque, carbonate d'ammoniaque, muriate d'ammoniaque, noix vomique, phosphore, pied de veau, santal, sénevé, soufre, sulfate de zinc.

— *Internes composés*. Baume de *Fioraventi*, B. de vie d'*Hoffmann*, eau de Luce, éther phosphoré.

— *Externes simples*. Presque tous les excitans internes simples. Bains à la glace, B. froids, B. alcalins B. fumigatoires, tuthie.

— *Externes composés*. Baume d'*Arcéus*, B. du *Commandeur*, B. de *Fioraventi*, B. opodeldoch, B. vert de Metz, collyre de *Lanfranc*, liniment ammoniacal, onguent basilicum, O. digestif simple, O. digestif animé, O. gris, O. mercuriel, O. de nicotiane, O. styrax, O. de tuthie, pommades anti-ophtalmiques de *Desault*, de *R...*; pommade contre la teigne.

EXPECTORANS. — *Simple*s. Acide benzoïque, antimoine (oxides de), baume du Pérou, B. de

Tolu, B. benjoin, ciguë aquatique, hysope, lierre terrestre, polygala, scille, soufre, térébenthines.

EXPECTORANS. — *Composés*. Décoction de polygala de *Peyrille*, looch gommeux kermétisé de *Parmentier*, oximel simple, pilules balsamiques de *Morton*, P. de scille composées, poudre de *Fothergill* contre la coqueluche, sirop d'al-thæa composé, S. contre la coqueluche, S. d'Erysimum composé, S. de sulfure de potasse, S. de *Willis*.

F.

FÉBRIFUGES. — *Internes simples*. Absinthe, acide arsénieux, ail, amandes amères, angustura, arnica, arséniate de potasse, A. de soude; aune, camomille, camphre, cascarille, centauree, chardon béni, chêne, ciguë aquatique, fève de Saint-Ignace, galls, gélatine, gentiane, kino, marronnier, muriate d'ammoniaque, poivre, quassia, quinquina, saule, serpentaire, simarouba, tamarisc, trèfle d'eau, vigne sauvage.

— *Internes composés*. Apozème fébrifuge, A. fébrifuge purgatif, bière de quinquina, bol contre la fièvre quarte, B. fébrifuge, bouillon amer, décoction amère, D. tonique fébrifuge, électuaire fébrifuge, poudre amère, remède con-

tre la fièvre intermittente de *Peyrilhe*, vin fébrifuge de *S....*

FONDANS. — *Internes simples*. Eaux minérales sulfureuses, savon.

— *Internes composés*. Pilules fondantes de *Richter*, de *Vicq d'Azir*.

— *Externes simples*, voy. RÉSOLUTIFS, EXCITANS, RÉPERCUSSIFS.

— *Externes composés*, voy. idem.

FORTIFIANS, Voy. STIMULANS, STOMACHIQUES, TONIQUES.

J.

INCISIFS, voy. EXPECTORANS.

L.

LAXATIFS. — *Simple*s. Alkékenge, casse, chicorée, manne, miel, pissenlit, polypode, pommes, pruneaux, sebestes, tamarins.

— *Composés*. Petit lait tamarindé, pilules balsamiques de *Stahl*, P. de *Bécher*.

M.

MATURATIFS. — *Simple*s. Gomme-ammoniac, goudron, lis, oseille, poirée, poix, sagapenum.

— *Composés*. Cataplasme maturatif, onguent basilicum, O. de la mère.

MINORATIFS, voy. PURGATIFS.

N.

NARCOTIQUES. — *Internes simples.* Alkékemge, belladone, ciguë, coquelicot, cynoglosse, jusquiame, laitue vireuse, laurier-cerise, mandragore, morelle, opium, pavot, pomme épineuse, tabac.

— *Internes composés.* Laudanum, opium de prof. *Chaussier*, O. cydonié de *Langelot*, pilule de ciguë, P. de cynoglosse, teinture thébaïque.

— *Externes simples.* Presque tous les internes simples.

— *Externes composés.* Baume hypnotique, baume tranquille, lavement d'opium, suppositoire calmant.

P.

PECTORAUX. — *Simple.* Les adoucissans : carotte, sirop de velar, chou rouge, coquelicot.

— *Composés.* Les adoucissans composés : bouillon pectoral, crèmes pectorales du Dr *Alibert*, de *Tronchin*, pastilles de safran, pilules balsamiques de *Morton*.

PURGATIFS. — *Internes simples.* Acétate de potasse, A. de soude; agaric blanc, aloès, bétoine, bryone, cabaret, carthame, colchique, colo-

quinte, concombre sauvage, eaux minérales salines, ellébore noir, E. blanc, eupatoire, euphorbe, fève de Saint-Ignace, gratiole, gomme-gutte, hièble, jalap, joubarbe, magnésie, manne, méchoacan, mercuriale, muriate doux de mercure, M. de potasse, nerprun, pêcher, phosphate de soude, rhapontic, rhubarbe, roses pâles, scammonée, séné, soldanelle, sulfate de magnésie, S. de potasse, S. de soude; sureau, tabac, tamarins, tartrate acidule de potasse, T. de potasse antimonié, T. de potasse et de soude, violette.

PURGATIFS. — *Internes composés.* Baume de vie de *Le Lièvre*, biscuits purgatifs, bol purgatif du Dr *Alibert*, catholicum double, eau de *Trévez*, eau-de-vie allemande, électuaire hydragogue du Dr *Fouquier*, élixir sacré, émulsion purgative, marmelade de *Tronchin*, petit-lait de *Weisse*, pilules aloétiques émollientes, P. angéliques, P. *ante cibum*, P. anti-ictériques de *Buchan*, P. de *Bélosie*, P. écossaises du Dr *Anderson*, P. hydragogues de *Bontius*, P. mercurielles purgatives du Dr *Alibert*, P. relâchantes de *Buchan*, P. de *Starkéy*, P. tartarées de *Schroder*, potion minorative, P. purgative, poudre cathartique de *Parmentier*, P. de *Dower*, P. hydra-

gogue, sel de *Guindre*, sirop de chicorée composé, S. de pomme composé, S. de pomme elléboré, S. de roses pâles composé, sucre orangé purgatif, tisane laxative, T. de *Vin-nache*.

PURGATIFS. — *Externes composés*. Lavement purgatif, L. purgatif des peintres, L. stimulant purgatif.

R.

RAFRAICHISSANS. — *Internes simples*. Les délayans ; alléluia, chiendent, citrouille, concombre, courge, eaux minérales acidules, épine-vinette, framboise, grenade, melon, nénuphar, nitrate de potasse, oranges, oxalate acidule de potasse, poirée, pomme, tartrate acidule de potasse, T. de potasse, vinaigre.

— *Internes composés*. Les délayans composés.

— *Externes composés*. Gargarisme rafraîchissant.

RELACHANS, voy. LAXATIFS.

RÉPERCUSSIFS. — *Simple*. Préparations de plomb, terre cimolée.

— *Composés*. Eau blanche, liniment calcaire, onguent et cérat de *Goulard*.

RÉSOLUTIFS. — *Simple*. Bains alcalins, hièble,

jusquiame, mille-pertuis, morelle, persil, pomme épineuse, safran, sauge, savon, scabieuse, scrophulaire, sureau, terre cimolée, vinaigre.

RÉSOLUTIFS. — *Composés.* Baume d'*Arceus*, B. du Commandeur, collier de *Morand* contre le goître; collyre résolutif, eau d'arquebusade, embrocation simple, E. résolutive de *La Faye*, presque tous les emplâtres, fomentations résolutives de *La Faye*, de *Richter*, du Dr *Justamond*; liqueur résolutive de *Purmann*, onguent d'althæa, emplâtre de ciguë, vin aromatique, V. astringent.

RUBÉFIANS. — *Simples.* Acides étendus, ail, alcool, ammoniacque, carbonate d'ammoniacque, euphorbe, pied de veau, poix, sénevé, verveine.

— *Composés.* Eau de *Gondran*, eau de *Luce*, liniment ammoniacal.

S.

SALIVANS, voy. SIALAGOGUES.

SÉDATIFS. — *Internes simples.* Acétate de plomb; en général les narcotiques et les antispasmodiques.

— *Internes composés.* Liqueur antinéphrétique du Dr *Adams*.

— *Externes composés.* Eau blanche, injection sédative du Dr *Hamilton*.

SIALAGOGUES OU SIALOGOGUES. — Angélique, dentifelaire, girofle, impéatoire, pyrèthre.

STERNUTATOIRES. — *Simples*. Arnica, bétouine, ptarmique, pyrèthre, tabac.

— *Composés*. Poudre capitale de Saint-Ange, P. sternutatoire.

STIMULANS. — *Internes simples*. Acide benzoïque, anis, aristoloche, alcool, arnica, basilic, baume du Pérou, B. de Tolu, B. benjoin, beccabunga, carbonate d'ammoniaque, cardamome, carvi, cresson, fenouil, galanga, gingembre, ginseng, gomme-ammoniac, huiles de *Dippel*, hydrogène sulfuré, lavande, marjolaine, mélisse, muscade, poivre, polygala, romarin, roseau aromatique, safran, sauge, serpolet, stéchas, sulfate de cuivre, tartrate de potasse et de fer, thé, thym, valériane, vanille, vélar, véronique, vins, vipère, zédoaire.

— *Internes composés*. Bière stomachique, eaud'arquebusade, E. d'*Ardel*, E. éthérée camphrée, E impériale, presque tous les élixirs; éther acétique ferré de M. *Klaproth*; E. phosphoré, gouttes amères, liqueur nitrée camphrée, mixture antiléthargique de *Franck*, potion cordiale du Dr *Alibert*, poudre d'arum com-

posée de *Birckmann*; tablettes mariales, teinture de mars de *Ludovic*, vulnéraire suisse.

STIMULANS.—*Externes simples*. Presque tous les stimulans internes simples; bains à la glace, B. froids, B. alcalins, B. fumigatoires, B. chauds, B. électriques, tuthie.

—*Externes composés*. Collier de *Morand* contre le goître, eau d'arquebusade, E. d'*Ardel*, gargarisme de *Quarin*, lavement stimulant, liqueur contre les aphthes du Dr *Swédiaur*, pommade anti-ophtalmique, P. de *Desault*, P. de *R.....*, onguent styrax, O. de tuthie, suppositoire fortifiant de *Reuss*.

STOMACHIQUES.—*Internes simples*. Absinthe, ambroisie, angélique, cacao, cannelle, cascarrille, citron, colombo, écorce de *Winter*, galanga, germandrée, girofle, gingembre, ivette, lavande, marjolaine, menthe, muscade, quassia, racine de *Jean Lopez*, rhubarbe, roseau aromatique, santal, serpolet, thym, vanille, vins, zédoaire.

—*Internes composés*. Baume du *Commandeur*, B. de *Fioraventi*, B. de vie de *Le Lièvre*, bol stomachique de *Desbois*, confection alker-mès, C. d'hyacinthe, eau thériacale, élixir alker-mès, E. corroborant de M. *Hébert*, E. de

Garus, élixir de propriété, E. de *Stoughton*, essence carminative de *Wédélius*, opiat de *Salomon*, O. stomachique d'*Helvétius*, osmazome, pastilles de cannelle, P. de girofle, pilules angéliques, P. *ante cibum*, P. balsamiques de *Stahl*, P. de *Bécher*, P. chalybées, P. stomachiques de *Starkey*, poudre d'ambre, P. amère, P. d'arum composée de *Birckmann*, sirop d'absinthe composé, S. de stéchas composé, teinture d'absinthe composée, thériaque.

STUPÉFIANS, voy. NARCOTIQUES.

STYPTIQUES. — *Internes simples*. Acide sulfurique alcoolisé, alun, fer, galls, mille-feuille, pervenche, pied-de-lion, quinte-feuille.

— *Externes simples*. Les mêmes.

SUDORIFIQUES. — *Internes simples*. Les diaphorétiques; ache, ammi, angélique, aunée, bénoiste, buis, calaguala, camphre, camphrée, canne de Provence, carbonate d'ammoniaque, C. de potasse, C. de soude, chardon bénit, contra-yerva, douce-amère, garou, gayac, lobélie, musc, roseau à balais, salsepareille, saponaire, sassafras, sauge, squine.

— *Internes composés*. Les diaphorétiques composés; boisson sudorifique, confection d'hyacinthe, eau thériacale, élixir thériacal,

gouttes d'*Eller*, infusion sudorifique du Dr *Caméra*, ratafia des Caraïbes, tisane sudorifique, vin sudorifique d'*Huxam*, vinaigre thériaical.

SUDORIFIQUES. — *Externes simples*. Bains chauds, B. de vapeurs, B. fumigatoires.

SUPPURATIFS, voy. EXCITANS EXTERNES.

T.

TONIQUES. — *Internes simples*. Absinthe, alcornoque, aloès, amandes amères, angustura, anis, aristoloche, arnica, aunée, bétoine, bile de bœuf, cachou, cannelle, câprier, cascarille, centaurée, chardon-bénit, chêne, chicorée, codaga-pâle, contrayerva, eaux minérales ferrugineuses, fer, fougère mâle, genièvre, gentiane, germandrée, girofle, ginseng, goudron, houblon, hysope, impératoire, ipécacuanha, ivette, kino, lierre terrestre, marronnier, matricaire, muriate d'ammoniaque, M. de potasse; muscade, noix vomique, noyer, oranger, patience, quassia, quinquina, rhubarbe, romarin, santoline, saponaire, sauge, saule, semencontra, serpentaire, simarouba, sulfate de fer, tanaïsie, tartrate de potasse et de fer, toxi-

codendron, trèfle d'eau, valériane, véronique, verveine, vins.

TONIQUES. — *Internes composés.* Bière de quinquina, B. sapinette, bol contre la chlorose, B. contre la fièvre quarte, confection alkermès, décoction amère, diascordium, gouttes amères, miel de longue vie, opiat de Salomon, osmazome, pastilles de camelle, pilules chalybées, P. fondantes de *Richter*, P. de *Vicq-d'Azir*, P. toniques de *Bécher*, P. de Moscou, poudre d'ambre, P. corroborante de *Werlhoff*, sirop d'absinthe composé, sirop d'érysimum composé, S. de stéchas composé, teinture de mars de *Ludovic*, thériaque, vin fébrifuge de S..., vinaigre thériacal.

— *Externes simples.* Presque tous les toniques internes simples. Bains à la glace, B. froids, B. fumigatoires, B. alcalins, terre cimolée.

— *Externes composés.* Baume acoustique, vin aromatique, V. astringent.

V.

VERMIFUGES. — *Internes simples.* Absinthe, ail, alliaire, aloès, armoise, azédarack, camphre, carotte, cévadille, coralline, étain, fougère mâle, genièvre, gentiane, géoffroye, gra-

tiole , mercure , mousse de corse , muriate d'étain , M. de mercure doux , mûrier , nerprun , noix vomique , papayer , pêcher , pétrole , rai-
fort , ricin , sabine , santoline , semen-contre ,
tanaïsie.

VERMIFUGES. — *Internes composés.* Baume de vie de *Lelièvre* , biscuits vermifuges , décoction amère , dragées vermifuges , élixir de *Stoughton* , gelée de mousse de corse , pastilles vermifuges de *Barthez* , pilules de *Bélosté* , P. de panacée mercurielle du Dr *Lagneau* , poudre amère , P. anthelmintique , remède anthelmintique d'*Alston* , remède contre le ténia du Dr *Albert* , du prof. *Bourdier* , de madame *Nouffer* ; sirop anthelmintique , S. d'armoise composé , sucre vermifuge , teinture d'absinthe composée , vinaigre thériaque.

— *Externes composés.* Lavement vermifuge , suppositoire vermifuge.

VÉSICANS. — *Simples.* Bryone , cantharides , euphorbe , garou , pied de veau.

— *Composés.* Pommade de cantharides , P. de garou.

VOMITIFS , voy. EMÉTIQUES.

FIN.

Fautes à corriger.

Pag. 79, lign. 2, cuniforme; lis. : uniforme.

Pag. 159, dernière ligne, liniment 3 ij à j; lis. : 3 ij à 3 j.

Pag. 174, lig. 21, teinture, 3 à 3 ij; lis. : teinture, 3 ss à 3 ij.

Pag. 178, lig. 4, 3 ss à 3 j par ij d'eau; lis. : 3 ss à 3 j par ss ij d'eau.

Pag. 210, lig. 12, j à 3 iv; lis. : 3 j à 3 iv.

Pag. 223, lig. 19, j à 3 ss; lis. : 3 j à 3 ss.

Pag. 235, lig. 3, manip.; lis. : manip. j.

Pag. 250, dern. ligne, suc, 3 ss; lis. : suc, 3 ij.

Pag. 300, ajoutez après la dernière ligne, à l'article RATANHIE.

D. Extrait, 3 ss à 3 j dans une potion.

A la pag. 301, au lieu de obs. peu usitée en France; lis. : Obs. usitée depuis peu en France.

Pag. 342, lig. 4, ss e. pilules; lis. : 3 ss en pilules.

Pag. 377, aux trois dernières lignes, aa manip.; lis. : aa manip. ij.

Pag. 392, lig. 11, acide sulfurique; lis. : acide sulfurique.

Pag. 461, lig. 2, faites la poudre; lis. : faites la prendre, etc.

Pag. 488, lig. 3, ou cachou; lis. : au cachou.

